BR Holt 00053

BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis

Est. VI
Prat. II

11
Restaurar

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATVRÆ

# CAROLI A LINNÉ
# SYSTEMA
## NATVRÆ.

# CAROLI A LINNÉ,

*EQVITIS AVRATI DE STELLA POLARI,*

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. VPSAL.
ACAD. PARIS. VPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROL. IMPER.
LOND. ANGL. MONSPEL. TOLOS. FLORENT.
EDINB. BERN. SOC.

# SYSTEMA NATVRÆ,

## *PER REGNA TRIA NATVRÆ,*

SECVNDVM CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES,
CVM CHARACTERIBVS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.

*TOMVS OCTAVUS.*

EDITIO IN LVSITANIA PRIMA
CORRECTA SECVNDVM EDITIONEM DECIMAM TERTIAM
AVCTAM, ET REFORMATAM CVRA

JO: FRID. GMELIN,

Philos. & Med. Doctor. hujus & Chem. in Georgia Augusta Prof. P. O.
Acad. Cæsar. Naturæ Curiosorum & Electoral. Moguntin. Erfordensis,
necnon Societ. Reg. Scient. Goettingensis, Physicæ Tigurin.
& Metallicæ Membri.

CONIMBRICÆ,
TYPIS ACADEMICIS: A. D. CIↃDCCLXXXXIIII.

*Cum facultate Regiæ Curiæ Commissionis Generalis
pro Examine & Censura Librorum.*

# CLASSIS VI.

# VERMES.

*Mihi contuenti sese persuasit rerum Natura nihil incredibile existimare de ea.*

PLIN. XI. 3.

TARDIGRADA, mollia, pandentia, vivacissima, redintegranda, humidi Animantia, multa *acephala & apoda plurima*, *androgyna vel neutra*, multa, *tentaculis* plurima dignoscenda.

IMPERFECTA veteribus, nec adeo inepte, dicta animantia, destituuntur auribus, naso, multa capite, oculis *a)* pedibusque distinctis, ab insectis itaque diversissima, a quibus dudum removi naturæ cryptogama: sunt *Intestina*, *Mollusca*, *Testacea*, *Zoophyta*, *Infusoria*.

INTESTINA terrena quondam dicta, summa corporis simplicitate conspicua, alia intra alia animantia vivunt, alia in aquis potissimum *dulcibus*, pauciora in

*a)* Vermium genus omne oculis carere tradidit quidem *Plinius*, *at præter* [illegible], *limacibus*, *turcidibus*, *hirudinibus*, *oculi sunt*, *utique ab humanis diversi*.

in terra habitant; perforat *Gordius* argillam, ut aqua tranet, *Lumbricus* humum, ne situ corrumpatur, *Teredo* ligna, ut destruantur, quemadmodum *Pholades & Mytili lithophagi* petras, ut solvantur.

MOLLUSCA nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, cœlo resplendentia, tamquam totidem lucernis tenebricosum illuminant abyssum phosphorea.

TESTACEA, mollusca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, & ipsa sæpe calcivora, insectis opposita specierum numero, magna ludentis Naturæ varietate *a)* multiplicata. TESTAS polydædalas Conchyliorum parium æque attente legit summa sapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis *b)* ad Ammirales Scalaresve, margaritis *c)* suis pretiosiores, quas artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in tritonis COCHLEIS vividis ad *Umbilicum* aut *Cardinem* posteriorem *Apertura* rarius *Operculo* clausilis, cum *Labro* exteriore interioreve, sæpe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spirae Anfractus* sinistri, rarius contrarii dextri, *sutura* connexi, rarius *varice* cincti; læves, sulcati, striati, angulati, nodosi, aculeati, spinosi, frondosi usque in *Mucronem* apicis rarius decollatum, & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis lectis testarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas sinistras & dextras, æquales vel inæquales, æquilateres vel inæquilateres; interius den-

---

*a)* *Plin.* IX. 33. Tot *colorum* differentiæ, tot *figuræ* planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæsis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatim intorto, margine in mucronem emisso, foris effuso, intus replicato; jam distinctione virgulata, crinita, crispa; canaliculatim, pectinatim, imbricatim undata; cancellatim reticulata, in obliquum, in rectum expansa, densata, porrecta, sinuata, brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis, ad buccinum recurvis. V. *Bonanni*, *Rumphi*, *Kleinii explicationem.*

*b)* *Speculatio-gods* vulgo.

*c)* *Margaritarum* dos in candore, magnitudine, orbe, lævore, pondere. *Plin.* IX. 35. Pretiosissima Cleopatræ Antonio exposita. *Ibid.*

dentatos *Cardines* inter *Nates* infimas *Umbonum* tumentium ; inferius *Ani* impreſſuram , anterius *Vulvae* rimam , *Labiis nymphisque* conniventem, *Hymene* obtectam , *Pube* interdum cinctam ; harum *Limbus* exterior circumſcribitur *Margine* integerrimo , crenulato ſ. dentato : *ſuperiore* ante vulvam ; *poſteriore* pone anum ; *exteriore* natibus oppoſito. Decet inprimis inquirere in foſſilium incognita protypa , inprimis *anomiarum* , abyſſi cimelia , cum alia ſint *terreſtria* , *fluviatilia* , *lacuſtria* , *littorea* , *maritima* , *pelagica* alia.

ZOOPHYTA compoſita animantia , in bivio animalium vegetabiliumque conſtituta , *radicata* (plurima) *caulescunt* multiplicata vita *ramis* , *gemmis* cæduis , metamorphorſique *florum* animantium ſponte ſeſe moventium , eo ſi plantæ eſſent Zoophyta , ſenſu motuque deſtituta , & Zoophyta veræ plantæ , ſed ſenſus motusque organo inſtructæ, (*equidem his ineſſe ſenſum , quae nec animalium , nec fruticum , ſed tertiam ex utroque naturam habent* Plin. *a*) adeoque vegetabilia naturali metamorphoſi mutanda in animalia. Horum alia mollia , nuda , Zoophyta ſtricto ſenſu audiunt; alia tecta quaſi dura obtecta *Lithophyta*. Hæc priſci plantas aeris contactu lapideſcentes putabant , ſed recentioribus etiam ex ſuo ſemine lapides germinare , inprimis ob calcaream horum indolem viſi , usque dum *Marſigli* diligentia extraxerat e mari coralliia vegetantia floribus octandris octopetalis , a contactu aeris ſe contrahentibus , inque aqua denuo expandendis ; at eodem tempore (1727) *Peyſſonnellus* corallia ab animalculis fabricari, ultra ſeculum poſt eandem apud ſapientiores indos ratam ſententiam *b*) primum vidit vix auditus , niſi *Tremblacus* (1741) hydras omnium admiratione de-

te-

*a*) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.
*b*) *Rumph. muſ.* 152. *ad tab.* 16. F.

texiſſet, & ad littora curioſos allicuiſſet, quo via per *Elliſii* ſertularias ad corallia aperta fuit. *a*)

INFUSORIA animalcula omnium minima, plurima oculis nudis vix uſurpanda, tentaculis deſtituta, plurima in infuſis habitant, ſemel exſiccata denuoque humectata non reviviſcunt.

AUCTORES, hæc animalia illuſtrantes pauci inter hos pretioſi; meritiſſimus *O. F. Muller*, tum *Bellonius* (1553), *Rondelet* (1554), *C. Geſner* (1558), *Columna* (1606), *Aldrovandi* (1606), *Jonſton* (1650), *Reimarus* (1773). De inteſtinalium hiſtoria meruere *Pallas* (1760), *Vereſtoi de Czer* (1772), *Happ* (1780), *Goeze* (1782), *Bloch* (1782), *Werner* (1782), *Retzius* (1786), *Schrank*, de reliquis inteſtinis vix ulli. De MOLLUSCIS *Bohadſch* (1761), *Klein* (1734), *Leske* (1776). De TESTACEIS primario ſobrius *Bonanni* (1681), ditiſſimus *Liſter* (1685), ſolidiſſimus *Rumpf* (1705), curioſiſſimus *Petiver* (1702), abſolutiſſimus *Gualtieri* (1742), nitidiſſimus *Argenville* (1742), pulcherrimus *Regenfus b*) (1758), locupletiſſimi *Martini* (1768), *Chemnitz* (1784), & *Schroeter* (1784), nec non *Columna*, *Barrelier*, *Bianchi*, *Klein*, *Ginanni*, *Lange*, *Leſſer*, *Knorr*, *Geve*, *Geoffroy*, *Ad. Murray*, *Favart*, *d' Herbigny*, *Duchesne*, *Kaemmerer*, *Spengler*, *Adanſon* infelicique partu *Seba*, alii. De ZOOPHYTOTRUM hiſtoria meruere Comes *Marſigli*, oculatus *Donati*, lynceus *Ellis*, indefeſſus *Baſter*, acutiſſimus *Pallas*, *Solander*, *Cavolini*, alii. De Infuſoriorum princeps *O. F. Muller*, tum *Goeze*, *Ilrisberg*, *Terechowsky*, *Schranck*, *Baker*, *Hill*, *Joblot*, *Ledermuller*, *Hermann*, *Eichhorn*.

GE-

*a*) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.
*b*) *Regenfusii* operis commentatore *Cl. Krazenſtein* & *Spengler* prodiere tantum tabulæ XII.

# GENERUM CHARACTERES.

## I. INTESTINA Animalia ſimplicia, nuda, artubus deſtituta.

* *intra alia animalia degentia, oculis nullis.*

276. ASCARIS. *Corpus* teres, poſterius attenuatum, capite trinodi.

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* teres, capite filiformi longo.

UNCINARIA. *Corpus* filiforme elaſticum: capite labiato, labiis membranaceis angulatis, cauda (*feminæ*) aciformi, (*maris*) uncis 2 veſicæ pellucidæ incluſis armata.

TILARIA. *Corpus* filiforme totum.

SCOLEX. *Corpus* minimum gelationoſum opácum, capite exſertili & retractili: auriculis 4 pellucidis.

LIGULA. *Corpus* lineare æquale elongatum.

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum: ore anteriori oſtiis 4 cincto.

STRONGYLUS. *Corpus* teres elongatum: anterius globoſo-truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius (*feminæ*) acuminatum, (*mari*) cucullatum.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili aculeis uncinatis coronata.

HÆ-

Vagientem etiamnum in [illegible] a matre [illegible] remotam mi-
rentur adultiores. Cui ordini [illegible] *Caſcinium* Solanari?

| | | |
|---|---|---|
| | HÆRUCA. | *Corpus* teres : capite aculeis coronata. |
| | CUCULLANUS. | *Corpus* posterius acuminatum, anterius obtusum : ero orbiculari. |
| | CARYOPHYLLÆUS. | *Corpus* teres læve, ore amplo. |
| | FASCIOLA. | *Corpus* depressum ovatum gelatinosum. |
| 351. | TÆNIA. | *Corpus* articulatum depressum, anterius tubulo instructum : poro ventrali duplici. |
| 353. | FURIA. | *Corpus* lineare aculeis reflexis utrinque ciliatum. |
| 281. | MYXINE. | *Corpus* teres subtus carinatum pinna adiposa. |

** *extra alia animalia habitantia.*

r *poro laterali nullo.*

| | | |
|---|---|---|
| 275. | GORDIUS. | *Corpus* æquale filiforme totum, teres, læve. |
| 280. | HIRUDO. | *Corpus* anterius & posterius truncatum, ore caudaque progrediendo dilatata. |

rr *poro laterali pertusa.*

| | | |
|---|---|---|
| 277. | LUMBRICUS. | *Corpus* teres annullatum : aculeis conditis. |
| 279. | SIPUNCULUS. | *Corpus* teres : rostro cylindrico augustato. |
| 278. | PLANARIA. | *Corpus* depressum : poro ventrali. |

II. MOLLUSCA. Animalia simplicia artubus instructa:

** ore supero.*

288. ACTINIA. *Apertura* unica communi, dilatabili, nuda, basi affixa.

CLAVA. *Apertura* unica communi, dilatabili verticali: tentaculis clavatis cincta.

MAMMARIA. *Apertura* unica, cirris nullis, lævis.

PEDICELLARIA. *Corpus* pedunculatum fixum: pedunculo rigido.

287. ASCIDIA. *Aperturis* duabus: altera humiliori affixa.

SALPA. *Aperturis* duabus: utraque terminali.

DAGYSA. *Aperturis* duabus. *Corpus* angulatum.

*** ore antico:*
*† pinna mobili ad abdomen vel caudam.*

PTEROTRACHEA. *Corpus* pervium, gelatinosum tracheatum.

*†† corpore pertuso foraminulo laterali.*

282. LIMAX. *Tentacula* 4. *Anus* communis cum poro laterali.

283. APLYSIA. *Tentacula* 4. *Anus* supra posteriora.

284. DORIS. *Tentacula* 2. *Anus* supra posteriora.

289. TETHIS. *Foramina* lateralia sinistra gemina.

*ttt corpore tentaculis anterius cincto.*

| | |
|---|---|
| 290. HOLOTHURIA. | *Tentacula* carnosa. |
| 291. TEREBELLA. | *Tentacula* capillaria. |

*tttt corpore brachiato*

| | |
|---|---|
| 292. TRITON. | *Brachia* bipartita : quibusdam cheliferis. |
| 296. SEPIA. | *Brachia* 8-10, instructa cotylis. |
| 295. CLIO. | *Brachia* 2 dilatata. |
| LOBARIA. | *Corpus* supra convexum, subtus planum lobatum. |
| 293. LERNÆA. | *Brachia* 2 s. 3. teretia. |
| 294. SCYLLÆA. | *Brachia* 6 : remotis paribus. |
| GLAUCUS ? | *Brachia* 4 ramosa. |

*ttttt corpore pedato.*

| | |
|---|---|
| 285. APHRODITA. | *Os* inerme. *Corpus* ovale, oculatum. |
| AMPHITRITE. | *Os* inerme. *Corpus* subrotundum. *Oculi* nulli. |
| SPIO. | |
| 286. NEREIS. | *Os* unguiculatum. *Corpus* elongatum. *Tentacula* simplicia. |
| NAIS. | *Os* inerme. *Corpus* elongatum. *Tentacula* o. |

**** ore infero utplurimum centrali.*

| | |
|---|---|
| PHYSSOPHORA ? | *Corpus* gelatinosum e vesicula aerea pendens. |
| 297. MEDUSA. | *Corpus* gelatinosum læve. |
| LUCERNARIA. | *Corpus* gelatinosum rugosum brachiatum. |
| 298. ASTERIAS. | *Corpus* coriaceum, muricatum. |
| 299. ECHINUS. | *Corpus* crustaceum, aculeatum. |

III. TESTACEA. Mollusca simplicia, obtecta testa calcarea.

* *Multivalvia*

300. CHITON. *Testa* multivalvis, longitudinaliter dorsalis.

301. LEPAS. *Testa* multivalvis inæquivalvis, sessilis.

302. PHOLAS. *Testa* bivalviis: accessoriis posterioribus.

** *Bivalvia* : CONCHÆ.

303. MYA. *Testæ cardines* (*sæpius*) dente crasso vacuo.

304. SOLEN. *Testa* utrinque hians: cardinis dente subulato reflexo, sæpe duplici.

305. TELLINA. *Cardinis* dentibus lateralibus alterius valvæ utplurimum vacuis.

306. CARDIUM. *Cardinis* dentibus lateralibus remotis penetrantibus.

307. MACTRA. *Cardinis* dente intermedio complicato trigono cum adjecta foveola.

308. DONAX. *Cardinis* dente laterali (*utplurimum*) remoto vacuo.

309. VENUS. *Cardinis* dentibus approximatis divaricatis.

310. SPONDYLUS. *Cardinis* dentibus duobus distinctis foraminulo.

311. CHAMA. *Cardinis* dentibus (*in altera testa*) duobus obliquis obtusis.

312. ARCA. *Cardinis* dentibus numerosis penetrantibus.

313. OSTREA. *Cardinis* dente o; scrobiculo ovato.

| | |
|---|---|
| 314. ANOMIA. | *Cardinis* dente o ; ſcrobiculo ( *in multis* ) lineari marginali. |
| 315. MYTILUS. | *Cardinis* dente o ; ſcrobiculo ſubulato diſtincto. |
| 316. PINNA. | *Cardinis* dente o ; margine altero coalito. |

*** *Univalvia.*

† *ſpira regulari* COCHLEÆ.

| | |
|---|---|
| 317. ARGONAUTA. | *Teſta* unilocularis , ſpiralis , involuta. |
| 318. NAUTILUS. | *Teſta* multilocularis ; loculis per foramen communicantibus. |
| 319. CONUS. | *Teſtae apertura* effuſa lineari edentula. |
| 320. CYPRÆA. | *Teſtae apertura* effuſa , lineari utrinque dentata. |
| 321. BULLA. | *Teſtae apertura* ſubcoarctata obliquata. |
| 322. VOLUTA | *Teſtae apertura* effuſa; columella plicata. |
| 323. BUCCINUM. | *Teſtae apertura* canaliculo dextro. |
| 324. STROMBUS. | *Teſtae apertura* canaliculo ſiniſtro. |
| 325. MUREX. | *Teſtae apertura* canaliculo recto. |
| 326. TROCHUS. | *Teſtae apertura* coarctata ſubtetragona. |
| 327. TURBO. | *Teſtae apertura* coarctata orbicularia. |
| 328. HELIX. | *Teſtae apertura* coarctata lunari. |
| 329. NERITA. | *Teſtae apertura* coarctata ſemiorbiculari. |
| 330. HALIOTIS. | *Teſtae apertura* dilatata ; *Spira* occulta. |

*ſine*

†† *ſine ſpira regulari.*

331. PATELLA. *Teſta* patenti-conica, quieſcens.
332. DENTALIUM. *Teſta* libera ſubulata utroque fine aperta.
333. SERPULA. *Teſta* adnata (*utplurimum*) tubuloſa.
334. TEREDO. *Teſta* intruſa ligno.
335. SABELLA. *Teſta* granis arenaceis conflata.

IV. ZOOPHYTA. Animalia compoſita vegetabilium more effloreſcentia.

* *ſtirpe calcarea* LITHOPHYTA.

336. TUBIPORA. *Corallium* tubis cylindricis.
337. MADREPORA. *Corallium* ſtellis concavis.
338. MILLEPORA. *Corallium* poris ſubulatis.
339. CELLEPORA. *Corallium* cellulis cavis.
340. ISIS. *Stirps* lapidea.

** *ſtirpe molliori.*

ANTIPATHES. *Stirps* cornea, ſpinulis obſita, carne gelatinoſa tecta.
341. GORGONIA. *Stirps* cornea, carne celluloſa vel vaſculoſa tecta.
342. ALCYONIUM. *Stirps* ſuberoſa.
343. SPONGIA. *Stirps* ſtupoſa.
344. FLUSTRA. *Stirps* poroſiſſima.
345. TUBULARIA. *Stirps* fiſtuloſa.
346. CORALLINA. *Stirps* articulis filiformibus calcareis.
347. SERTULARIA. *Stirps* articulis filiformibus fibroſis.
350. PENNATULA. *Stirps* coriacea penniformis.
349. HYDRA. *Stirps* medulloſa nuda.

V.

V. INFUSORIA. Animalia minima ſimpliciora.

** organis externis inſtructa.*

BRACHIONUS. *Corpus* teſta tectum apice ciliatum.

548. VORTICELLA. *Corpus* nudum apice ciliatum.

TRICHODA. *Corpus* altera parte crinitum.

CERCARIA. *Corpus* rotundato-caudatum.

LEUCOPERA. *Corpus* undique ciliatum.

*** organis externis nullis.*

*r complanata.*

GONIUM. *Corpus* angulatum.

COLPODA. *Corpus* ſinuatum.

PARAMECIUM. *Corpus* oblongum.

CYCLIDIUM. *Corpus* orbiculare vel ovatum.

*r e teretia.*

BURSARIA. *Corpus* cavum.

VIBRIO. *Corpus* elongatum.

ENCHELIS. *Corpus* cylindraceum.

BACILLARIA. *Corpus* ex trabeculis in varias formas accomodatis compoſitum.

352. VOLVOX. *Corpus* ſphæricum.

MONAS. *Corpus* punctiforme.

*Admiranda tibi levium ſpectacula rerum.*

VIRG.

# ORDO I. INTESTINA.

Animalia *simplicia*, *absque artubus*, *nuda*.

276. ASCARIS. *Corpus* teres elasticum utrinque attenuatum, capite trinodi, cauda obtusa aut subulata.
*Vasa* spiralia lactea pellucentia.

a *hominis*.

vermicularis. 1. Asc. cauda subulata, cute ad latera corporis subtilissime crenata. *Goeze Eingew. p.* 102. *t.* 5. *f.* 1-3.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. suec.* 1269. Ascaris pollicaris.
*Aldrov. inf.* 6. *p.* 651. 656.
*Mouff. theatr. inf. p.* 297.
*Valisn. op.* 1. *t.* 20. *f.* 5-10.
*Cleric. lumbr. t.* 3. *f.* 5-10.
*Bianch. hist. morb. t.* 3. *f.* 20.
*Phelf. hist. ascar. t.* 1. *f.* 3-11. *t.* 2. *f.* 1-3.
*Pall. f. viv. p.* 12.
*Mull. hist. verm.* 1. 2. *p.* 6. *t.* 34.
*Hill. hist. anim. p.* 14.
*Doever. verm. p.* 59. 60.
*O. Fabr. Fn. groenl.* 248.
*Bloch Eingew. p.* 31.
*Happ verm. hom. int. p.* 8.
*Werner verm. intest. p.* 72. *t.* 5. *f.* 133-137.
*Habitat in* puerorum, *etiam recens natorum*, intestinis, *potissimum recto*, *vivipara*.

lumbricoides. 2. Asc. cauda obtusa vel subincurva, ani rima transversa, intestino aurantio. *Goeze Eingew p.* 65.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1076. *n.* 2. Aſcaris ſpithamea.
*Aldrov. inſ. l.* 6. *p.* 652. *f.* 4. 5.
*Jonſt. inſ. p.* 158. *t.* 24. *n.* 1.
*Mouff. theatr. inſ. p.* 282. 296.
*Red. anim. viv. negl. an. viv. p.* 19. 20. *t.* 10. *f.* 2. 3. *opuſc.* 3. *t.* 10. *f.* 1-4.
*Valisn. op.* 1. *p.* 271. *t.* 34. 35.
*Cleric. lumbr. p.* 218. *t.* 4. *f.* 1-4. *t.* 10. 11.
*Klein herpetol. p.* 63. *t.* 1. *f.* 3. *t.* 2. *f.* 1-7.
*Act. angl.* 1678. *n.* 147.
*Barthol. cent.* 2. *h.* 23.
*Pallas diſſ. de inf. viv. p.* 13.
*Odhel. act. Stockh.* 1776. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 1. 3. & *p.* 313.
*Doeveren. verm. p.* 68. *t.* 8. *f.* 1. 2.
*Muller hiſt. verm.* 1. 2. *p.* 35.
*Naturf.* 12. *p.* 180.
*Bloch Eingew. p.* 29. *t.* 8. *f.* 1-6.
*Werm. verm. inteſt. p.* 75. *t.* 6. *f.* 144-148. *t.* 7. *f.* 153-159.
*Raub. de aſc. lumbric. Linn. Goett.* 1779.
*Pereboom deſcr. nov. gen. verm. Stomachida &c. Amſtel.* 1780.
*Habitat in* hominis inteſtinis, *praeſertim tenuibus, aliquando in ductum pancreaticum penetrans ſetarum defectu facile a lumbrico terreſtri dignoſcendus, cingulo nullo,* σιφωνυλις *Hippocratis, Lumbricus teres aliorum.*

veſperti- 3. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
lionis. *Habitat in* veſpertilionis auriti inteſtinis.

b. *mammalium.*

phocæ. 4. Aſc. pallida, inteſtino lacteo ſpirali. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250.

*Goez.*

*Goez. Eingew. p.* 73. *t.* 2. *f.* 9. 10.
*Habitat in* phocarum, virulinæ, groenlandicæ, hiſpidæ inteſtinis, $\frac{1}{2}$ 8 *pollices longa, utroque fine attenuata, poſteriore acuminata, adunca, tota pellucida.*

bifida. 5. Aſc. poſterius furcata, anterius curva ſetiformis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 3. *rar.* 2. *p.* 102. *prodr.* 2592. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 253.
*Habitat in* phocæ groenlandicæ inteſtinis, *aſc. phocae magnitudine, pallida, inteſtinis contortuplicatis, roſtro anterius acutiſſimo, ad cujus baſin porus pro proboſcide brevi.*

canis. 6. Aſc. cauda acuminata, capite applanato, membrana utrinque alato, valis ſpermaticis cincinnatis. *Wern. verm. inteſtin. cont.* 1. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 38. 40. *Goeze Eingew. p.* 81. 84.
*Barth. anat. cent.* 2. *p.* 318.
*Red. opuſc.* 3. *t.* 8. *f.* 1-4.
α) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
γ) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 73. *t.* 13, *f.* 8 *opuſc.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
*Habitat in* canis familiaris inteſtinis.

viſceralis. 7. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 308. *t.* 8. *f.* 1.
*Habitat in* canis familiaris renibus.

lupi. 8. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
*Habitat in* lupi inteſtinis.

vulpis. 9. Aſc. membranis capitis lateralibus retrorſum attenuatis. *Goeze Eingew. p.* 84.
*Froelich Naturf.* 24. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 30. 31.
*Klein. herpet. p.* 63.
*Habitat in* vulpis inteſtinis, *potiſſimum duodeno.*

leonis. 10. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75. & *p.* 309. *t.* 9. *f.* 3.
*Habitat sub* leonis pelle.

tigridis. 11. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 19.
*Act. acad. paris.* 1763. *p.* 47.
*Habitat in* tigridis intestinis.

felis. 12. Asc. capite vesicula utrinque oblonga posterius obtusa pellucida ex albo cinerascente. *Goeze Eingew. p.* 79. *t.* 1. *f.* 5. 9-13.
*Froelich Naturf.* 24. *p.* 141.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12. *t.* 13. *f.* 8.
*Habitat, utplurimum gregaria & taeniam serratam comitem habens, in* felis cati ventriculo & intestinis, *praesertim tenuibus.*

cati. 13. Asc. *Goeze Eingew. p.* 80.
*Habitat in* felis cati intestinis, *vesicularum capitis defectu ab asc. felis distincta.*

martis. 14. Asc. *Goeze Eingew. p.* 84.
*Habitat in* martis intestinis.

bronchialis. 15. Asc. albida contorta granulis quasi infarcta. *Wern. verm. int. ant.* 1. *p.* 9. *t.* 8. *f.* 20. 21.
*Habitat in* martis pulmonibus, *bronchiorum dichotomiae glomeratim adhaerens.*

renalis. 16. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 309. *t.* 9. *f.* 1.
*Habitat in* martis renibus. me-

---

Ascarides, *plurimae in intestinis obviae, utplurimum gregariae, valvula triplici ad caput instructae, quasi, dum nutrimentum hauriunt, affigant, [illegible] distincta, frequentius [illegible] bicorni gaudet. Plures [illegible] adeo ignotas, [illegible] & distinctas [illegible] Ad [illegible] Red. oper. 3. p. 8. [illegible] intestinis [illegible] vermes [illegible] spectant? [illegible] spectat ascaris acuta, a* Mullero *zool. dan* 3. *p.* 53. *dicta, & t.* 111. *f.* 1-5. *delineata?*

mephitidis. 17. Asc. *Red. anim viv. n. ar. viv. p.* 14.
*Habitat in* mephitidis intestinis.

gulonis. 18. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
*Habitat in* gulonis intestinis.

talpæ. 19. Asc. *Goeze Eingew. p.* 75. 87.
*Habitat in* talpæ intestinis & ventriculo.

muris. 20. Asc. cauda pennata, intestino obscuriori.
*Wern. verm. intest. cent.* 1. *p.* 10. *t.* 8. *f.* 1-7.
*Goeze Eingew. p.* 86. 87.
*Habitat in* musculi ventriculo, *annulata, feminae genitalibus triplici foramine hiantibus.*

hirci. 21. Asc. *Soemmer. ap. Goeze Eingew. p.* 175.
*Habitat in* hirci intestinis.

vituli. 22. Asc. filiformis cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 91. *t.* 2. *f.* 7. B.
*Cooper. Schrift. berl. Naturf.* 1. *p.* 115.
*Pall. de inf. viv. p.* 14.
*Valisn. op. t.* 34. 35. *f.* 2. 3.
*Cleiye. lumbr. t.* 10. 11. *f.* 2. 3.
*Habitat gregaria in* vitulorum per artem infectorum pulmonibus & tracheis, *vivipara.*

equi. 23. Asc. cylindrica magna. *Goeze Eingew. p.* 62. *t.* 1. *f.* 1-3.
*Bloch Eingew. p.* 30. *t.* 8. *f.* 4-6.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 72.
*Barthol. act. Havn.* 1. *p.* 87.
*Vandell. diss. p.* 71. *t.* 2. *f.* 6.
*Habitat in* equi intestinis, *inter congeneres gigas, ut fissa pedalis digiti minimi crassitie occurrat.*

fuis. 24. Asc. pallida, linea utrinque longitudinali subochracea. *Goeze Eingew. p.* 71. *Pall. inf. viv. p.* 14.

*Doc-*

*Doever. verm. int. p.* 67.
*Habitat in* ſuis feroſæ inteſtinis, *aſc. equi longitudine aequalis, at multo tenuior.*

apri. 25. Aſc. *Ebel Beſch. der berl. Naturf.* 3. *p.* 420. *Goeze Eingew. p.* 92. *t.* 2. *f.* 6.
*Habitat in* apri pulmone, *vivipara, friabilis, utrinque attenuata, fili tenuiſſimi craſſitie, pollicem circiter longa.*

c. *avium.*

aquilæ. 26. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 81.
*Habitat in* falconis chryſaeti inteſtinis.

albicillæ. 27. Aſc. *Bloch. Eingew. p.* 31.
*Habitat in* falconis Albicillæ inteſtinis.

buteonis. 28. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
*Habitat in* buteonis inteſtinis, *ventriculo vicinis.*

milvi. 29. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85. 126.
*Habitat ſatis magna ſpiraliter convoluta in* milvi inteſtinis, *ventriculo & recto propinquis an forſan duae ſpecies diſtinctae?*

ſubbuteonis. 30. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
*Habitat in* ſubbuteonis inteſtinis, *acui affinis.*

hermaphrodita. 31. Aſc. poſterius oblique truncata obtuſa breviter mucronata, aculeis duobus incurvis pone aperturam poſteriorem prominentibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 151. *t.* 4. *f.* 11-13.
*Habitat in* pſittaci aeſtivi inteſtinis tenuibus.

cornicis. 32. Aſc. *Soemmer. apud Goeze Eingew. p.* 75. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 83.
*Habitat in* cornicis ventriculo.

co-

coraciæ. 33. Aſc. alba lævis. *Friſch miſc. berol.* 3. *p.* 47. *Pallas inſ. viv. p.* 61. *Goeze Eingew. p.* 90. *t.* 2. *f.* 5. *Bloch. Eingew. p.* 31.
*Habitat ſub* cute jugulari coraciæ garrulæ.

cygni. 34. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80 ?
*Habitat in* cygni inteſtinis.

anatis. 35. Aſc. alba poſterius planiuſcula. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
*Goeze Eingew. p.* 85.
*Habitat in* anatis boſchadis inteſtinis, 4-6 *pollices longa vivipara.*

fuliguiæ. 36. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
*Habitat in* anatis fuligulæ interaneis, *ovipara.*

lari. 37. Aſc. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
*Habitat in* lari cinerei inteſtinis.

coniæ. 38. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86.
*Habitat in* coniæ inteſtinis.

tardæ. 39. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
*Habitat in* otidis tardæ interaneis.

papilloſa. 40. Aſc. ſubtus papilloſus, cauda in ſetam abeuntes aculeata. *Bloch. Eingew. p.* 32. *t.* 9. *f.* 1-6.
*Habitat in* otidis tardæ inteſtino, cæco & recto, 6-8 *lineas longa, crinis equini craſſitie, ovipara, cauda nunc una, nunc tribus ſetis terminata, ore cornibus* 2 *inaequalibus prope caudam, papillis in abdomine utplurimum* 4, *cui interdum quinta, & 3 minores ad utrumque caudae latus accedunt.*

gallopavonis. 41. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
*Habitat in* gallopavonis inteſtinis.

gal-

galli. 42. Aſc. capite uncinato, cauda acuta. *Goeze Eingew. p.* 75. 76. 85. 86. *t.* 1. *f.* 4. 7. 8.
*Habitat in* galli *junioris* & gallinæ inteſtinis.

gallinæ. 43. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
*Habitat in* gallinæ inteſtino cæco.

phaſiani. 44. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
*Habitat in* phaſiani picti inteſtino cæco, *an eadem cum aſc. gallinae?*

tetraonis. 45. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 82.
*Habitat in* tetricis interaneis.

columbæ. 46. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84. 85. *t.* 1. *f.* 6.
*Habitat in* columbæ domeſticæ inteſtinis.

alaudæ. 47. Aſc. *Vandell. diſſ. p.* 76.
*Goeze Eingew. p.* 125.
*Habitat in* alaudæ interaneis.

ſturni. 48. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
*Habitat in* ſturni vulgaris inteſtinis.

turdi. 49. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 77. 78. 85. *t.* 2. *f.* 1-3.
*Habitat in* turdi iliaci, viſcivori, pilaris inteſtinis, hepate.

d. *reptilium.*

teſtudinis. 50. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80.
*Habitat in* teſtudinis orbicularis interaneis.

lacertæ. 51. Aſc. cauda ſubulata. *Geeze Eingew. p.* 108.
*Doever. verm. p.* 57.

*Ha-*

*Habitat in* lacertæ paluſtris inteſtinis.

bufonis. 52. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93. 94. 434. *t.* 4. *f.* 1-3. & *t.* 35. *f.* 7-10.
*Habitat in* bufonis inteſtinis, *vivipara.*

pulmonalis. 53. Aſc. filiformis, inteſtino nigro, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 95-97. *t.* 5. *f.* 6-17.
*Habitat in* bufonis & rubetræ pulmonibus, *vivipara.*

rubetræ. 54. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 95. 97. 101.
*Habitat in* bufonis & rubetræ inteſtino recto, *vivipara.*

trachealis. 55. Aſc. cauda ſubulata, *Goeze Eingew. p.* 98. *t.* 2. *f.* 8.
*Habitat in* bufonis pulmonibus, *vivipara.*

ranae. 56. Aſc. cauda ſubulata, inteſtino clavato. *Goeze Eingew. p.* 101. *t.* 4. *f.* 4-9.
*Doever. verm. p.* 97.
*Habitat in* ranae temporariæ inteſtino recto, *vivipara.*

inteſtinalis. 57. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 100.
*Habitat in* ranae temporariæ inteſtinis.

dyſpnoos. 58. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98.
*Habitat in* ranæ temporariæ pulmonibus, *reſpirationem & natationem impediens, vivipara, fertiliſſima, ſpiraliter convoluta.*

infons. 59. Aſc. cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 98.
*Swammerd. bibl. nat. p.* 317.

*Ha-*

*Habitat in* ranæ temporariæ pulmonibus, *innoxia.*

e. *piscium.*

anguillæ. 60. Asc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86. *opusc.* 3. *p.* 231 ?
*Habitat in* murænæ anguillæ interaneis.

marina. 61. Asc. filiformis albidus lævis, plano spirali convolutus, intestino tubuloso.
*Sist. nat.* XII. 2. *p.* 1075. *n.* 4. *Mull. zool. dan. prodr.* 2578. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 166. *n.* 241. Gordius (marinus) filiformis plano spirali convolutus.
*Leeuwenh. arc. nat. p.* 370.
*Pall. inf. viv. intr. viv. p.* 16.
*Ascan. ic. rer. nat. t.* 7. *f.* a. b. c.
*Mull. Naturf.* 12. *p.* 183. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 208. 212.
*Brit. zool. t.* 20. *f.* 3.
*Habitat in* piscibus marinis, *potissimum* gadis, *visceribus utplurimum extus adhaerens, ad sesquipollicem longa, sub tecto suo immobilis, at in aquam conjecta mirifice se torquens, leprae norwegicae nequaquam causa.*

blennii. 62. Asc. *Muller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 216.
*Habitat ad & in* blenii vivipari intestinis, *partim in nodos convoluta.*

rhombi. 63. Asc. *Mul. Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 213.
*Habitat in* Pleuronecte Rhombo.

Percæ. 64. Asc. recta acicularis utroque fine incurva.
*Goeze Eingew. p.* 90.
*Habitat in* perca fluviatili.

globicola. 65. Asc. anterius obtusior subbifida, globulum mem-

membranaceum inhabitans. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 243.
*Fonſt. inſ.* 183? Vermis Bellonii in cernuis obvius.
*Habitat nuda globulo & incluſa in* gaſteroſteo aculeato, *ventriculi cuti exteriori adhaerens, gelatinoſa, laevis, planiuſcula, aquea, utroque fine lineaque longitudinali dorſi lacteis, 4 lineas longa.*

lacuſtris. 66. Aſc. plano ſpirali convoluta utrinque attenuata. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 242.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1076. *n.* 5. Gordius lacuſtris.
*Habitat in* gaſteroſtei aculeati inteſtinis, lucii hepate, *alba, laevis, an forte eadem cum globicola.*

filuri. 67. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Bloch. Eingew. p.* 31.
*Habitat in* glanide.

farionis. 68. Aſc. teres cineraſcens. *Goeze Eingew. p.* 77.
*Habitat in* farionis inteſtinis.

truttæ. 69. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93.
*Habitat in* farionis inteſtinis.

maraenæ. 70. Aſc. *Koelr. comm. petrop.* 18. *p.* 509.
*Habitat in* maraena.

Acus. 71. Aſc. recta rigida acicularis, utroque fine ſubincurvo. *Bloch Eingew. p.* 30. 31.
*Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 544. *Goeze Eingew. p.* 90.
*Mull. Naturf.* 14. *p.* 140. Aſcaris ſeta.
*Habitat in* lucii inteſtinis, *alba, ad 2 pollices longa.*

ha-

halecis. 72. Aſc. filiformis plano ſpirali convoluta.
*Bloch Eingew. p.* 33. *t.* 8. *f.* 7-10. Gordius harengum.
*Mull. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 212.
*Habitat in* halecis veſiculis ſeminalibus, *& exitus ad* intestina, *ad pollicem longa, crinis equini craſſitie.*

argentinæ. 73. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 88.
*Habitat in* argentina.

gobionis. 74. Aſc. cauda truncata. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 1-3.
*Habitat* circa cyprini gobionis hepar, *tenerrima.*

rajæ. 75. Aſc. poſterius attenuata integra, anterius ſetiformis ſubcurva. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 273. *n.* 253. *Mull. zool. dan. prodr.* 2593. *ic.* 2. *t.* 74. *f.* 1-3.
*Habitat in* rajæ fulloniæ ventriculo, *bifidae ſimilis & aequalis, cauda tamen non fiſſa, & cauſa abrupta, roſtro longiori, compreſſo, linea longitudinali, quaſi fiſſo diſcernenda.*

ſquali. 76. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89.
*Habitat in* ſqualo glaberrima.

lophii. 77. Aſc. rigida cornea glaberrima dilutius fuſca, intestino filoque multipliciter contorto lacteis globulo minimo ad caudam. *Muller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211. *zool. dan.* 3. *p.* 53. *t.* 111. *f.* 1-4.
*Habitat in* lophii piſcatorii *canali cibario, magna.*

f. *vermium.*

lumbrici. 78. Aſc. minutiſſima, cauda ſubulata, punctorum obſcurorum ordinibus duobus. *Goeze Eingew. p.* 110. *t.* 4. *f.* 10.

*v. Gleich. auserl. microsc. Entd. p. 58. t. 27. 28. Habitat in lumbricis, infra cutem & in humoribus, nudo oculo non usurpanda.*

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* elasticum, contortum: parte posteriori crasso clavato; anteriori capillari duplo longiori, ad finem interdum nodosa.

** capite simplici.*

hominis. 1. Tr. supra subcrenatus, subtus lævis, anterius subtilissime striatus.
*Mant. 2. p. 543.* Trichuris.
*Roeder. & Wagler. de morb. mucos. ed Wrisb. p. 62. t. 3. f. 4.* Trichuris.
*Roeder. Goett. gel. Anz. 1761. St. 25.*
*Wrisb. de animalc. infus. p. 6. & Roeder. & Wagl. de morb. muc. praefat.*
*Hopp verm. intest. hom. hist. p. 21.*
*Werm. verm. intest. p. 84-86. t. 6. f. 138-143.*
*Müller Naturf. 12. p. 182.*
*Bloch Eingew. p. 32. f. 7-9.*
*Goeze Eingew. p. 113. &c. t. 6. f. 1-5.*
*Blumenb. Naturg. p. 410.*
*Habitat in* hominis, *potissimum morbo mucoso laborantis, intestinis, rarior in tenuibus, frequentissimus in caeco, ad 2 pollices longus.*

equi. 2. Tr. *Goeze Eingew. p. 118. t. 6. f. 8.*
*Habitat in* equo, *2½ pollices longus, parte posteriore pollicari, anteriori sesquipollicari.*

apri.

Trichocephali *gregarii ovipari, quotquot hactenus novimus, in intestinis praesertim mammalium habitant; mares cauda spiraliter convoluta distincti.*

apri. 3. Tr. cauda utrinque ſquamis crenatis ornata. *Goeze Eingew. p.* 122. *t.* 6. *f.* 6. 7.
*Habitat in* apro, *humano aequalis.*

muris. 4. Tr. capite trinodi. *Goeze Eingew. p.* 119. *t.* 7. A. *f.* 1-5.
*Habitat in* muris inteſtinis, *medio fere inter duo denum & rectum loco, parte tenuiore veſiculis albis obſeſſa.*

vulpis. 5. Tr. capite acutiuſculo anguis, collo tranſverſim ſtriato: veſiculis unilateralibus. *Froelich Naturf.* 24. *q.* 142. *t.* 4. *f.* 25-29.
*Habitat in* vulpis inteſtino cæco.

** *capite uncinato.*

lacertæ. 6. Tr. cauda utrinque ſquamata. *Goeze Eingew. p.* 123. *t.* 7. A. *f.* 6. 7.
*Pallas nov. comm. petrop.* 19. *t.* 10. *f.* 6. *n. nordm. Beytr. p.* 111. Tænia Spirillum.
*Mull. Naturf.* 12. *p.* 182.
*Habitat in* lacertæ apodis inteſtinis.

FILARIA. *Corpus* teres filiforme, æquale, lævissimum, ore dilatato: labio ſubrotundo concavo.

* *hominis.*

medinenſis. 1. F. tota pallida.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1075. *n.* 3. Gordius medinenſis.
*Welſch monogr.* Vena medinenſis.

*Sloam.*

---

Filariæ, *a gordiis habitaculo & plurimæ cauda non uncinata diſtinctæ, ſæpius telam cellulo-ſam, rarius inteſtina inhabitant, ex piſcibus, amphibiis, vermibus exules, an ſingulæ pro animali, in quo degunt, diverſo, diverſæ ſpecies.*

*Sloam. jam.* 2. *p.* 190. *t.* 233. *f.* 1. Vena mediniensis.
*Kaempf. amoen. exot. p.* 524. Dræunculus Perfarum.
*Gallandat n. act. nc. coef.* 5. *app. n.* 3.
*Crun. act. ac. el. Erf. ad* 1777. *med. n.* 3.
*Habitat in* Guinea, America & Afia meridionali, *nudipedum obambulantium fervorum pedes intrans, dolorem febremque excitans, caute extrahendus, ad* 12 *pedes longus; mercurio fublimato corrofivo in fpiritu frumenti foluto intra* 20 *dies, qui alius demum poft* 40 *dies, educitur: An inter inteftinales locum meretur?*

** *mamalium.*

equi. 18. F. poflerius attenuata, cauda acutiffima incurvata.
*Abildgeard apud Mull. zool. dan.* 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 12.
*Habitat in* equini corporis cavis variis telaque cellulofa.

leonis. 2. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. *t.* 9. *f.* 2.
*Habitat in* leone.

martis. 3. F. *Red. anim viv. n. an. viv. p.* 15. *t.* 9. *f.* 1.
*Habitat in* marte.

leporis. 4. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
*Habitat in* leporum coxæ tela cellulofa.

*** *avium.*

falconis. 5. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
*Vandell. diff. p.* 75.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80.
*Habitat in* falconum tela cellulofa abdominali & crurali.

ftri-

ſtrigis. 6. F. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 83.
*Habitat in* ſtrigibus, *in tela cellulosa capitis, & aures cingente.*

cornicis. 7. F. *Pall. n. nord. Beitr.* 1. *p.* 83.
*Habitat in* cornicis thorace & pulmonibus.

coniæ. 8. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3 *p.* 223 ?
*Habitat in* ciconia.

gallinæ. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 126. *t.* 7. B. *f.* 8-10.
*Mull. Naturf.* 12. *p.* 187.
*Habitat in* gallinæ inteſtinis tenuibus, 2 *pollices longa, capillaris.*

**** *inſectorum.*
⊢ *perfectorum.*

ſcarabæi. 10. F. *Act. angl.* 1. *p.* 49.
*Habitat in* ſcarabæo ſimetario.

ſilphæ. 11. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
*Habitat in* ſilpha obſcura.

carabi. 12. F. *Pall. de inf. viv. p.* 12.
*Liſt. act. angl. n.* 81.
*Habitat in* carabo.

grylli. 13. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
*Friſch inſ.* 12. *p.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
*Roeſ. inſ.* 2. *p.* 58.
*Sulz. hiſt. inſ. p.* 81.
*Pall. it.* 1. *p.* 26.
*N. Mannigf.* 4. 1. *p.* 55. 117.
*Habitat in* gryllis.

monoculi. 14. F. *Walch Naturf.* 12. *p.* 64.
*Habitat in* monoculo apode.

*lar-*

⊢ ⊢ *larvarum.*

lepido-ptero-rum. papilio-num. poly-chlori. urticæ. betulæ. quercus. ſphin-gum. phalæ-narum.

15. F. cauda uncinata. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 98.

*a*) F. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.*6.

*b.* F. ex flaveſcente cinerea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*c.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*d.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*β*) F. ſphingis euphorbiæ. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 1. *p.* 20.

*γ*) F. *N. Mannigf.* 4. *app. p.*455.

quercus. cajæ. Ziczac. nuptæ. Pſi. ponio-nellæ.

*a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*b.* F. ſpadicea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

*c.* F. *Degeer inſ.* 1. *p.* 309. *t.* 34. *f.* 6-8.

*d.* F. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 4-6.

*e.* F. *Roeſ. inſ* 1. *phal.* 2. *p.* 65.

*f.* F. *Goeze Eingew. p.* 128.

*Habitat ſub* larvarum *cute, his perniciosiſſima, non raro ſolitaria*, 4, 5, 6, 7 *pollices longa, glaberrima, dura, utroque fine attenuata, anteriori obtuſiore, labiis quaſi* 3 *oblongis munito.*

tenthredinis.

16. F. *Act. Stockh.* 35. *p.* 181.

*Habitat in* tenthredinum larva.

phryganeæ.

17. F. *Degeer inſ.* II. 1. *p.*555. A. 14. *f.*12-14.

*Habitat in* phryganearum larvis.

UNCINARIA. *Corpus* filiforme elasticum, antrorsum obsolete noduloſum: labiis membranaceis angulatis.
*Cauda* feminæ aciculata, maris uncis 2 cuſpidatis veſicæ pellucidæ inclusis armata.

melis. 1. U. femina ſubrecta, maris uncis approximatis: veſica rotundata. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 136. *Goeze Eingew. p.* 106. A. B. *f.* 1-4. Aſcaris criniformis.
*Mull. Naturf.* 22. *p.* 55. Strongylus melis.
*Habitat in* melis inteſtinis craſſis.

vulpis. 2. U. femina ad angulum inflexa, maris uncis remotis quadricuſpidatis: veſica cordato-biloba. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 137. *t.* 4. *f.* 18. 19.
*Habitat in* vulpis inteſtinis craſſis, *praecipue recto.*

SCOLEX. *Corpus* gelatinoſum, polymorphum, anterius latiuſculum, poſterius acuminatum, nunc lineare & elongatum, nunc rugoſum & breve, teres, flexuoſum vel depreſſum, capite exſertili & retractili.

pleuronectis. 1. Sc. capite auriculis quaternis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 58. *par.* 2. *p.* 53. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206. 207. 210. 213.
*Habitat in* Pleuronectis Rhombi, Linguatulæ, Plateſſæ, Salmonis Lavareti & Cyclopteri Lumpi *muco inteſtinali, nudo oculo non diſtinguenda, capite colloque pellucidis, illo pone punctis 2 ſanguineis, utplurimum oblongis ſplendidis picto: auriculis in varias formas plicatilibus; hoc brevi: margine lunato, in vivis ſanguineo, capite ad taenias accedens.*

lo-

lophii. 2. Sc. *Mull. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 211.
*Habitat in* Lophii piſcatorii muco inteſtinali, *nudo oculo vix diſcernenda, an diverſa a ſc. pleuronectis ſpecies?*

## LIGULA. *Corpus* lineare æquale elongatum; anterius obtuſum, poſterius acutum ſutura dorſali impreſſa.

inteſtinalis. 1. L. albiſſima anguſtiſſima.
*Bloch Eingew. p.* 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
*Goeze Eingew. p.* 183. *t.* 14. *f.* 1-3.
*Habitat in* mergi minuti, *albelli* & mergenſeris *colymbi auriti* inteſtinis, *abdomine adeo pectore ad pedem uſque longa, faſciam exacte referens.*

abdominalis. 2. L. cineraſcens latiuſcula. *Goeze Eingew. p.* 187.
*Syſt. nat.* VI. *p.* 70. *t.* 6. *f.* 1. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2076. *Amoen. acad.* 2. *p.* 71. *act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 6. Faſciola (inteſtinalis) linearis longa.
*Bloch Eingew. p.* 2. Ligula piſcium.
*Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 549. Fiek.

cobitidis. α) L. *Bloch Eingew. p.* 2.

cyprinorum. β) L. *Goeze Eingew. p.* 187.
*Gronov. act. helv.* 2. *p.* 374.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94. Tænia cingulum.

gobionis. *a.* L. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549.

trincæ. *b.* L. *Bonnet inſectol. Abh. p.* 62.

caraſſii. *c. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 100.

leuciſci. *d. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 95.
*Bloch Beſch. d. berl. Naturf.* 4. *p.* 549.

alburni. *e. Bloch Eingew. p.* 2.

vimbæ. *f. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94.
*Bloch Eingew. p.* 2.
*Goeze Eingew. p.* 189. *t.* 16. *f.* 7. 9.

bramæ. *g. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 96. *elench. zooph. p.* 414.
*Bloch Eingew. p.* 2.
*Beschr. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549.
*Goeze Eingew. p.* 187. *t.* 16. *f.* 4-6.
*Ruysch observ. anat. n.* 64. *opp.* 1. *p.* 61. *t. f.* C.
*Habitat in* piscium abdomine, *praesertim* mesenterio, *pisces emacians, deformans, abitura cutem perterebrans, nunc solitaria, nunc gregaria,* $\frac{1}{2}$ *lineam crassa,* $\frac{1}{2}$-5 *pedes longa.*

STRONGYLUS. *Corpus* teres elongatum, pellucidum glabrum, anterius globosa truncatum: apertura circulari margine ciliata, posterius in femina integrum acuminatum, in mare in membranas pellucidissimas laxas distantes dilatatum.

equinus. 1. Str. capite opaco, intestino nigro. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 42. *f.* 1-12. *rar.* 2. *p.* 6.
*Barthol. act. havn.* 1. *p.* 37.
*Goeze Eingew. p.* 137. *t.* 9. B. *f.* 10. 11.
*Habitat gregarius in* equi ventriculo; *mas pallidus luteus, membrana flavicante subtilissima intervenea involvente, cauda triphylla: inter membranulas nunc e papillula exeunte spiculo simplici oppositis* 3 *laciniis munito, nunc praeter uncum spiculi duplici utroque tricuspide, feminae intestinum involventibus vasculis, filiformibus albis.*

ovinus. 2. Str. *O. Fabr. apud Mull. zool. dan. rar.* 2. *p.* 8.
*Habitat in* ovium intestinis.

ECHI-

Strongyli *ovipari, hactenus non nisi in mammalium canali cibario reperti.*

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres : proboſcide cylindrica retractili echinata.

a. *mammalium.*

phocæ. 1. E. pallidus, inteſtino lacteo ſpirali.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250. Aſcaris phocæ.
*Habitat gregarius in* phocæ groenlandicæ & hiſpidæ inteſtinis, *quam non raro fere conſumit*, 3½-8 *pollices longus, pellucidus, membranaceus, utroque fine attenuatus, poſteriori acuminatus, aduncus.*

tubifer. 2. E. albidus glaber, poſterius in ſetam attenuatus.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 2. *prodr.* 2591. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 251. Aſcaris (tubifera) albida, antice roſtro cylindrico quaſi prolongata.
*Habitat in* phocæ barbatæ ventriculo, *vix pollicem longus.*

Gigas. 3. E. candidiſſimus, collo nullo proboſcide vaginata : aculeorum uncinatorum ordinibus pluribus, papillis ſuctoriis ſenis. *Goeze Eingew. p.* 143. *t.* 10. *f.* 1-6.
*Bloch Eingew. p.* 26. *t.* 7. *f.* 1-8.
*Pall. comment. Petrop.* 19. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 3. & *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. Tænia hirudinacea.
*Mull. Geſch. der daen. u. norw. Th.* 1. *p.* 136. b.
*Habitat in* porcorum, *praeſertim in ſtabulo ſaginatorum*, inteſtinis, *gregarius, in apro magis caeruleſcens*, 12 *pollices ad* 1½ *pedes longus, proboſcidis filamentis quaſi ligamentis duobus lateralibus, aculeis fuſciantibus, ovulis primo hyalinis, maturis margine fuſceſcentibus.* ba-

balaenæ. 4. E. *Phips it. p.* 103. *t.* 7. *f.* 1. A. B. C.
*Habitat in* balaenæ inteſtinis.

b. *avium.*

butconis. 5. E. candidiſſimus, veſiculis caudæ cæruleſcentibus lentiformibus. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 12. *f.* 1. 2. A.
*Habitat in* buteonis inteſtinis, 2¼ *pollices longus.*

ſcopis. 6. E. proboſcidis aculeis numeroſiſſimis. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 11. *f.* 13.
*Habitat in* ſtrigis ſcopis inteſtinis craſſis.

aluconis. 7. E. corpore ſubrugoſo opaco, proboſcide incraſſata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-4. *inf. rar.* 2. *p.* 86.
*Habitat in* Strigis Aluconis inteſtinis, *flexuoſus, proboſcide aculeis innumeris armata, in centro apicis pertuſa.*

ſtrigis. 8. E. proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 153. *t.* 11. *f.* 8-12.
*Habitat in* ſtrigis ſtridulæ inteſtinis craſſis.

pici. 9. E. candidus, collo nullo, proboſcidis aculeis ferratis. *Goeze Eingew. p.* 150. *t.* 11. *f.* 1-5. & A.
*Habitat in* pici erythrocephali & viridis inteſtinis, *gregarius*, 1½ *pollices longus, proboſcidis aculeis minimis.*

boreales. 10. E. anatis molliſſimæ.
*Phips it. p.* 103. *t.* 7. *f.* 1. Sipunculus Londix.
*Habitat in* anatis molliſſimæ inteſtinis.

boſchadis. 11. E. collo filiformi, proboſcide ſubechinata.
*Goeze Eingew. p.* 163. *t.* 13. *f.* 5. 7.
*Habitat in* anatis domeſticæ inteſtinis. ana-

anatis. 12. E. coccineus ovatus, thorace proboscideque undique uncinatis: collo longo lævi intermedio. *Goeze Eingew. p.* 164. *t.* 13. *f.* 1. 2.
*Habitat in* anatis fuscæ intestinis.

mergi. 13. E. capite colloque armato. *Bloch Eingew. p.* 28. *t.* 7. *f.* 9-11.
*Habitat gregarius in* mergi minuti intestinis, 1-1½ *pollicem longus.*

alcæ. 14. E. anterius subtus rugis lateralibus medietatem elevatam includentibus.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 8. *prodr.* 2597. *rar.* 2. *p.* 106. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 276. *n.* 257. Ascaris alcæ.
*Habitat in* alcæ picæ intestinis, *ad* 4 *pollices longus, albus, dorsi linea longitudinali nigra, teretiusculus, antrorsum acutiusculus, subtus planus, posterius subprismaticus sine exquisite acuto. an hujus generis?*

ardeæ. 15. E. striatus, proboscide clavata. *Goeze Eingew. p.* 152. *t.* 11. *f.* 6. 7.
*Habitat in* ardea cinerea, *posterius conicus, medio utrinque sinuato.*

gazæ. 16. E. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 85. *t.* 15. *f.* 13. *opusc.* 3. *p.* 229. *t.* 21. *f.* 9.
*Habitat in* ardea alba.

vanelli. 17. E. caudæ vesica alba: centro albo. *Goeze Eingew. p.* 155.
*Habitat in* vanelli intestinis *mediis.*

merulæ. 18. E. ovatus, thorace aculeato. *Goeze. Eingew. p.* 165.
*Habitat in* merula, & fringilla montana.

C.

c. *reptilium.*

ranæ. 19. E. candidus, proboſcide intus filamentis duobus tenellis albis directa. *Goeze Eingew. p.* 159. *t.* 12. *f.* 10. 11.

*Pall. Comment. petrop.* 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. a. A. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109. *t.* 3. *f.* 37. Tænia hæruca.

*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 82. *opuſc.* 3. *p.* 221.

*Habitat gregarius in* ranarum, *praeſertim* temporariæ, inteſtinis, *fixus interdum vireſcens aut cineraſcens.*

falcatus. 20. E. proboſcide longa longitudinaliter uncis multifariam armata, anteriori litura, poſteriori fine puncto pellucido. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 117. *t.* 4. *f.* 22-24.

*Habitat in* ſolamandræ inteſtino duodeno prope pylorum.

d. *piſcium.*

anguillæ. 21. E. corpore candido lævi, proboſcide globoſa. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *med. rar.* 2. *p.* 84. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 204.

*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 87. *opuſc.* 3. *p.* 234.

*Leeuwenh. arc. nat. p.* 313. 314. *f.* 1. 2.

*Habitat in* murænæ anguillæ inteſtinis, *opacus, proboſcide collo ſuffulta, uncinorum quinorum vel ſenorum ſeriebus* 6-8 *armata; mas poſterius globulis* 7 *opacis, canaliculo ſerie duplici concatenatis*

---

Echinorhynchi *firmiſſime animalium, quae inhabitant viſceribus, utplurimum inteſtinis ſaepe per totam vitam uni eidemque loco infixi, utplurimum gregarii, in homine hactenus non inventi, corpore tereti non articulato ſatis a taenia diſtincti, proboſcidis uncinis nudis immobilibus; mares feminis utplurimum oviparis minores ſaepiſſime plane ſegregati in alio individuo habitant: An, quam* O. Fabricius *in blennio viviparo,* Acharius *in lota* O. Fr. Muller *in belone, invenerunt, diſtinctae ſpecies?*

*tis conſpicuus, femina duplo longior, & ova continens ovalia, ob fetus lineares.*

xiphiæ. 22. E. xiphiæ gladii. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89. *t.* 24. *f.* 7. *op.* 3. *t.* 19. *f.* 1.
*Habitat in* xiphiæ inteſtinis, *quae ſaepe perforat.*

candidus. 23. E. corpore opaco ſubrugoſo albo. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 139. *t.* 37. *f.* 7-10. & 2. *t.* 34. *f.* 7. *rar.* 1. *p.* 92. & 2. *p.* 105. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205. 209. 214.
O. *Fabr. fn. groenl. p.* 275. *n.* 256. Aſcaris verſipellis.
*Acharius n. act. Stockh.* 1780. I. 1. *n.* 5. Acanthrus ſipunculoides.
*Goeze Eingew. p.* 157.
*Habitat in* gadorum, callariæ, barbati, merlangi, blennii ranini, pleuronectis plateſſoidis, parcæ cernuæ & fluviatilis, cyprini ibari inteſtinis, *ad* 3 *pollicum longitudinem ſe expandens, aequalis craſſitiei, interdum cinerascens aut flavescens, fuſcus, fulvus, croceus, rubicundus, violaceus pro indole fluidi, in quo degit, proboſcide uncinorum* 9-15 *ordinibus* 9-16 *armata, mas minor, ſaepiſſime plane ſeparatus a femina habitans.*

lineolaris. 24. E. corpore lineolis tranſverſis fuſcis medio interruptis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 142. *t.* 37. *f.* 11-14. *rar.* 1. *p.* 96.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2599. Echinorhynchus (gadi) proboſcide cylindrica inflexa, corpore filiformi rugoſo.
*Pallas zooph.* 415. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 36. *nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 452. *t.* 9. *f* 2. Tænia Hæruca.
*Habitat in* gadorum inteſtinis, *ad* 2 *pollices longus, proboſcide minuta.*

lon-

longicollis. 25. E. albo-rufescens, capite rotundato longitudinaliter striato, collo filiformi, proboscide subechinata. *Goeze Eingew. p.* 162. *t.* 12. *f.* 12-14.

*Habitat in* Callariæ intestinis, *proboscidis uncis minimis.*

pleuronectis. 26. E. corporis lateribus undulatim impressis. *Mull. Naturf.* 10. *p.* 150.

*Habitat in* pleuronectis maximi intestinis; *an vere distincta species?*

attenuatus. 27. E. globiferus, corpore æquali flavo lævi, collo filiformi. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 137. *t.* 37. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 89.

*Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 110. *t.* 3. *f.* 38. Tænia longicollis.

*Habitat rarior & minus numerosus in* flesi intestinis, *pellucidus, aequalis ubique crassitiei, posterius rotundatus obtusus, proboscide ligamento utrinque adnexo.*

annulatus. 28. E. globiferus, corpore acuminato, collo rugoso. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 138.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2601. Echinorhynchus (lævis) proboscide echinata prope apicem in sphæram lævem dilatata.

*Habitat in* Cotti Scorpii, Callariæ & Bramæ intestinis, *attenuato proxime affinis.*

plateſoidæ. 29. E. rostro attenuato, posterius cingulo elevato terminali.

*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 5. *prodr.* 2504. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 207. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 274. *n.* 254. Ascaris pleuronectis.

*Habitat in* pleuronectis platessoidæ ventriculo, 2½ *pollices longus, pallidus laevis.*

per-

percæ. 30. E. mollis rugosus utrinque obtusus. *Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109.
*Mull. zool. dan.* 1. *p.* 140. *par.* 1. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205.
*Habitat in* percæ fluviatilis intestinis ; *an vere distincta species ?*

cernuæ. 31. E. percæ cernuæ. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 140. *rar.* 1. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 214.
*Habitat in* percae cernuæ intestinis, *uncinorum proboscidi seriebus* 10-12 ; *an propria species ?*

cobitidis. 32. E. striatus, proboscide clavata. *Goeze Eingew. p.* 158. *t.* 12. *f.* 7-9.
*Habitat in* cobitidis barbatulæ intestinis.

Salmonis. 33. E. corpore clavato lævi, proboscide cylindrica. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *super. rar.* 2. *p.* 83.
*Habitat in* Salaris intestinis, *albus*, *glaber*, opacus, *anterius ventricosus*, *posterius acuminatus*, *proboscide minus echinata*, *quam in congeneribus.*

fublobatus. 34. E. albus globifer posterius ad latera fublobatus, collo cylindrico annulato, proboscidis coronis uncinorum denorum sedecim. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 172. *t.* 4. *f.* 8-10.
*Habitat in* salaris junioris intestinis, *candido quadruplo minor*, *annulato proxime affinis.*

quadrirostris. 35. E. candidus, cauda rotunda corpori intrusa, proboscide quadruplici. *Goeze Eingew. p.* 166. *t.* 12. *f.* 3-5.
*Habitat in* Salaris hepate, *proboscidis uncinis innumeris ; an hujus generis ?*

truttæ. 36. E. *Goeze Eingew. p.* 157. *t.* 12. *f.* 5. 6.
*Habitat in* farionis intestinis, *rubellus*, *praelongus.*

ma-

maræ- næ. 37. E. fusiformis lævis subrugosus, pone attenuatus obtusiusculus.
*Martin & Acharius n. act. Stockh.* 1780. *p.* 44. &c. *t.* 2. *f.* 1. 2. Acanthrus sipunculoides.
*Habitat in* maræna intestinis.

lucii. 38. E. corpore pellucido lævi. *Mull. zol. dan.* 1. *p.* 138. *t.* 37. *f.* 4-6. *var.* 1. *p.* 90. *Naturf.* 12. *p.* 188. *t.* 5. *f.* 1-5. *Besch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 543. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 203.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109.
*Goeze Eingew. p.* 156. *t.* 12. *f.* 3. 4.
*Habitat in* lucii intestinis, *flavicans, posterius angustior & obtusus.*

argentinæ. 39. E. *Barthol. act. havn.* 2. *p.* 225.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 87.
*Habitat in* argentina.

alosæ. 40. E. filiformis, anterius clavatus rubicundus, aculeorum seriebus sex laxioribus armatus, proboscide pallida, aculeorum seriebus octo densioribus. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 11. 12.
*Habitat in* alosæ intestinis, 2 *pollices longus, proboscide cylindrica, medio paulo crassiori, collo brevi, saturatius rubro, aculeorum circulis* 2 *armato.*

barbi. 41. E. ovatus flavus, fasciatus, collo longo albo cylindrico ad finem cyathiformi. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 83. *t.* 3. *f.* D-H.
*Habitat in* cyprini barbi intestinis, *e. lucii affinis.*

carpionis. 42. E. cyprini carpionis.
*Koelreuter nov. comm. Petrop.* 15. *p.* 500. *t.* 26. *f.* 5. Acanthocephalus.
*Habitat in* carpionis intestinis.

idba-

idbari. 43. E cyprini idbari. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 140. *Habitat in* idbari inteſtinis, *candido proxime affinis.*

affinis. 44. E. cyprini rutili. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 136. *Habitat in* cyprini rutili inteſtinis.

rutili. 45. E. proboſcide tuberoſa apice aculeata, altero corporis latere unico, altero quatuor oſculis notato. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 61 *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 61.
*Habitat rariſſimus & ſolitarius in* cyprini rutili inteſtinis, *elongatus, contractus utroque fine obtuſus, expanſus anteriore acuminatus, proboſcide poſterius anguſtata apice aculeis 6 rectis ſingulis globulo affixis armata.*

bramæ. 46. E. collo filiformi, proboſcide aculeis minimis armata. *Goeze Eingew. p.* 163.
*Habitat in* bramæ inteſtinis.

lophii. 47. E. lophii piſcatorii. *Muller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211.
*Habitat in* lophii piſcatorii inteſtinis, *albus, glomeratus*

ſturionis. 48. E. rotundatus albus. *Goeze Eingew. p.* 157.
*Habitat in* ſturionis inteſtinis, *candido affinis.*

HÆRUCA. *Corpus* rotundatum: fine anteriori bicolli ſimplici aculeorum corona cincto, proboſcide nulla.

muris. 1. H. ex albo cinerascens rugoſa.
*Goeze Eingew. p.* 138. *t.* 9. B. *f.* 12. Pſeudoechinorhynchus.
*Habitat in* muſculi ventriculo, *proboſcidis retractilis defectu ab echinorhyncho diverſa.*

CU-

CUCULLANUS. *Corpus* posterius acuminatum; anterius obtusum, ore orbiculari, cucullo striato.

a. *mammalium.*

talpæ. 1. C. talpæ europææ. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 8. *f.* 7. 8.
*Habitat gregarius membranae inclusus in* adipe peritonæi talpæ europææ, *in spiram contortus.*

ocreatus. 2. C. corpore fasciolato, cauda ocreata. *Goeze Eingew. p.* 182. *t.* 15. *f.* 6. 7.
*Habitat in* talpæ europææ intestinis, *gregarius, oviparus, 2 pollices longus, culmum stramineum mentiens.*

muris. 3. C. *Goeze Eingew. p.* 242.
*Habitat in* muris intestinis tenuibus.

b. *avium.*

buteonis. 4. C. falconis buteonis. *Goeze Eingew. p.* 85.
*Habitat in* buteonis intestinis.

c. *reptilium.*

ranæ. 5. C. cauda foliacea. *Goeze Eingew. p.* 98.
*Habitat in* ranæ temporariæ intestinis.

d. *piscium.*

lacustris. 6. C. rufus, anterius truncatus. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 146. *prodr.* 2596.

a.

Cucullani *plurimi vivipari frequentissime in intestinis, præsertim piscium, rarius in alio viscere habitant.*

α. C. murænæ anguillæ. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 9. A. *f.* 1. 2. *Beſch. der berl. Naturf.* 3. *p.* 493.
*Leeuwenh. arc. nat.* 2. *p.* 313.

percæ. β. C. percæ fluviatilis. *Goeze Eingew. p.* 132. *t.* 9. B. *f.* A. B. 4-9.
*Mull. Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205. 2. *p.* 133. *t.* 1. *f.* 8-14.
*Bloch Eingew. p.* 34. *t.* 10. *f.* 1-4.

lucio-percæ. γ. C. percæ luciopercæ. *Goeze Eingew. p.* 131. *t.* IX. a. *f.* 3.
*Mull. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 217.

cernuæ. δ. C. percæ cernuæ. *Mull. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 214. 2. *p.* 133.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p* 103. 104.

farionis. ε. C. ſalmonis farionis. *Goeze Eingew. p.* 133.

ſalaris. ζ. C. ſalmonis ſalaris. *Goeze Eingew. p.* 133. *t.* 8. *f.* 9. 10.
*Habitat in* piſcium *aquas dulces inhabitantium* inteſtinis, ζ) *etiam in* hepate, *fertiliſſimus.*

aſcaroides. 7. C. capite orbiculari utrinque uncinato, cauda rotundata brevi acuminata: ſpiculis binis exſertis. *Goeze Eingew. p.* 134. *t.* 8. *f.* 11-16.
*Habitat in* Siluri Glanidis ventriculo, *larvis muſculae ſimilis ad aſcarides accedens, pollicem longus, ex albo cineraſcens, gregarius.*

marinus. 8. C. cinereo luteus, anterius obtuſus. *Muller zool. dan.* 1. *p.* 144. *f.* 1-11. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 209.

cirratus. α. C. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 1-7. *rar.* 1. *p.* 99.

muticus. β. C. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 8-11. *rar.* 1. *p.* 99.
*Habitat in* gadorum *plurimorum* inteſtinis, *ovipara, elongatus, flexuoſus, teres, pellucidus ſubtiliſſime tranſverſe ſtriatus, inteſtino fuſco, capite*

*te latiore, suborbiculato, anterius quasi adusto, mare ad caudam prope anum aculeo nigricante setaceo bicuspide armato, feminae in corporis medio tuberculo rima notato.*

CARYOPHYLLÆUS. *Corpus* teres: ore fimbriato.

piscium. 1. C. *Goeze Eingew. p.* 180. *t.* 15. *f.* 4. 5. *Bloch Eingew. p.* 34. *t.* 6. *f.* 9-13.
*Habitat in* piscium, *aquas dulces inhabitantium, potissimum* cyprinorum, carpionis, tincæ, jesis, bramæ intestinis, *rarior, margaritaceus, ad pollicem longus, reliquis intestinalibus vitae tenacior, fine posteriori rotundato, anteriore latiori.*

LINGUATULA. *Corpus* depressum oblongum. *Os* anterius ostiis 4 cinctum.

serrata. 1. L. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 148. *t.* 4. *f.* 14. 15.
*Habitat in* leporis timidi pulmonibus

278. FASCIOLA. *Corpus* planiusculum, poro duplici, rarius solitario.

a. *hominis.*

humana. 2. F. hominis. *Doever. verm. p.* 54. *Cleric. lumbr. p.* 119.

b.

---

Fasciolæ *androginæ, oviparæ præter intestina alia quoque frequenter, non nullæ species non nisi ossa viscera inhabitant, intestinis flexuosis, ovariis lateralibus conspicuæ; an quas* Redi *in lepore,* Cl Merrem *in mure,* O. Fabricius *in perca fluviatili & trinca, alii in scombro invenerunt, intestinales a reliquis hujus generis species?*

b. *mammalium.*

vulpis. 4. F. orbicularis, capite craſſo rotundato arcu circulari a trunco ſeparato, parte poſteriori ad latera repanda, caudæ appendicibus utrinque duabus cylindricis membranaceis. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 11-13.
*Habitat in* vulpis inteſtinis, *an hujus generis?*

putorii. 5. F. minutus ſubrotunda, poris duobus approximatis. *Goeze Eingew. p.* 175. *t.* 14.
*Habitat in* Muſtelæ Putorii inteſtinis, $1\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

melis. 6. F. craſſa, capite triangulari. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 9. 10.
*Habitat in* melis inteſtinis, *brevis.*

veſpertilionis. 3. F. elongata teres, inteſtinis rubris. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 12-16.
*Goeze Eingew. p.* 171. *t.* 14. *f.* 1-3.
*Habitat in* veſpertilionis auriti inteſtinis, *quae ſaepe perforat, ex rubro fuſca, carneſa, punctis minimis tranſverſim ſtriata, hermaphrodita.*

hepatica. 1. F. ovata ſubpetiolata. *En. ſuec.* 2075. *it. goth.* 200. *Pall. inſ. viv. p.* 27.
*Mull. verm. terr. & fluviat. hiſt.* 1. 2. *p.* 7. 52. *zool. dan.* 1. *p.* 103. *prodr.* 2707. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 327. *n.* 312. Faſciola depreſſa ovata fuſco albida, antice tubulo inſtructa.
*Schaeffer monogr. von Egelſchn. f.* 1-17.
*Amoen. acad.* 2. *p.* 86. 185. 189. Limax ovatus lividus margine acuto.
*Bloch Eingew. p.* 5. *t.* 1. *f.* 3. 4.
*Goeze Eingew. p.* 55. 179. Planaria latiuſcula.
*Aldrov. inſ. l.* 7. *p.* 722.
*Leeuwenh. arc. nat. p.* 147.

*Barthol. act. Havn.* 3. *p.* 133. f.
*Cleric. lumbr. p.* 141. *t.*9. *f.* 2. & *t.*12. *f.* H. M.
*Brauners tank wid.*
*Smoets. och. mytt. af. bosk. och. fiäderfä. p.* 12. *t.*3. *f.* 5.
*Bianchi hep. p.* 342.
*Lesk. Naturg. p.* 507.
*Act. angl.* 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.
*Bresl. Samml. p.* 694. *f.* 1-4.
*Act. helvet.* 5. *p.* 374.

boum. β. F. *Goeze Eingew. p.* 170. 171. 205.
*Mull. Naturf.* 18. *p.* 35. *t.* 4. *f.* 11.
*Aldrov. ins. l.* 7. *p.* 133. f.
*Falck Viehseuch. t.* 2. *f.* 6. 7.

porcorum. γ. F. *Goeze Eingew. p.* 171.

apri. δ. F. *Cleric. lumbr. p.* 119.

cervi. ε. F. *Borlac. cornub. t.*24. *f.*10. Porus cervinus.
*Cleric. lumbr. p.* 119.

equi. ζ. F. *Buffon. hist. nat.* IV. *p.* 174. &c.
*Habitat in* ovium, boum, suum, equorum, elaphorum, capreolorum hepate & ducta choledocho, *androgyna, ovipara, poro duplici hepati infixa, hydropem ascitem excitans, ad pollicem longa, anterius latior, tubuloque terminata, fusca vel ex fusco albida.*

elaphi. 7. F. conico ovata, sphinctere amplissimo: ore assurgente remoto.
*Zeder Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 65. *t.* 3. *f.* 8-11. Festucaria cervi.
*Habitat in* cervi elaphi *ventriculo gregaria, poro unico, villis adhaerens.*

c. *avium.*

bilis. 8. F. torosa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 61. *t.* 3. *f.* 4. 5.
*Habitat in* falconis melanuati *cystide felleo, gregaria.*

bu-

buteonis. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 85.
*Habitat in* buteonis intestinis tenuibus, *poro duplici.*

milvi. 10. F. plana, poro duplici, intestinis frondosis. *Goeze Eingew. p.* 173.
*Habitat in* milvi intestinorum tenuium muco, *minuta.*

strigis. 11. F. teretiuscula, poro simplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 14. *f.* 4-6.
*Habitat in* strigis intestinis, *an hujus generis?*

pusilla. 12. F. minutissima polymorpha vitæ tenax cystidi inclusa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 63. *t.* 3. *f.* 6. 7.
*Habitat in* strigis Aluconis *thorace in* erinaceo europhio *sub cute*, *an hujus generis?*

anatis. 13. F. rufescens teretiuscula poro simplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 13. *f.* 8-11. *Naturf.* 14. *p.* 137.
*Bloch Eingew. p.* 35. *t.* 10. *f.* 5-7. Cuculanus conoideus.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 54. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 39. Hirudo fasciolaris.
*Mull. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 206.
*Habitat in & ad* anatis domesticæ intestina, *parva, pellucidissima, interdum alba, antrorsum in triangulum apice truncatum terminata, posterius rotundata, statura media filiformi nigra transversim curvata, margines versus bifurca, intestino flexuoso nigricante, ovariis lateralibus; an hujus generis?*

anseris. 14. F. oblongo-ovata, subtus papillis oppositis bifariam digestis, poris approximatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 112. *t.* 4. *f.* 5-7.

*Habitat in* anseris domestici *pascentis* intestino recto.

gruis. 15. F. *Bloch Eingew. p.* 35. *t.* 10. *f.* 5-7.
*Habitat in* gruis intestinis; *an distincta ab fasciola anatis?*

ardeæ. 16. F. suborbicularis. *Goeze Eingew. p.* 177. *t.* 15. *f.* 1.
*Habitat copiosissima in* ardeæ stellaris intestinis, *quae perforat.*

d. *reptilium.*

salamandriæ. 17. F. oblonga sublinearis, mota lagenam æmulans, poris remotis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 119. *t.* 4. *f.* 8-10.
*Habitat in* salamandræ nigræ intestino recto.

ranæ. 18. F. subclavata ore sessili. *Pallas inf. viv. p.* 29. *n.* 1. 2. *Goeze Eingew. p.* 93. 178. *t.* 15. *f.* 2. 3. *Swammerd. bibl. nat. p.* 317.
*Habitat in* ranæ pulmonibus, hepate, intestinis, *tardissime se movens, nunc in globum contrahens, nunc in fasciam expandens.*

uncinulata. 19. F. uncinulis duobus elasticis in parte posteriori armata. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 1-3.
*Habitat in* rana esculenta *sub integumentis abdominis communibus, nunc solitaria, nunc gemina, nunc gregaria, gradiendo hirudinem aemulans.*

e. *piscium.*

binodis. 20. F. elongata teres, poro laterali papillari caudata. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 8. *prodr.* 2717. *rar.* 1. *p.* 69.

*Ha-*

*Habitat in* piscium intestinis, *aequalis, poris papillaribus, anteriori majore, finem anteriorem complectente, cauda filiformi, dimidia corporis longitudine.* Zoega.

disticha. 21. F. elongata teres poro laterali porrecto excavato. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 9. *prodr.* 2716. *rar.* 1. *p.* 69.

*Habitat in* piscium intestinis, *magnitudine ad f. lucii accedens, rugosa, retrorsum attenuata, fine anteriori subbifido: laciniis inaequalibus apice excavatis.* Zoega.

anguillæ. 22. F. *Leeuwenh. arc. nat. p.* 316. *f.* 6.

*Habitat in* anguilla.

scabra. 23. F. elongata teres, seriatim denticulata. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 51. *f.* 1 8. *rar.* 1. *p.* 31.

*Habitat in* gadi barbati ventriculo, *oculo nudo vix conspicua, vivida, pellucida, sphaerulam duriorem & foveatam ex ore protrudens, transversim striata, margine serrulata, vase duplici albo filiformi, alioque flexuoso nigricante ovis farto per totam corporis longitudinem excurrente.*

æglefini. 24. F. linearis depressiuscula, collo nulla. *Mull. zool. dan. p.* 106. *t.* 30. *f.* 4. *prodr.* 2712. *rar.* 1. *p.* 65.

*Habitat haud rara in* æglefini intestinis, *semipollicaris, cinerea, utroque fine rotundata.*

blennii. 25. F. linearis plana, collo elato basi divergente truncato. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 106. *t.* 30. *f.* 5. 2. *t.* 78. *f.* 9. 14. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 66. *et* 2. *p.* 116. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 217.

*Bloch Eingew. t.* 2. *f.* 10. 11.

*Habitat in* blennii vivipari muco intestinali, *oculo nudo non conspicua, alba, pellucida, in angulum obtu-*

*obtusum utplurimum curvata, poro laterali majore in angulo corporis, saliente prominente, vesiculas albas 2, terminali unicam comprehendente.*

scorpii. 26. F. elliptica, altero fine papilla minima perforata, collo nullo. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 1. *prodr.* 2709. *rar.* 1. *p.* 64.
*Habitat in* cotti Scorpii intestinis, *nudo oculo non usurpanda, pellucida, utroque fine obtusa, ex albo cinerea, ovulis farta.*

plateſſæ. 27. F. elliptica viridis. *Muller zool. dan.* 2. *t.* 78. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 114.
*Habitat in* plateſſæ muco intestinali, *minutissima, ut nudum oculum subterfugiat, opaca, in 3 arcas virides totidemque albas alternantes divisa, poro terminali ampio, laterali in medio, ovis saturate viridibus.*

lucio-percæ. 28. F. ovato oblonga subventricosa, collo brevi; pori terminalis margine dilatato lævi. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 2. *prodr.* 2710. *rar.* 1. *p.* 64.
*Habitat in* luciopercæ intestinis, *granuli arenæ magnitudine, fuscescens, collo cylindrico, poro laterali prominulo, retrorsum angustior.*

percæ. 29. F. ovata ventricosa, collo brevi, poro terminali margine noduloso. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 3. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 65.
*Habitat in* percæ cernuæ intestinis, *f. luciopercæ paulo major, fusca, collo albo cylindrico, nodulo-so, poro terminato, poro laterali ad basin colli sito, posterius obtusa.* Zoega.

Lagena. 30. F. corpore rotundato, collo longo. *Braun Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 236. *t.* 10.
*Habitat in* percæ fluviatilis intestinis.

Va-

Varica. 31. F. linearis teres, collo divergente obtuso infra apicem perforato. *Mull. zool. dan. 2. t. 72. f. 8-11. rar. 2. p. 93.*
*Habitat in* salaris ventriculo, *elongata, saepe in angulum acutum divergens, extensa laevis, contracta rugulosa, poro laterali in medio fere corporis posito, vasculo duplici filiformi albo utrinque decurrente, cum corpusculis 2 ovatis albis opacis retrorsum cohaerente, ovulis innumeris sparsis ex luteo viridibus canaliculo hyalino flexuoso, singulisque membranae pellucidae inclusis.*

eriocis. 32. F. elliptica hyalina medio rufa. *Mull. zool. dan. 2. t. 72. f. 4-7. rar. 2. p. 92.*
*Habitat in* eriocis intestinis, *nudo oculo vix conspicua, anteriore parte retractili & extensili intestinum filiforme conglomeratum media ovula conferta virescentia, duasque vesiculas includente.*

farionis. 33. F. oblonga depressiuscula, anterius lobis sex æqualibus marginata. *Mull. zool. dan. 2. t. 72. f. 1-3. rar. 2. p. 91.*
*Habitat in* farionis muco intestinali, *flavescens, vix linea longior, margine obtuse crenulata, lobis anterioribus subquadrangulis membranaceis.*

truttæ. 34. F. oblonga, maculis duabus albis lucidis orbiculatis pone porum inferiorem. *Froelich Naturf. 24. p. 126. t. 4. f. 16. 17.*
*Habitat in* truttæ intestino recto.

umblæ. 35. F. oblonga plana, collo angustiore retractili. *O. Fabr. fn. groenl. p. 329. n. 214.*
*Habitat gregaria in* umblæ sanguine dorsali, *albida, 1½ lineam longa, lagenam figura referens, posterius latior obtuse truncata, margine acuto.*

lucii. 36. F. lanceolata, margine depresso crenato, collo

lo elongato tereti. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 7. 2. *t.* 78. *f.* 6-8. *prodr.* 2713. *rar.* 1. *p.*67. 2. *p.*115. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.*203. *Naturf.* 14. *p.* 136.

*Bloch Eingew. p.* 6. *Besch. berl. Naturf.* 4. *p.*537. *t.* 14. *f.* 1-4.

*Goeze Eingew. p.* 172. *t.* 14. *f.* 3.

*Habitat in* lucii œsophago & ventriculo, *in hujus plicis latens, vivida, rubra,* 1½ *pollicem longa, vitae tenacioris.*

halecis. 37. F. *Leeuwenh. epist.* 97. *p.* 47.
*Habitat in* halece.

bramæ. 38. F. oblonga teres, basi attenuata obtusa, collo tereti subincurvo. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 6. *prodr.* 2714. *rar.* 1. *p.* 66.
*Habitat in* bramæ intestinis, *alba, poro laterali ad basin colli sito, ovulis oblongis fuscis.*

jesis. 39. F. ovata anterius angustata. *Bloch Eingew. p.* 11. *t.* 2. *f.* 10. 11.
*Habitat in* jesis intestinis, *lagenam forma sua mentiens.*

f. *vermium.*

loliginis. 40. F. ore papillis fasciculato. *Mull. prodr. zool. dan.* 2708. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 328. *n.* 313. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1078. *Fn. suec.* 2077. Fasciola barbata.
*Habitat in* loliginis intestinis, *an hujus generis?*

351. TÆNIA. *Corpus* depreſſum, articulatum.
*Caput* veſicis ſuctoriis quatuor.
† capite corona uncinorum vaginatorum exſertilium & retractilium duplici armato.

† *in aliis praeter inteſtina viſceribus habitantes, veſica ad partem poſteriorem auctae* Hydatulae ſ. Veſicariae, ſ. Viſcerales, ſ. Hydatigenae.

a. *hominis.*

viſceralis. 5. T. piſiformi, veſicae incluſa, anterius lata, poſterius acuminata. *Tyſon act. angl.* 43. *n.* 475. *p.* 305.
*Haen rat. med.* II. 3. *c.* 16. §. 2. *p.* 282.
*Pall. miſc. zool. p.* 174. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83. *Stralſund. Magaz.* 1. *p.* 81.
*Hoelpin Schrift. berl. Naturf.* 1. *p.* 348.
*Bloch Eingew. p.* 24.
*Goeze Eingew. p.* 196. & 249. *t.* 20. B. *f.* 12. a. b.
*Werner. verm. inteſt. p.* 68. *t.* 9. *f.* 29-33.
*Habitat in* hepate, placenta uterina, ſacco hydropico, *aliisque* tumoribus morboſis hominis, *nunc ſolitaria, nunc gregatim incluſa veſicae, an una eademque ſpecies?*

cellulosae. 6. T. veſicae cartilagineae tunicaeque poſterius bicaudatae ſolitaria incluſa. *Werner verm. int. cont.* 2. *p.* 2. *ſqq. t.* 1. *f.* 1-8.
*Goeze Entd. daſs die Finnen Bleſenw. ſind. Halle* 1784.
*Habitat in* tela celluloſa muſculorum, *pollicem integrum longa, dimidium lata, & ¼ craſſa, capitis uncinulis obtuſis (an forſan intra vaginam retractis) vitae tenaciſſima.*

b.

b. *mammalium.*

simiæ. 7. T. *Bloch Eingew. p.* 24.
*Habitat in* simiæ diaphragmate, *avellanae magnitudine; an eadem cum hydatula?*

vespertilionis. 8. T. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 334.
*Habitat in* vespertilionis hepate, *an eadem cum hydatigena?*

vulpis. 9. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 13.
*Habitat in* vulpe.

putorii. 10. T. *Goeze Eingew. p.* 206.
*Habitat in* putorii hepate, *an eadem cum t. ferarum?*

ursii. 11. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 74.
*Habitat in* urso.

gulonis. 12. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. 15.
*Habitat in* gulone.

hydatigena. 13. T. simplex, corpore elongato sensim antrorsum latescente, vesicula parte anteriore duplo longiore & latiore terminato, capite sessili distincto. *Batsch Bandw. p.* 100. *n.* 8. *f.* 46.
*Pall. miscell. zool. p.* 168. *t.* 12. *f.* 12. 13. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
*Bloch Eingew. p.* 23. *n.* 1. *Schrift. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338. *t.* 10. *f.* 9.
*Goeze Eingew. p.* 223. *t.* 19. *f.* 1. 2.
*Habitat in* muris decumani, ratti, amphibii hepate, *fine posteriore anteriore duplo & vesicula adhaerente quadruplo angustiori,* $1\frac{1}{4}$-$8\frac{1}{2}$ *pollices longa, capite fini anteriori aequali, collo nullo, corpore medio lineari.*

mu-

murina. 14. T. simplex corpore elongato sensim antrorsum latescente: articulis pone ad latera denticulatis, vesica caudali fini anteriori æquali capite sessili distincto. *Batsch Bandw. p.* 100. *n.* VIII. *β. f.* 12-16. 18. 20. 29. 30. 47-49.
*Muratt. zooph. p.* 38.
*Frisch misc. Berol.* 6. 1. *p.* 121.
*Pallas inf. viv. p.* 51. *elench. zooph. p.* 413. *n.* 5. *misc. zool. p.* 160. 168. 171. *t.* 10. *f.* 12. 13.
*Doever. verm. intest. p.* 105.
*Bloch Eingew. p.* 23.
*Goeze Eingew. p.* 227. 247. *t.* 18. B. *f.* 10-14. *t.* 19. *f.* 3-14.
*Werner verm. intest. cont.* 1. *p.* 13. *t.* 9. *f.* 22-33.
*Habitat in* muris terrestris & musculi hepatis *superficie, pisi, aliquando avellanae magnitudine, articulis longioribus & magis distinctis, vesica caudali longe angustiori ab hydatigena dignoscenda, an vere specie diversa?*

cordata. 15. T. simplex teres corpusculo distincte inserto in angulum infracto, vesica terminali ventricoso cordata pone acuminata. *Batsch Bandw. p.* 94. *n.* 4. *f.* 42. 43.
*Goeze Eingew. p.* 218. *t.* 18. B. *f.* 6. 7. & *p.* 236. *t.* 18. B. *f.* 15-17.
*Habitat in* leporum muriumque hepate, *vesica minuta, an vere distincta a pisiformi species?*

pisiformis. 16. T. simplex teres turbinata, corpusculo contiguo, inferius cum vesica ovato-ventricosa confluente. *Batsch Bandw. p.* 96. *n.* 5. *f.* 44. 45.
*Pall. misc. zool. p.* 158. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 73. *t.* 5. *f.* 6. *Opusc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.
*Bloch Eingew. p.* 25. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338.
*Goeze Eingew. p.* 210. 219. *t.* 18. A. & *t.* 19. B. *f.* 4. 5.

*Ha-*

*Habitat copiosissima in* leporis, *potissimum senescentis*, hepate, *racematim saepius cohaerens, pisi circiter magnitudine, ex albo caerulescens.*

utricularis. 17. T. simplex teres corpusculo distincte inserto recto, vesica oblonga, retrorsum utriformi obtusa. *Batsch Bandw. p.* 99. *n.* 7.
*Goeze Eingew. p.* 219. *n.* 3. *t.* 18. B. *f.* 8. 9.
*Habitat in* leporis uteri gravidi *tela cellulosa.*

ferarum. 18. T. simplex teres clavata, corpusculo contiguo inferius cum vesica ovali oblonga confluente. *Batsch Bandw. p.* 98. *n.* 6.
α. Hydatula cervorum. *Goeze Eingew p.* 205. 206.
*Steno apud Barth. act. havn.* 1. *n.* 36. *p.* 68.
β. Hydatula Saigæ. *Pall. spicil. zool.* 12. *p.* 43. *t.* 3. *f.* 5. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
*Habitat in* elaphi, capreoli, rangiferi, Saigæ *etiam sanissimorum* omento, peritonæo, hepate, *avellanae, juglandis, ovi gallinacei magnitudine, vesica magis coriacea: striis transversis magis evidentibus, collique rugis distincta.*

caprina. 19. T. capri hirci.
*Barthol. hist. anat.* 2. *p.* 49.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
*Hartmann miscel. Nat. Curios.* 1705. *p.* 152. *f.* 21-24.
*Habitat in* capræ visceribus.

ovilla. 20. T. ovis arietis.
*Goeze Eingew. p.* 257. *t.* 17. *f.* 10. 11.
*Pall. misc. zool. p.* 161. *t.* 12. *f.* 1-11. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
*Habitat in* ovium *potissimum vertiginosarum* peritonæo, hepate, omento, *an satis distincta a reliquis species?*

ce-

cerebralis. 21. T. multiplex, corpusculis pluribus basi sua vesicæ communi magnæ adnatis acervatim in superficie distributis & in eandem retractilibus, vesica exteriore nulla. *Batsch Bandw. p.84. n.1. f. 34-36. Schr. der. berl. Naturf. 1. p. 339.*
*Bloch Eingew. p. 25.* Vermis vesicularis socialis.
*Leske Dreher der Schaafe Leipz. 1780. t. 1. f. 1-3.*
*Goeze Eingew. p. 248. t. 20. A. f. 1-5 t. 20. B. f. 6-8. neust. Manif. 4. p. 619.*
*C. a Borke Naturf. 14. p. 142.*
*Fontana opusc. scientif. Florenz. 1783. 8.*
*Boerner n. oecon. schles. Nachr. 1. p. 241.*
*Geutebrück Unterr. v. Schaef. 1. p. 277.*
*Hessler Unterr. v. Zucht u. Wart. der Schaafe p. 98.*
*Ranftler Anz. der leipz. oecon. Societ. 1776. p. 20.*
*Habitat in* ovium vertiginosarum, *potissimum annuarum* cerebro *insigni sua copia morbi hujus pecorini causa vesica evacuata, insanabilis, singulis latice limpido repletis (vesiculis 300-400-500) vermiculis semen milii magnitudine aequantibus 2 ligamentorum ope adhaerentibus, qui omnes capite 32-36 uncinulis armato, cerebro potissimum ejus superficiei, aut parti medullae spinali vicinae firmissime infiguntur, in illo casu eam vertiginis speciem, quae* Drehen *opilionibus audit, in hoc* Springen *causantes.*

vervecina. 22. T. vesica magna., corpore brevi rugoso-imbricato. *Goeze Eingew. p. 208. t. 17. A. f. 3-5.*
*Pallas Stralf. Magaz. 1. p. 81.*
*Habitat in* vervecum, *praesertim impinguatorum,* peritonæo, *an eadem cum globosa?*

granulosa. 23. T. multiplex, corpusculis pluribus vesicæ communis parietibus laxe adhærentibus minutissimis granum referentibus, vesica externa internaque callosis. *Batsch Bandw. p.87. n.2. f.37.*

*Goeze*

*Goeze Eingew. p.* 258. *t.* 20. B. *f.* 9-14.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 85.
*Habitat in* vervecum hepate, *veſicis nunc avellanam, nunc ovum columbinum, nunc gallinaceum magnitudine aequantibus, plura millia vermiculorum continentibus, interiori caeruleſcente; vermiculis ipſis libere natantibus in fluido veſica contento, oculo nudo vix conſpicuis, brevibus, craſſis, punctatis, utroque fine obtuſis.*

bovina. 24. T. ſimplex, veſica magna, corpore brevi rugoſo imbricato.
*Barthel. hiſt. anat. cent.* 4. *p.* 381.
*Hartmann miſcell. Nat. Curioſ. dec.* 2. *ann.* 4. *obſ.* 73.
*Pall. miſc. zool. p.* 172.
*Goeze Eingew. p.* 205.
*Habitat in* vitulorum boumque viſceribus thoracicis & *hepate, an a globoſa vere diſtincta?*

apri. 25. T. ſuis apri. *Goeze Eingew. p.* 205. 206. *t.* 17. B. *f.* 1. II.
*Habitat in* apri hepate, *juglandis magnitudine, t. ferarum proxime affinis.*

globoſa. 26. T. ſimplex teres, corpuſculo diſtincte inſecto in angulum infracto, veſica terminali globoſa integra. *Batſch Bandw. p.* 89. *n.* 3. *f.* 38-41.
*Bloch Eingew. p.* 24. *n.* 2. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337. *t.* 10. *f.* 1-8.
*Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
α. Hydatula pulmonis. *Bloch Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
β. Hydatula lienis. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
γ. Hydatula hepatis. *Goeze Eingew. p.* 197. *t.* 17. A. *f.* 1. 2. 4. 5.

δ.

8. Hydatula peritonæi. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. B. *f.* 6-9.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1320. *n.* 5. Hydra ( Hydatula ) tentaculis quaternis obsoletis, corpore vesiculo.
*Pallas misc. zool. p.* 162. *t.* 12. *f.* 1-11. *Stralf. Mag.* 1. *p.* 64. *t.* 1. 2.
*Tyson. act. angl. vol.* 17. *n.* 193. *p.* 509. Lumbricus. hydropicus
*Payer misc. nat. cur. dec.* 1. *ann.* 7. *obs.* 206. Hydatis animata.
*Hartm. misc. nat. cur. dec.* 3. *ann.* 2. *obs.* 193.
*Barth. obs. cent.* 2. *n.* 87. *p.* 293. Ova in porcis.
*Habitat in* porci visceribus, *praesertim* abdominalibus, *ovi columbini malive citrei non raro magnitudine, distincte, at subtiliter rugosa, vesica terminali corpus multoties superante, caerulescente, post obitum animalculi fluvicante.*

Finna. 27. T. conica, duplici vesicæ inclusa, interiori basi sua adhærens, capite collum vesicæ versus directo. *Fischer in Werner verm. intest. cent.* 3. *p.* 65. *t.* 5.
*O. Fabr. nov. act. Soc. Hafn.* 2. *p.* 287.
*Goeze Entd. daff die Finnen Blasenw. find. Halle* 1734.
*Habitat fixa in* tela cellulosa, suis carnibus intexta, *morbum illum, quem* Finnen *nuncupant laniones, excitans, vesica ovali, semen milii aequante, exteriori ex tela cellulosa ipsa conflata, densa, elastica, intus laevi, & seroso latice madida, interiori pellucida, subtilissima rubello sero repleta, qua nonnisi collabente vermiculus inclusus lobos oculis offert, vitae tenacissimus; an eadem species cum t. cellulosae?*

c. *amphibiorum.*

salamandræ. 28. T. *Red. anim viv. n. an. viv. p.* 12. *Habitat in* salamandra.

serpentum. 29. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12. *Habitat in* serpentibus.

d. *piscium.*

truttæ. 30. T. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 127. *Habitat gregaria in* truttæ hepate.

rr *in intestinis solis habitantes, vesica terminali nulla.*

a. *hominis.*

solium. 1. T. articulis subvaginatis, ovario fasciculatim ramoso: ramis sublinearibus crebris, fasciculis transversis compressis: margine articuli laterali angusto compresso. *Batsch Bandw. p.* 117. *n.* 3. *f.* 1-6. 9-11. 21-23. 53.

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 2323. *n.* 1. *Fn. suec.* 2264. *Amoen. ac.* 2. *p.* 74. *t.* 1. *f.* 1. Tænia oculis marginalibus solitariis.

*Pall. inf. viv. p.* 38. *elench. zooph. p.* 405. *n.* 1. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 46. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 1-9. Tænia cucurbitina.

*Andry gener. des vers* 1. *p.* 195. *f. pag.* 33. 198. 200. 202. 205. 268. Ver solitaire sans epine.

*Tyson act. angl.* 1683. *n.* 146. *t.* 1. & 2. *f.* 2. 6. 10. Lumbricus latus.

*F. Plater prax.* 993. Vermis cucurbitinus.

*Ernst diss. de tuenia Basil.* 1743. Tænia secunda Plateri.

*Hayd exper.* 47. *t.* 47. Lumbricus latus.

*Bonnet mem. pres. a l' Acad. de Par.* 1. *p.* 511. & *Journ. de phys.* 1777. *apr. p.* 277. Tænia a anneaux longs.

*Coulet.*

*Coulet. monogr. Lugdb.* 172. *Lumbricus latus.*
*Hill hiſt. an. p.* 16. Sicyonia.
*Dionis monogr.* Tænia articulos demittens.
*Beverw. theſ. p.* 202. *t.* 202. *f.* 3.
*Raul. morb. aer.* 1752. *app. t. f.* 1-4.
*Roederer progr. de taenia.* 1760.
*Limburg act. angl.* 56. *a.* 1766. *p.* 128. *t.* 6.
*Goeze Eingew. p.* 269. *ſqq.*
*Bloch Eingew. p.* 20. *n.* 20.
*Mull. Naturf.* 14. *p.* 134. 198-201.
*v. Gleichen Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 10-13.
*Werner verm. inteſt. p.* 18.
*Ariſtot. anim. l.* 5. *c.* 19.
*Aldrov. inſ.* 6. *p.* 562. *t.* 1.
*Valiſn. op. p.* 177.
*Cleric. lumbr. t.* 7. A. B.
*Berthol. act. havn.* 2. *p.* 148. 3. *p.* 116.
a) Tænia grandis. *Goeze Eingew. p.* 278. *t.* 21. *f.* 1-7.
β) Tænia plana pellucida. *Goeze Eingew. t.* 21. *f.* 9-12.
*Wern. verm. inteſt. p.* 18. *t.* 1. 2. *f.* 1-46.
*Habitat in* hominis inteſtinis, *frequentior feminis, frequentior Saxonibus & Batavis, quam quidem aliis certe Europae gentibus, nimia copia duriſſima aliquando mala creans, non raro mortem, difficilius longe pellenda, quam alii hominem infeſtantes vermes, rariſſime ſolitaria, ut dentur exempla* 200 *ejuſmodi vermium unius hominis inteſtina affligentium, a* 3-8, *imo, ut referunt, ad* 60 *uſque pedes longa, uncinis* 6-7 *priorem,* 8-9 *poſteriorem capitis coronam formantibus, cute alba pellucidiſſima, ut ovaria eleganter ramoſa transluceant, articulis primis ex oblongo quadratis, ſequentibus cucurbitae ſemen referentibus, poſtremis, quos crebrius, quam aliae ſpecies dimittit longioribus.*

vulgaris. 2. T. orificio ovorum duplici: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud posito papilliformi expressili. *Batsch Bandw. p.* 107. *n.* 1. *f.* 33. 50.

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1323. *n.* 2. *Fn. suec.* 2262. *Amoen. acad.* 2. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 2. *Mull. zool. dan. prodr.* 2654. Tænia osculis lateralibus geminis.

*Pallas inf. viv. p.* 30. *n.* 1. *el. zooph. p.* 408. *n.* 3. Tænia grisea.

*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 59. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 13-16. Tænia membranacea.

*Plater prax.* 992. Lumbricus latus s. Tænia intestinorum.

*Spigel monogr.* Lumbricus latus.

*Schenck observ.* 111. *p.* 408. Tænia.

*Cleric. lumbr. p.* 132. *t.* 6. *f.* 2. Lumbricus latus. *p.* 136. *c.* 7. *t.* 7. Tænia prima.

*Plateri p.* 129. *t.* 5. *f.* 1. *p.* 159. *t.* 8. *f.* 1. B.

*Fabric. observ.* 2. *c.* 70. Lumbricus latus.

*Barthol. act. Havn.* 2. *p.* 148. *t.* 39. Lumbricus latus.

*Andry gener. des vers. c.* 3. *t.* 2. *f.* 9. & *t.* 3. *f.* 16.

*Tulp observ. p.* 170. *t.* 7. *f.* 1.

*Bonnet journ. de phys.* 1777. *p.* 243. *t.* 1. *f.* 3. 4.

*Gadol fatag.* 88.

*Goeze Eingew. p.* 297.

*Werner verm. intest. p.* 49. *t.* 3. *f.* 47-57.

*Habitat in* hominum intestinis *in* Suecia *vulgatior, pertinacissime infixa, ut violentioribus etiam remediis resistat, tenuis, laxa, quasi membranacea, solio tenacior, viva lactescens, subpellucida, 10-16 pedes longa, & fine latiori ultra* $4\frac{1}{2}$ *lineas lata, articulis nunc quadratis, nunc paulo magis oblongis, medio secundum longitudinem subtiliter striatis, ad latera transverse rugosis, ovariis florum corollam referentibus.*

b.

b. *mammalium.*

cateniformis. 4. T. articulis oblongis ellipticis : osculis marginalibus solitariis. *Goeze Eingew. p.* 306.

canina. α. Tænia osculis marginalibus oppositis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 4. *Fn. suec.* 2265. *Amoen. acad.* 2. *p.* 81. *t.* 1. *f.* 4. *Act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 0.

*Pall. inf. viv. p.* 48. *n.* 5. *elench. zooph. p.* 408. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 57. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 10-12. Tænia canina.

*Blumenb. Naturg. p.* 412.

*Goeze Eingew. p.* 311. *t.* 23. *f.* A-C. *Naturf.* 14. *p.* 134.

*Bloch Eingew. p.* 17. *t.* 5. *f.* 6. 7. Tænia cucumerina.

*Werner verm. intest. p.* 58. *t.* 3. *f.* 64-69. 77-79. *cont.* 1. *t.* 9. *f.* 34-37.

*Batsch Bandw. p.* 129. *n.* 7. *f.* 7. 8. 24-26. 57. 65. 161. Tænia elliptica.

*Wagler apud Goeze Eingew. p.* 324. *t.* 23. *f.* D.E.

*Ruysch obs.* 84.

lupi. β. Tænia ( marginata ) articulis subvaginatis : laterali margine latiusculo , ovario fasciculatim ramoso : ramis sublinearibus divaricatis , fasciculis obliquis magis disjunctis. *Batsch Bandw. p.* 125. *n.* 4. *f.* 54.

*Goeze Eingew. p.* 307. *t.* 22. A. *f.* 1-5.

*Blch Eingew. p.* 20. *t.* 6. *f.* 6-8.

*Werner verm. intest. p.* 59.

*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 72.

vulpis. γ. Tænia ( cratægaria ) articulis subvaginatis non



mar-

Tæniæ *cryanis in capite positis nutrimentum haurientes rarissime solitariæ, fertilissimæ oviparæ, ovis per canales proprios ductis, per oscula marginalia exeuntibus, in articulis posterioribus senioribus copiosioribus, species pauciores adhuc satis accurate definitæ, plures incognitæ, multæ forsan pro distinctis habitæ eædem, discrimine solum a nutrimenti & habitaculi indole varia proficiscente.*

marginatis, ovari fasciculatim ramoso: ramis inverse ovatis subpetiolatis. *Batsch Bandw. p.* 126. *n.* 5. *f.* 55.

*Bloch Eingew. p.* 20. *n.* 19. *t.* 6. *f.* 6-8. Tænia canina.

*Goeze Eingew. p.* 310. *t.* 22. A. *f.* 6-9. & *Naturf.* 14. *p.* 144.

littera-ta. δ. Tænia articulis subvaginatis non marginatis, ovario angustato longitudinali serie linearium serpentiformium conflato. *Batsch Bandw. p.* 128. *n.* 6. *f.* 56.

*Goeze Eingew. p.* 310. *t.* 22. A. *f.* 10-12.

felis. ε. Tænia. *Goeze Eingew. p.* 315. *t.* 22. B. *f.* 13-22.

sciuri. ζ. Tænia (floribunda) articulis læviter cohærentibus elongatis, utroque fine rotundatis linearibus, ovario pinnato lobulato; lobis crispatis, papillis solitariis. *Batsch Bandw. p.* 137. *n.* 10. *f.* 60.

*Goeze Eingew. p.* 332. *t.* 23. *f.* 14.

glirium. η. Tænia (pusilla) articulis conglutinatis oblongo-ellipticis, ovario vage pinnato: ramis gracillimis, papillis solitariis. *Batsch Bandw. p.* 134. *n.* 8. *f.* 58.

*Goeze Eingew. p.* 335. *t.* 23. *f.* 5. 6.

*Habitat in* canum (δ. *in* vulpis), cati, sciuri, vespertilionis, & murium ratti musculique intestinis, 18-24 *pollices*, ν) 1½ *pollicem longa*, *proboscide tereti*, *collo non articulato*, *ovis pisi more rotundis*, *rufis vel fuscis*, *albida*.

cucurbitina. 30. T. opaca ex albo flavescens proboscide æquali, articulis omnibus quadratis: osculis alternis. *Werner verm. intest. p.* 56. *t.* 3. *f.* 70-76. *Red. opusc.* 3. *t.* 17. *f.* 4.

*Habitat in* canum intestinis, *crassior capite latiori*, *articulis magis aequalibus*, *retrorsum paulo latioribus & tumido margine cinctis*, *ovulis minoribus a folio distincta*.

fer-

ferrata. 31. T. articulis ferratis ſtriatis capite magno.
*Goeze Eingew. p. 337.*
*Batſch Bandw. p. 138. n. 11. f. 19. 32. 61. 63. 67.*
*Red. anim. viv. n. an. viv. p. 71. t. 13. f. 6. 7.*
*opuſc. 3. t 17. f. 1. 2.*

canis. α. Tænia. *Goeze Eingew. p. 349. t. 25. B.*
*Vandell. diſſ. tres p. 151. t. 5.*

felis. β. Tænia collo breviſſimo. *Bloch Eingew. p. 19. n. 18. t. 6. f. 1-5.*
*Goeze Eingew. p. 337. t. 24. f. 1-6. t. 25. A. f. 1-5.*
*Pall. n. nord. Beytr. p. 47. t. 2. f. 1. 2. A. B. 3.*
*Valisn. op. 1. p. 147.*
*Cleric. lumbr. p. 41. 47. 51. t. 3. f. 1. 2. t. 9. f. 3. 4.*
*Morgagn. opuſc. 1. p. 174.*
*Vandell. diſſ. p. 148.*
*Habitat in* canis felisque inteſtinis, *ad* 19 *pollices usque longa*, $3\frac{1}{4}$ *lineas lata*, *articulis rectangulis*, *anterioribus ſenſim latioribus & brevioribus*, *ovario minus diſtincto per paria pinnato.*

monili-formis. 32. T. articulis orbiculatis, ovario pinnato: pinnis vage ramoſis; ramis apice craſſiuſculis, capite rotundato, collo non articulato. *Batſch Bandw. p. 135. n. 9. f. 59.*
*Goeze Eingew. p. 350. t. 26. f. 1-4.*
*Habitat cum cateniformi in* felis inteſtinis, $22\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *ad* $3\frac{1}{4}$ *lineas lata*, *colore margaritarum*, *linea longitudinali media*, *articulis ſubglobosis.*

lineata. 33. T. articulis ſubquadratis truncatis, faſcia alba longitudinali, ovariis ſeriatis facciformibus conſtante, collo contorto. *Batſch Bandw. p. 143. n. 12. f. 68. 69.*
*Goeze Eingew. p. 552. t. 25. A. f. 6-10.*
*Habitat in* cati ſylveſtris inteſtinis, *ex albo caeruleſ-*

*lescens, sex pollices longa, culmi straminei latitudine; an hujus familiae?*

mustelæ. 34. T. *Goeze Eingew. p.* 336.
*Batsch Bandw. p.* 143.
*Habitat in* mustelæ vulgaris, martis, putorii intestinis, *pollicem longa*, $\frac{1}{6}$ *lineae lata; an propria, eadem species hujus familiae.*

filamentosa. 35. T. articulis quadrangulis: ovariis lateralibus contortis ultra marginem lateralem elongatis osculo terminatis, capite rotundato, proboscide pyriformi. *Goeze Eingew. p.* 360. *t.* 27. *f.* 6.
*Batsch Bandw. p.* 160. *n.* 18. *f.* 84. 85.
*Habitat in* talpæ intestinis tenuibus, *satis longa, articulis brevibus conico truncatis: disco ovali distincto.*

erinacei. 36. T. articulis serratis brevibus, collo nullo, capitis uncinulorum corona simplici. *Bloch Eingew. p.* 20. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. 7. 8.
*Habitat in* erinacei intestinis, *an distincta a serrata species?*

straminea. 37. T. collo simplici tenuissimo, proboscide pyriformi, articulorum latitudine longitudinem quater superante. *Goeze Eingew. p.* 357. *t.* 27. *f.* 1-3.
*Sulzer Naturg. Hamst. p.* 88. *not.* 1.
*Batsch Bandw. p.* 188. *n.* 31. *f.* 116. 163.
*Habitat in* criceti intestinis, *anteriori fine capillari, posteriori conico, ad* 8 *pollices longa.*

magna. 87. T. articulis brevibus latissimis altero margine nodulosa, capite magno truncato-tetragono, plica gulari. *Abildg. ap. Mull. zool. dan.* 3. *p.* 50. *t.* 110. *f.* 1.

*Pal-*

*Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 75. *t.* 3. *f.* 20.
*Chabert malad. vermin. p.* 22. *t.* 2. *f.* 1.
*Habitat in* equi ventriculo & inteſtino tenui, 26-30 *pollices longa.*

quadriloba. 88. T. lanceolata, articulis breviſſimis, capite truncato-tetragono: lobulis binis in utroque colli latere. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 51. *t.* 110. *f.* 2. 3.
*Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 21-24.
*Habitat in* equi inteſtinis tenui & ventriculo.

caprina. 89. T. terete-conica, articulis breviſſimis, oſculis quatuor lateralibus. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 52. *t.* 110. *f.* 4. 5.
*Habitat in* capræ hepatis ſuperficie.

c. *avium.*

pſittaci. 38. T. corpore filiformi, articulis breviſſimis, capite minutiſſimo. *Goeze Eingew. p.* 406.
*Habitat copioſiſſima in* pſittaci brachyuri inteſtinis, *ultra* 14 *pedes longa, capite rotundato, collo non articulato.*

cornicis. 39. T. articulis prioribus: infundibuliformibus, poſterioribus ellipticis. *Goeze Eingew. p.* 337. *t.* 23 *f.* 7.
*Habitat in* cornicis inteſtinis, *an propria ſpecies?*

ſerpentiformis. 40. T. proboſcide apice incraſſata, baſi dilatata, articulis cuneiformibus dilatatis abbreviatis. *Batſch Bandw. p.* 176. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Tænia avium.
*Bloch Eingew.* 4. *p.* 556.
α. Tænia capite ſeſſili, proboſcide piſtillari apice convexa. *Goeze Eingew. p.* 391. a. *t.* 31. *f.* 7-9. *Batſch Bandw. f.* 96-98.

β.

β. Tænia collo non articulato, proboſcide piſtillari apice ſubumbonata. *Goeze Eingew. p.*391. b. *t.* 31. *f.* 10. 11.
*Batſch Bandw. f.* 99. 100.

γ. Tænia capite feſſili, proboſcide ventricoſo pyriformi. *Goeze Eingew. t.* 31. *f.* 12. 13.
*Batſch Bandw. f.* 101. 102.

δ. Tænia galbulæ. *Goeze Eingew. p.* 393.

ε. Tænia ſcolopacum. *Goeze Eingew. p.* 394.

ζ. Tænia ſulicarum. *Goeze Eingew. p.* 394.

η. Tænia charadrii. *Goeze Eingew. p.*394.

ϑ. Tænia vanelli. *Goeze Eingew. p.* 394.

ι. Tænia turturis. *Goeze Eingew. p.* 394.
*Doever verm. p.* 130.

κ. Tænia turdorum. *Goeze Eingew. p.* 393.

λ. Tænia loxiæ. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
*Habitat in* Corvorum Corona, frugilegi, Cornicis, Monedulæ, glandarii, Picæ, Orioli Galbulæ, ſcolopacum, ſulicarum *quarumdam*, charadrii hæmantopodis, vanelli, turturis, turdorum pilaris, viſcivori, iliaci, muſici, migratorii, ſaxatilis, Merulæ, & loxiæ curviroſtræ inteſtinis, *alba, ad pedis longitudinem ſe expandens, capite tenuiſſimo*; *an una ſpecies?*

caryocatactis. 41. T. articulis utroque margine acutis promicantibus, ovariis inconſpicuis. *Mull. Naturf.* 14. *p.* 157.
*Habitat in* caryocatactis inteſtinis, *an diſtincta a ſerpentiformi ſpecies?*

crateriformis. 42. T. articulis crateriformibus, collo longiore ſimpliciſſimo proboſcide ſagittata. *Goeze Eingew. p.* 396. *t.* 31. B. *f.* 16-18.
*Batſch Bandw. p.* 180. *n.* 16. *f.* 103. 104.
*Habitat in* pici majoris inteſtinis, *filli tenuiſſimi forma, uncinorum capitis corona ſimplici.*

torquata. 43. T. capitis annulo nigro, collo capillari, articulis brevibus latis: ultimo acuto. *Bloch Eingew. p.* 16. *t.* 4. *f.* 11-13.
*Habitat in* anatis domesticæ pinguis intestinis, *copiosissima, 8-9 pollices longa, lineam lata.*

scolopacis. 44. T. alba. *Muller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 218.
*Habitat in* rusticolæ intestinis; *an hujus familiae?*

Filum. 45. T. capite rotundato, proboscide obtusa collo simplici, articulis inconspicuis. *Goeze Eingew. p.* 393. *n.* 8. *t.* 32. A. *f.* 1-7.
*Werner verm. intest. p.* 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
*Batsch Bandw. p.* 163. *n.* 19. *t.* 86. 87.
*Habitat copiosissima in* rusticolæ intestinis, *fili crassitie, vix ultra 7 pollices longa, 560 articulis tenuissimis, collo simplici punctato.*

infundibuliformis. 46. T. articulis infundibuliformibus serratis, proboscide cylindrica elongata. *Goeze Eingew. p.* 386. *t.* 31. A. *f.* 1-6.
*Bloch Eingew. p.* 14. *n.* 8. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tænia collo longissimo.
*Besch. berl. Naturf.* 4. *p.* 555. *t.* 12. *f.* 3-5. Tænia Infundibulum.
*Muller Naturf.* 14. *p.* 179. Tænia anatis.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Tænia avium.
*Batsch Bandw. p.* 172. *n.* 23. *f.* 31. 91-93. 164. ε) Tænia otidis. *Goeze Eingew. p.* 390.
*Habitat copiosissima in* galli anatisque domesticæ, *rarius in* feræ, anserisque, ε) *in* tardæ intestinis, *expansa ad 13 pollices longa, osculis alternis, proboscidis uncinis retroversis acutissimis.*

sturni. 47. T. articulis longioribus, postremis utrinque tumidis, collo breviore simplici, capite sub-

qua-

quadrangulo. *Goeze Eingew. p.* 397. *n.* 31. B. *f.* 19-21.

*Habitat in* sturni vulgaris intestinis, *tenuissima, ad* 5 *pollices longa, articulis prioribus rugis subtiles referentibus, mediis ex plano ovali globosis.*

passeris. 48. T. crassiuscula, articulis brevissimis posterius sulco simbriatis. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 29. 30.

*Habitat in* fringillæ domesticæ & cannabinæ intestinis; *an vere distincta ab infundibuliformi?*

hirundinis. 49. T. capillaris, collo simplici, articulis truncato-infundibuliformibus. *Goeze Eingew p.* 390.

*Habitat in* hirundinis urbicæ intestinis, *vix visibilis,* $\frac{5}{4}$ *pollicis longa.*

d. *piscium.*

nodulosa. 50. T. articulis nodulosis medio punctatis, capite bilabiato: labio utroque aculeis tricuspidatis geminis. *Goeze Eingew. p.* 418. *t.* 34. *f.* 3-6.

*Pallas inf. viv. p.* 37. *n.* 3. Tænia rugosa.

*elench. zooph. p.* 413. *n.* 6. Tænia piscium.

*n. nord. Beytr.* 1. *p.* 90. *n.* 12. *t.* 3. *f.* 32. & 32. C. & *p.* 105. *t.* 3. *f.* 34. Tænia nodulosa, & 2. *p.* 62. Tænia lucii.

*Bloch Eingew. p.* 19. & *Beschr. berl. Naturf.* 4. *p.* 541. *t.* 15. *n.* 4. & *p.* 547. Tænia tricuspidata.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2655. & *Naturf.* 14. *p.* 138. 141-143. Tænia lucii.

*Ea-*

---

*Quorsum spectant* tæniæ *in* urogallo, tetrice, calidri *Squalo* acanthia *teste* Mulleio *Naturf.* 22. *p.* 44, *in* farione, umbla *p.* 47, belone *p.* 48. *repertae?* a Doeveren *verm. intest. p.* 151. *in* gobio nigro, *ab* aliis *in* cyprinis tringa & alburno *notatae?*

*Batſch Bandw. p.* 148. *n.* 15. *f.* 76-79. Tænia nodoſa.

β) Tænia cyſtica. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 101. *t.* 3. *f.* 33.

Tænia hydatidis. *Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 547. *n.* 3.

*Habitat in* lucii, percæ fluviatilis, & cernuæ anguillæ, ſalaris, leuciſci inteſtinis, β) *in* percæ fluviatilis hepate, *cyſtidi incluſa, articulis numeroſis, medio paululum elevatis, ad latera depreſſis & ſubcrenatis, poſterioribus paulo latioribus.*

†† *capite inermi.*

a. *hominis.*

lata. 3. T. candida, articulis breviſſimis medio nodoſis: oſculo ſolitario. *Pall. elench. zooph. p.* 110. *n.* 4. *infeſt. viv. p.* 35. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 64. *t* 3. *f.* 17. 18.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2263. *Amoen. acad.* 2. *p.* 80. *t.* 1. *f.* 3. Tænia (lata) oſculis lateralibus ſolitariis.

*Plater prax. c.* 14. Tænia prima.

*Bonnet mem. préſent. de Paris* 1. *p.* 478. *t.* 15. 16. *journ. de phyſ.* 1777. *p.* 262.

*Bloch Eingew. p.* 17. *n.* 16.

*Goeze Eingew. p.* 298. *t.* 21. *f.* 8.

*Muil. Naturf.* 14. *p.* 160.

*Gleichen Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 204. *t.* 6. *f.* 1-9.

*Batſch Bandw. p.* 111. *n.* 2. *f.* 51. 66.

ε) Tænia tenella. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 69. *t.* 2. *f.* 19. A. B.

*Habitat in* hominis inteſtinis, *in* Helvetia & Ruſſia *aliis frequentior, facilius, ricini potiſſimum oleo, pellenda, ab* 18-120 *pedes longa, vulgari magis opaca, craſſior, latior, ut dimidium pollicem interdum ſuperet, articulis tranſver-*

*verſim ſubtiliſſime ſtriatis, ſeſquilineam longitudine variſſime ſuperantibus, ovariis petalorum roſae in modum diſpoſitis.*

dentata. 51. T. capite acuminato ſeſſili, articulis maioribus transverſe ſtriatis, omnibus dilatatis brevioribus: oſculo in marginis lateralis utriusque medio elatiore. *Batſch Bandw. p.* 184. *n.* 29. *f.* 110-113.

*Werner verm. inteſt. p.* 49. *t.* 3. *f.* 47-57. Tænia vulgaris.

*Habitat in* hominis inteſtinis, *elongata, anguſta, 10-12 pedes longa, antrorſum latior, ſolio craſſior & tenacior, ovariis nudo oculo non conſpicuis, capite ſubtus cordis truncati formam referente.*

b. *mammalium.*

phocæ. 52. T. capite longo tetragono: auriculis quatuor. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 316. *n.* 296. *O. Mull. Naturf.* 14. *p.* 179.

*Habitat in* phocæ barbatæ inteſtino recto, *fœtida, flava, gregaria, 3½ pedes longa, 2 lineas lata, articulis 400 & ultra, anterioribus conſertiſſimis minutiſſimis, capite colli anguſtioris interventu cum trunco connexo; an hujus familiae?*

bacillaris. 53. T. capite rotundato: proboſcide pyriformi, articulis anguſtiſſimis bacillos ſibi appoſitos æmulantibus. *Goeze Eingew. p.* 359. *t.* 27. *f.* 4. 5.

*Batſch Bandw. p.* 191. *n.* 34. *f.* 122. 123.

*Habitat in* talpæ inteſtinis, *fili tenuiſſimi craſſitie, collo non articulato.*

pectinata. 54. T. oblongo lanceolata, anterius in roſtrum breve coarctata, collo vix conſpicuo. *Batſch Ban-*

*Bandw. p.* 168. *n.* 21. *f.* 89. 168.
*Goeze Eingew. p.* 363. *t.* 27. *f.* 7-13. Tænia articulis latis pectiniformibus, apice acutissimo, capite inermi quadriveſiculato.
*Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 75. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 25-27. Tænia acutissima.
*Limburg act. angl.* 56. *t.* 6. *f.* 1.
*Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 74.
ε) Tænia cuniculi. *Goeze Eingew. p.* 363.
*Marigues journ. de phyſ. Sept.* 1778. *p.* 229. *t.* 2. *f.* 3.
*Buff. hiſt. nat.* 12. *t.* 13. *p.* 103.
γ) Tænia marmotæ. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
*Habitat in* leporis, ε) cuniculi, γ) marmotæ intestinis & ventriculo, *gregaria, lanceolatae proxime affinis, vix ultra* 6 *pollices longa, plus quam* 200 *articulis conſtans.*

ovina. 55. T. longissima, articulis angustissimis brevibus utrinque rotundatis: vasis lateralibus pellucidis distinctis osculisque geminis marginalibus oppositis.
*Bloch Eingew. p.* 16. *n.* 14. *t.* 5. *f.* 1-5. Tænia vasis nutritiis distinctis.
*Goeze Eingew. p.* 369. *n.* 10. *t.* 28. *f.* 1-12.
*Batſch Bandw. p.* 182. *n.* 28. *f.* 109. 162.
*Rautin des malad. occaſ. par les var. de l' air. p.* 444.
ε) Tænia bovina? *Cleric. lumbr. p.* 74.
*Habitat in* ovium, *praecipue lactentium*, intestinis, *a lata, articulis ſibi propioribus, oſculis marginalibus oppoſitis, ovis obtuſe conicis, canalibus lateralibus luculentis, fine anteriori capillari, inſigni fertilitate & longitudine, quae ſaepius* 80, *aliquando* 200 *pedes aſſequitur, diſtincta.*

equina. 56. T. capite quadrangulo: foraminibus quatuor, articulis dilatatis brevissimis: osculis inconspicuis. *Muller Naturf.* 14. *p.* 158-179.

*Buff.*

*Buff. hiſt. nat.* 12. *tom.* 7. *p.* 444.
*Pall. elench. zooph. p.* 411. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 71. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20.
*Goeze Eingew. p.* 353. *t.* 25. B. *f.* 11-13.
*Batſch Bandw. p.* 210. *n.* 42. *f.* 137. 138.
*Habitat in* equi ventriculo, *ad* 10 *pollices longa, articulis lamellarum aut articulorum melolonthae inſtar ſuperficie ſua ſibi imcumbentibus, capite magno, lobis membranaceis parti poſteriori utrinque* 2 *appoſitis acuto manifeſte diſtincta.*

ſuis. 57. T. *Pall. ſpic. zool.* 2. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 13.
*Habitat in* ſue æthiopico; *an propria ſpecies hujus familiae?*

c. *avium.*

globifera. 58. T. articulis prioribus rhombeis, mediis ovalibus & pyriformibus, poſterioribus globoſis petiolatis.
*Goeze Eingew. p.* 420. *t.* 32. A. *f.* 13-16. Tænia brachium globuloſum.
*Bloch Eingew. p.* 14. *t.* 3. *f.* 5-7. Tænia cylindracea.
*Batſch Bandw. p.* 191. *f.* 119-121. *& p.* 199. *f.* 134-136.
*Habitat in* falconum, Buteonis & Lanarii *juniorum etiam turdi viſcivori* inteſtinis, *ad* 12 *pollices longa, fine anteriori capillari: proboſcide brevi, obtuſa.*

perlata. 59. T. capite quadrangulari, articulis quadratis acute marginatis: nodo medio albo margaritæ ſimili.
*Goeze Eingew. p.* 403. *t.* 32. B. *f.* 17-23.
*Batſch Bandw. p.* 146. *n.* 14. *f.* 73-75.
*Habitat in* buteonis inteſtinis, *tenuibus pedem longa, margaritae colore, per totam longitudinem nodoſa, articulis brevibus, collo aut ſimplici aut nullo.*

Fla-

Flagellum. 60. T. parte posteriori dilatata subito in capillarem anteriorem terminata. *Goeze Eingew. p.* 406. *t.* 32. B. *f.* 28-31.
*Batsch Bandw. p.* 170. *n.* 22. *f.* 90. 169.
*Habitat in* milvi intestinis, *2 circiter pollices longa, proboscide brevi, lata, truncato-conica.*

candelabraria. 61. T. articulis oblongis: mediis subcampanulatis; pictura pellucente margini parallela, fine anteriori capillari.
*Goeze Eingew. p.* 405. *t.* 32. B. *f.* 24-27.
*Batsch Bandw. p.* 144. *n.* 13. *f.* 70-72.
*Habitat in* aluconis intestinis, *collo longissimo subtilissime punctato, articulis collo proximis obtusangulis, sequentibus pictura candelabrum referentibus.*

crenata. 62. T. capite obtuso, collo longissimo, articulis crenatis: latitudine longitudinem sexies superante.
*Goeze Eingew. p.* 395. *t.* 31. B. *f.* 14. 15.
*Batsch Bandw. p.* 187. *n.* 30. *f.* 114. 115.
*Habitat in* pici majoris intestinis, *collo punctato.*

lanceolata. 63. T. lanceolato-oblonga antrorsum æquabiliter decrescens, capite papillæ simili, articulis brevissimis.
*Bloch berl. Naturf. Besch.* 4. *p.* 553. *n.* 10. Tænia anseris.
*Eingew. p.* 9. *t.* 1. *f.* 5. 6.
*Mull. Naturf.* 18. *p.* 27.
*Goeze Eingew. p.* 377. *t.* 29. *f.* 3-12.
*Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 26.
*Frisch misc. Berol.* 1727. *p.* 42.
*Batsch Bandw. p.* 165. *n.* 20. *f.* 88. 167.
β. Tænia lanceolata nodosa. *Bloch Eingew. p.* 10. *t.* 1. *f.* 9.
*Habitat in* anseris domestici, β) *in* merganseris

&

& abbelli inteſtinis, *ad* 10 *pollices longa, modo pura ſit, albiſſima, tenera.*

ſetigera. 90. T. corpore ad unum latus ſetoſo: ſetis tenuiſſimis breviſſimis cylindricis truncatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 106. *t.* 4. *f.* 1-7.
*Habitat in* anſeris domeſtici paſcentis inteſtinis, *tenuibus ad confinia craſſorum.*

anſeris. 64. T. minuta anguſtiſſima, fine anteriori capillari. *Goeze Eingew. p.* 380. *t.* 29. *f.* 1.
*Habitat in* anſeris domeſtici inteſtinis, *an diſtincta a trilineata?*

anatis. 65. T. capite obtuſo, articulis ſubtriangulis: oſculis lateralibus ſub margine. *Mull. Naturf.* 14. *p.* 156. 179.
faſciolaris. α) T. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 85. *t.* 2. *f.* 23.
lineata. β) T. *Bloch Eingew. p.* 12. *n.* 5. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 555. *t.* 14. *f.* 5-7.
*Batſch Bandw. p.* 196. *n.* 38. *f.* 130. Tænia trilineata.
Malleus avium. γ) T. *Goeze Eingew. p.* 383. *t.* 30. *f.* 1. 3.
δ) T. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 87. *t.* 3. *f.* 29.
*Habitat in* anatum inteſtinis, α) 6, β) 4, γ) *ad* 17 *pollices longa, ſatis laevis,* γ) *anterius malleolata.*

lævis. 66. T. capite cylindrico, collo tenuiſſimo longo, articulorum latitudine longitudinem ſexies ſuperante. *Bloch Eingew. p.* 15. *t.* 4. *f.* 4-6.
*Batſch Bandw. p.* 194. *n.* 36. *f.* 126. 127.
*Habitat in* anatum, clangulæ & clypeatæ inteſtinis, *articulis nudo oculo non conſpicuis.*

cuneata. 67. T. capite acuminato ſeſſili, articulis cuneatis. *Batſch Bandw. p.* 190. *n.* 32. *f.* 117. 118.
*Bloch Eingew. p.* 13. *t.* 3. *f.* 1. 2. Tænia articulis conoideis.

*Ha-*

*Habitat in* tardæ, anatumque fulicæ & clangulæ inteſtinis, 1-2 *pedes longa, proboſcide brevi.*

alcæ. 68. T. articulis viminalibus, fine anteriore tenuiore cylindrico. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 318. *n.* 297. b.

*Habitat gregaria in* alcæ picæ inteſtinis, *albida, ad* 9 *pollices longa, poſterius latior, articulis circiter* 184, *ſingulis utrinque ad marginem papilla notatis.*

tordæ. 69. T. teretiuſcula, articulis cordatis, fine anteriori filiformi acuminato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 298.

*Habitat in* alcæ picæ inteſtinis, *albicans, vix ultra* 3 *pollices longa, articulis circiter* 87, *margine utrinque papilla notatis.*

tardæ. 70. T. articulis rhombeis: lineis in medio aliquot tranſverſis, ovariisque in margine poſteriori tumido.

*Bloch Eingew. p.* 12. *t.* 2. *f.* 5-9. Tænia villoſa.

*Werner verm. inteſt. p.* 54. *t.* 3. *f.* 58-63.

*Batſch Bandw. p.* 163. *n.* 19. *f.* 86. 87. Tænia fimbriata.

*Habitat copioſiſſima in* tardæ inteſtinis, *crinis equini craſſitie, ad* 4 *pedes longa, capite oblongo, collo capillari, articulis circiter* 32000 *brevibus, latis, tenellis, altero latere denticulato, altero ovario, tanquam membrana articulo ipſo duplo latiore, acuto.*

Linea. 71. T. tenuiſſima, collo ſimplici, proboſcide ſubpetiolata capiteque globoſis, articulis brevibus dilatatis: angulo poſteriore prominente acuto. *Goeze Eingew. p.* 399. *t.* 32. A. *f.* 8-12.

*Batſch Band. p.* 194. *n.* 37. *f.* 28. 128. 129.

*Red. opuſc.* 3. *p.* 219?

*Habitat numeroſiſſima in* perdicum inteſtinis, *ad 5 lineas longa, in hac familia minima.*

macu-lata. 72. T. tenuis pellucida margine ſerrata, articulis breviſſimis dilatatis: eminentia media nigra & angulo poſteriore prominente acuto.

*Bloch Eingew. p.* 14. *t.* 4. *f.* 1-3. Tænia tenuis nodis inſtructa.

*Batſch Bandw. p.* 193. *n.* 35. *f.* 124. 125.

*Habitat in* turdi iliaci inteſtinis, *anguſtiſſima, alba.*

d. *reptilium.*

bufo-nis. 73. T. anterius ſubteres, poſterius filiformis, capite continuo obtuſo, articulis membrana tenella obvolutis cylindricis oblongis: margine argenteo.

*Goeze Eingew. p.*425. *t.* 35. *f.* 1-6. Tænia diſpar.

*Batſch Bandw. p.* 216. *n.* 50. *f.* 155-163. 165.

*Habitat in* bufonis & ſalamandræ inteſtinis, *alba*, 6 *pollices circiter longa, opaca.*

e. *piſcium.*

anguil-læ. 74. T. capite ſeſſili diſtincto craſſiore, articulis oblongis vage torulofis: oſculis duobus in uno latere. *Batſch Bandw. p.*211. *n.* 46. *f.*148-150.

*Beſch. berl. Naturf.* 3. *p.* 490. *Goeze Eingew. p.* 414. *t.* 33. *f.* 6-8. Tænia claviceps.

*Mull. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 208. *Naturf.* 14. *p.* 156.

*Doever. verm. p.* 130.

*Red. an. viv. n. an. viv. p.*86. *t.* 14. *f.* 4. *opuſc.*3. *p.* 252. *t.* 18. *f.* 4.

*Habitat in* anguillæ inteſtinis, *ad* 4 *pedes longa, capite anterius truncato, articulis* 8 *proximis longiore, articulis circiter* 600, *prioribus ſubquadratis, latitudine longitudinem duplo, poſterioribus*

*bus orbicularibus : latitudine longitudinem octuplo ſuperante.*

rugoſa. 75. T. ſerrata capite obtuſe conico : papillis binis utrinque ad apicem uſque adnatis, articulis breviſſimis dilatatis. *Batſch Bandw. p.* 208. *n.* 44. *f.* 142-145.
*Goeze Eingew. p.* 410. *t.* 33. *f.* 1-5.
*Red. an. viv. n. an. viv. p.* 91. *t.* 15. *f.* 10. *op.* 3. *p.* 245. *t.* 21. *f.* 5.
*Struſſenf. act. Stockh.* 35. *n.* 2. *p.* 23.
*Habitat in* Gadorum, Muſtelæ & Lotæ inteſtinalis cæcis, *copioſiſſima, tripedalis, collo ſub cylindrico articulato, in ſpiritu vini fuſcefcens, articulis poſterioribus ovorum plenis, capitis forma externa, totoque corporis habitu tetragonocephalae affinis, an vere diſtincta?*

ſcorpii. 76. T. capite carinato, oſculis lateralibus divergentibus, articulis inæqualibus. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 44. *f.* 1-7. *rar.* 2. *p.* 13. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 61-151. *Naturf.* 14. *p.* 144. 179. *Mull. zool. dan. prodr.* 2656. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 299. Tænia oſculis lateralibus, ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono.
*Leeuwenh. arc. nat. p.* 376. Vermes ex rhombi inteſtinis.
*α*) Tænia pleuronectis maximi. *Mull. Naturf. p.* 145-151. 18. *p.* 25.
*Habitat in* Cotti Scorpii & pleuronectis maximi ventriculo & inteſtinis, *capitis forma mutabili, corporis margine quaſi crenato, linea utrinque longitudinali, cauda obtuſa integra, articulorum anteriorum oſculo nullo.*

percæ. 77. T. capite bulboſo, ocellis quatuor, articulis quadrangulis : oſculis marginalibus. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 44. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 11. *nov. act. ſoc. dan.*

*dan.* 1. *p.* 59. 64. 65. *Mull. Naturf.* 14. *p.*152-153. 179. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.*206-209. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 102.

ε) Tænia lineolis lateralibus nullis. *Mull. zool. dan. rar.* 2. *p.* 12.

*Goeze Eingew. p.* 416. *t.* 33. *f.* 11-14. Tænia alternatim transverse lineata, articulis quadrangularibus, capite quadriverrucoso.

*Batsch Bandw. p.* 157. *n.* 16. *f.* 80-82. Tænia filuri.

*Habitat rarior in* percæ marinæ, ε) *in* glanidis intestinis, *linea utrinque longitudinali candida, articulis crassioribus & planioribus, quam in congeneribus, capite obtuso insequentibus articulis angustiore.*

erythrini. 78. T. latissima, capite brevi tetragono octolobato, ore antico punctato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 317. *n.* 297.

*Habitat in* percæ norwegicæ intestinis, *vivax & in aqua quidem marina vitae tenax, 6 circiter pedes longa, 4 lineas lata, lactea, intestino ex griseo violacco, articulis margine papillari retrorsum tendente utrinque terminatis, anali margine decemserrato.*

cernuæ. 79. T. *Pallas elench. zooph. p.* 414.

*Habitat in* percæ cernuæ intestinis, *vix propria species.*

solida. 80. T. oculis sub margine articulorum: alterius extremitatis articulo acuto. *Mull. zool. dan. prodr.* 2657. *Naturf.* 18. *p.* 24-26. *t.* 3. *f.* 1-5. *Linn. it. goth. p.* 268. Fasciola hepatica.

*Pall. inf. viv. p.* 135. *elench. zooph. p.* 410. β. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 76. 78. *t.* 3. *f.* 27.

*O. Fabr. fn. groenl. p.*320. *n.*300. *Batsch Bandw. p.* 224. *n.* 52. *f.* 170. Tænia gasteroslei.

*Ha-*

*Habitat in* gasteroſtei aculeati ventre, *quem tumidum reddit, ſaepius ſolitaria albiſſima, congeneribus durior & ſolidior, utrinque obtuſe marginata, articulis breviſſimis, linea utrinque longitudinali excavata.* Zoega.

gasteroſtei. 81. T. tenuiſſima, cauda obtuſa. *Mull. Naturf.* 18. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 6. 7.

*Habitat in* gasteroſtei aculeati inteſtinis, *minima, articulis nudo oculo vix diſcernendis.*

ſiluri. 82. T. crenata, capite continuo, articulis brevibus parallelepipedis: oſculis binis bimarginatis.

*Goeze Eingew. p.* 415. *t.* 33. *f.* 9. 10. Tænia oſculata.

*Batſch Bandw. p.* 209. *n.* 45. *f.* 146. 147.

*Habitat in* glanidis inteſtinis craſſis, *minus copioſa, noduloſa minor, diſtincto in proboſcide retractili ore, articulis minus evidentibus.*

Salmonis. 83. T. capite globoſo mutabili, oſculis articulisque annularibus inconſpicuis. *Mull. Naturf.* 14.

*p.*

---

*Quinam hujus ſectionis generi adſcribendi ſunt vermes a* Redi *in aquilae pedibus an. viv. n. an. viv. p.* 73. *an.* 3. *p.* 225. *in lui ſuſ ſinuoſ an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 226. *t.* 21. *f.* 10. *in oſſi di ditus variisque vitae ſpadoque ſpecibus an. viv. p.* 110-111. 107. *op.* 3. *p.* 296. 285. *in gadorum inteſtinis an. viv. p.* 90. *t.* 15. *f.* 6. *opuſc.* 3. *p.* 243. *t.* 21. *f.* 2. 3-4. *in pice tam baro an. viv. p.* 92. *t.* 15. *f.* 1-4. *op.* 3. *p.* 293. *t.* 20. *f.* 1-4. *in cancri ovariis an. viv. p.* 101. *t.* 17. *f.* 1. *op.* 3. *p.* 270. *t.* 24. *f.* c. *in aſcidiae ſpecie,* (*ſi quidem haec acidata anim. viv. p.* 105. *t.* 15. *f.* [illegible] *op.* 3. *p.* 275. *t.* 21. *f.* [illegible] *viv. p.* 95. *t.* 16. *f.* 6. *p.* 3. *p.* 255. *t.* 23. *f.* 1. *vocati? cubitus, ſi pro ſpecies vermis* a b. [illegible] *goli vetula. & delic. Iafabr. b.* 1. *t.* 20. *pra verrucoſum excurſibus donatae* 2, *quorum alter in noſtrum vel gallinacei magnitudine, alter in [illegible] longitudine termi[illegible]? An ſcolopendra gigas edi[illegible] varia praeterea genera ranarum corpore f[illegible]rmi, capite rotundo, proboſcide longa inermi, lateroſi d[illegible]ctus, a C. Nat. in ſuarchis inteſtinis repertus, & Schr. berl. Naturf.* 7. *p.* 471. *deſcriptus & t.* 7. *delineatus?*

*p.* 179. 202. 18. *p.* 22. *nov. act. dan.* 1. *p.* 68. *Goeze Eingew. p.* 417. *t.* 34. *f.* 1, 2. Tænia Proboscis fuilla.

*Bloch Eingew. p.* 15. *t.* 4. *f.* 7-10. Tænia capite truncato.

*Besch. berl. Naturf.* 4. *p.* 545. *t.* 10. *f.* 8. 9. Tænia crassa.

*Batsch Bandw. p.* 212. *n.* 47. *f.* 151. 152. Tænia proboscidea.

ε) Tænia tetragonoceps. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 31. A-D.

*Batsch Bandw. p.* 204. *n.* 43. *f.* 139-141. 175.

*Habitat in* salmonis salaris & ariocis ventriculo *ac* intestinis, *a 2 lineis ad ¾ pedem longa, capite ovali articulum quinquies superante, corpore teretiusculo, articulis posterioribus sensim angustioribus ultimo reliquis quinquies longiore.*

Froelichii. 91. T. capite cum collo longissimo tenuissimo inarticulato continuo, ovariis dendaticis linea laterali cinctis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 124. *t.* 4. *f.* 20. 21.

*Habitat in* Salmonis Wertmanni intestino duodeno.

Rectangulum. 84. T. articulis transversis margine rotundatis, ductu pellucidiore in medio ad angulum subrectum flexo. *Batsch Bandw. p.* 159. *n.* 17. *f.* 83. 174.

*Bloch Eingew. p.* 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 7. 8.

*Habitat in* Cyprini Barbi intestinis, *pollice vix longior, alba, tenuis, semipellucida, fine anteriori acutiore.*

torulosa. 85. T. elongata torulosa, capite obtuso, collo crenato, articulis orbiculatis: osculis geminis difformibus. *Batsch Bandw. p.* 181. *n.* 27. *f.* 105. 108.

*Blo-*

*Bloch Fingew. p.* 11. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1-4. 10. 11. Tænia articulis rotundis.

*Habitat in* Cyprino Jeſe, *ad 2 pedes longa, capite plano, anterius truncato, collo brevi, articulis brevibus craſſis.*

laticeps. 86. T. ſubtiliter tranſverſe rugoſa, parte poſteriori craſſiore: fine obtuſo anterius lobo contractili crenato terminata. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 106. *n.* 16. *t.* 3. *f.* 35.

*Habitat copioſa in* bramæ inteſtinis, *minuta, pollicem circiter longa, molliuſcula.*

353. FURIA. *Corpus* lineare, æquale, filiforme, utrinque ciliatum aculeorum reflexorum corpori appreſſorum ſerie ſimplici.

infernalis. 1. F. *Fn. ſuec.* 2070. * *Amoen. acad.* 3. *p.* 322. *Solander nov. act. Upſal.* 1. *n.* 6.
*Pallas nord. Beytr.* 1. *p.* 113.

*Habitat in* Batiniæ paludibus vaſtis ceſpiloſis, *unguis longitudine, carnea vel ochroleuca, apice ſæpius nigra, carices crebro fruticesque adſcendens, ventoque per aerem ducta hominum equorumque paries nudas non perpendiculariter ſitas per cutem intrans, ſenſationem primo acupuncturam mentientem excitans, locoque, per quem introgreſſa eſt, punctum nigrum & vehementem pruritum, mox dolorem atrocem, maculam rubram, & gangraenam a puncto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriam, frequentibus animi deliquiis & deliriis ſtipatum, altero, aliquando primo die, imo paucas poſt horas morte terminatam, niſi cito citius, quae ſumma*

Furiae & Myxines genus *inter utramque ſectionem hujus craniis ambigunt.*

*ma difficultas eſt, vermis extrahatur, aut ſi jam profundius penetraverit, caro, quam feriit, ſcindatur, oleumque, ut fertur, betulae empyreumaticum infundatur, vel lac coagulatum caſeusve imponatur.*

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.
*Os* terminale cirroſum.
*Maxillae* binæ pinnatæ: dentibus plurimis acutis in fauce.
*Dens* ſuperior ſolitarius acutus.

glutinoſa. 1. M. *Fn. ſuec.* 2086. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 91. *t.* 8. *f.* 4. *Strœm ſondm.* 1. *p.* 287. *act. nidroſ.* 2. *p.* 250. *t.* 3. *Mull. zool. dan. prodr.* 2755. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 344. *n.* 334.
*Helm. it* 1. *p.* 100.
*Will. ichth.* 107. *Raj. piſc.* 36. Lampetra cæca, oculis carens.
*Habitat in* Oceano europæo, *piſces intrans, devorans, aquam in gluten vertens.*

275. GORDIUS. *Corpus* teres æquale læve.

aquaticus. 1. G. filiformis fuſcus.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1052. *Fn. ſuec.* 2068. * Gordius pallidus, extremitatibus nigris.
*It. goth.* 282. Gordius.
*Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 30. *n.* 161. Gordius Seta.
*Geſn. ag.* 463. Vitulus aquaticus, Seta, amphiſbæra aquatica.
*Aldr. inſ.* 720. *t.* 765. Seta ſ. vitulus aquaticus.
*Jonſt. inſ. t.* 25. Meerwijn.
*Klein tent. herpet. p.* 68. Lumbricus aquaticus 4.
*Planc. conch. app. c.* 22. *t.* 5. *f.* F. Seta paluſtris.

*Hill.*

*Hill. hiſt. anim. p.* 14. Chætia.

*Habitat in* vivis, *aliisque* aquis *fundi potiſſimum* argillacei, *quem, uti piſcis aquam tranat, ſcaturiginum plurium auctor, opacus, ſaepe in ſpiram varie ſe contorquens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper acuminatus, morſura paronychiam excitare, opio feliciſſime ſecundam fertur in* Waldai *piſces occidere, hominibus non perinde infeſtus.*

argillaceus 2. G. flaveſcens totus. *Fn. ſuec.* 2060. *

*Habitat in* argilla, *proprio quaſi elemento, quam ubique tranat, adeoque ubi illa foditur, frequens; diſtinctus ab aquatico.*

Filum. 3. G. filiformis candidus. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 31. *n.* 162.

*Habitat in* cuniculis, *in cortice tubi abiegni, olim aquae ductui inſervientis, excavatis, ſubtiliſſimus, altero fine ſubattenuatus, hyalinus.*

lacteus. 4. G. totus albus opacus. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 32. *n.* 163.

*Habitat per myriades a Junio ad Septembrem in* aquis, *in quibus* fagifolia *pubeſcunt, tactus momento citius ſe contrahens, rurſumque expandens.*

arenarius. 5. G. fulvus obtuſus. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 33.

*Habitat in fundo ſabuloſo* ſinus Chriſtianienſis Norwegiæ.

277. LUMBRICUS. *Corpus* teres annulatum ſæpius cingulo elevato genitalium receptaculo cinctum, aculeis utplurimum conditis longitudinaliter exaſperatum, poro laterali inſtructum.

terreſtris. 1. L. ruber octofariam aculeatus. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 24. *n.* 157.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2073. Lumbricus trifariam retrorſum aculeatus.
*Hill hiſt. anim. p.* 15. Lumbricus lævis.
*Aldrov. inſ.* 693. Lumbricus terreſtris.
*Raj. inſ.* 2. Lumbricus terreſtris minor.
*Sloan. jam.* 2. *p.* 189. Lumbricus terreſtris minor rubicundus.
*Petiv. gazoph. t.* 130. *f.* 6.
*Red. exper.* 4. *t.* 15. *f* 1.
*Paulini de lumbr. terr. Francof.* 1703.
*Leſſer theolog. des inſ. par. Lyonnet. f.* 1. 2. 3.
*Vandelli diſſert.* 3. *Patav.* 1748. *p.* 98-147. *t.* 4.
*Klein. tent. herpetol. p.* 58.
*Murrey de lumbric. ſet. obſerv. t.* 2. *f.* 1-5.
*Phelſam hiſt. aſcarid. t.* 2. *f.* 4. 5.
*Bonnet inſectol.* 2. *t.* 4.
*Ilſemann Beſch. berl. naturf. Fr.* 3. *p.* 231.
*β*) Lumbricus major. *Raj. inſ.* 1.
*Habitat in* ligno putrido & humo, *quam bibulam reddit, cotyledones plantarum conſumens, nocte pro copula exiens, a naſua, talpa, erinaceo, gallina, crocce, effectus ſuligine, vino pelendus, 6-8 pollices longus* 117-133 *ſegmentis conflatus, ſingulis quatuor paribus aculeorum oculo nudo non conſpicuorum armatis, expanſus utrinque convexus, contractus ſubtus planiuſculus, canali rubro totum corpus percurrente, cin-*

*cingulo rugoso, poroso utrinque tumido subtus planiusculo, ore infra proboscidem posito.*

marinus. 2. L. papillis dorsalibus geminatis setigeris. *It. wgoth.* 189. *t.* 3. *f.* 6. *It. scan.* 315. *Fn. suec.* 2074. *

*Bell. aquat.* 444. Lumbricus marinus.

*Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 233. *t.* 1. *f.* 19. 29. Nereis lumbricoides.

*Habitat in* maris Europæi *fundo sub arena, nonne potius ad nereides relegandus?*

vermicularis. 3. L. albus bifariam aculeatus. *Mull. hist. verm.* 1. *p.* 26. *n.* 158.

*Habitat haud infrequens in* truncis humentibus *ac inter* folia madida, *in humidiusculis commode repens, in siccis valde se torquens, glaber, nitidus.*

variegatus. 3. L. rufus maculatus sexfariam aculeatus. *Mull. hist. verm.* 1. 2. *p.* 26. *n.* 159.

*Bonnet vers d'eau douce t.* 1. *f.* 1-5.

*Habitat in* alnetorum & nemorum limo aquoso, *pulcherrimus, rubro colore tessulis fuscis minimis interstincto, linea sanguinea media totum corpus percurrente, facillime redintegrandus, & sponte in frusta dissiliens, integrum animal referentia.*

tubifer. 5. L. rufescens bifariam aculeatus. *Muller hist. verm.* 1. 2. *p.* 27. *n.* 160. *zool. dan.* 3. *p.* 4. *t.* 84. *f.* 1-3.

*Bonnet vers d'eau douce, t.* 3. *f.* 9. 10.

*Trembley hist. des polyp. t.* 7. *f.* 2.

α) L. seta anterius utrinque porrecta. *Mull. hist. verm.* 1. *p.* 27.

γ) *Schaeffer Armpolypen.* 1755. *t.* 2. *f.* 1-3 ?

*Habitat in* rivulorum fundo, *pellucidus, simplicissimus, tenuissimus, apice truncatus intestino obscuro, ex terra tubulum perpendicularem erectum sibi fingens, quem inhabitat.*

li-

lineatus. 6. L. albus, linea longitudinali rubra. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 29.
*Muller v. Würm p.* 110. 118. *t.* 3. *f.* 4. 5.
*Habitat frequentissimus ad littora* maris Batici, *copiosissimus inter fucos, pellucidus setis brevissimis, arteria dorsi lutea, vena caput versus bifida, ovario albo Majo pleno.*

ciliatus. 7. rufus ciliis annulatus. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 30.
*Habitat in* Norwegiæ maritimis, *glaber, segmentis ultra* 40, *interfectionibus fasciculis* 4 *setarum brevissimarum armatis.*

tubicola. 8. L. albus, macula segmentorum dorsali rubra. *Mull. zool. dan. prodr.* 2613. *zool. dan. rar.* 2. *t.* 75.
*Habitat rarius in fundo argillaceo* sinuum Norvegiæ, *tubulum, teretem, membranaceum, limo obductum, se uncia longiorem inhabitans, segmentis corporis* 25, *interfectionibus utrinque* 2 *setis armatis, intestino nigro totum corpus percurrente.*

echiurus. 9. L. seriatim granulosus, posterius obtuse truncatus, duplicique setarum corona cinctus. *Pall. miscell. zool. p.* 146. *t.* 11. *f.* 1-6. *spicil. zool.* 10. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1-5.
*Habitat in* maris fundo arenoso, *frequens, hiemi potissimum, in littore belgico, gadi merrhuae ejecta, digiti medii magnitudine, lingua carnosa, crassiuscula, scapboidea, ex griseo albidus: visceribus fulvis.*

Thalassema. 10. L. striatus fordide ruber rutilo-maculatus, subtus griseus, ore infundibulo intus rugoso ad marginem plicato cincto.
*Pall. misc. zool. p.* 147. *t.* 11. *f.* 9. *spicil. zool.* 10. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 6.

*Ha-*

*Habitat in* Cornubiæ littore *profunde inter rimas rupium ſubmarinarum, glaber, mucoſus, altero fine craſſior, altero ſubacuminatus, ore ſupero: infundibulo croceo.*

edulis. 11. L. ex albido carneus poſterius ſubclavatus anterius dilatatus papilloſus, ore terminali papillari ruga villoſiſſima cincto. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 7.

*Camell. act. angl.* 26. *n.* 318. *p.* 248. Tambiloc?

*Habitat in littore ſabuloſo* inſularum Oceani indici, *fere pedalis*: *pennae anſerinae craſſitie, ad pedem vel ſesquipedem intra arenam latens, pervio ad ſuperficiem canali ſe prodens, Sinenſibus eſculentus propriaque arte captus, annulis inter partem villoſam finemque poſtericrem* 278 *ſtria annulari diremtis, fine poſteriori bulboſo papilla gemina, anteriori carneis confertis per ſeries transverſas digeſtis obſeſſo.*

oxyurus. 12. L. ex liveſcente albidus fine poſteriore acutiſſimus, anteriore obtuſus, roſtro tereti lateſcente retractili & exſertili. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. 147. *t.* 11. *f.* 7. 8. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 16.

*Habitat in* Suſſexiæ *littore, ſubſesquipollicaris, ſtriis teneris annulatus, roſtro truncato ſubtiliter granuloſo, poro vix conſpicuo ad baſin roſtri ſito.*

fragilis. 13. L. ruber, verrucis lateralibus ſiſſis, ſetis faſciculatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2611. *zool. dan. rar. deſcr.* 1. *p.* 45. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *t.* 22. *f.* 1-3.

*Habitat in* fundo limoſo *ſinus* Norwegiæ Drocbacenſis, *terreſtris facie, nereidibus affinis at aculeis manifeſtis, annulis ultra* 500 *laevibus fragillimis, capite conico, ore huic proxime rugoſo.*

armiger. 14. L. ruber, lamellis ventris lanceolatis, ge-

minatis, anterius nullis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2610. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 46. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 4. 5.

*Habitat in* fundo imparo sinus marini insularum Teist oceani Norwegici, *nereidibus proximus*, 20 *lineas longus*, *annulis ultra* 100 *constans.*

cirratus. 15. L. cirris longissimis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *t.* 14. *f.* 7.

*Habitat in* mari Norwegico, *cirris annulatis* 3-24 *per totum corpus dispersis.*

fabellaris. 16. L. articulatus, altero fine truncatus, intersectionibus articulorum incrassatis biaculeatis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104 *f.* 5.

*Habitat in* sinu Norwegiæ Droebacensi, *an forte cum tubicola distincti generis?*

278. PLANARIA. *Corpus* gelatinosum planiusculum: poro ventrali duplici; ore terminali.

* *oculis nullis.*

stagnalis. 1. Pl. ovata fusca anterius pallida. *Mull. verm.* I. 2. *p.* 53. *n.* 178.

*Pallas inf. viv. intra viv. p.* 272. Fasciola ovata plana subpetiolata aquatica.

*Habitat in* stagnis, *opaca*, *supra & subtus aequalis antrorsum subacuminatus pellucens*: *maculis binis lacteis*: *ovis numerosis albidis ad latera congestis.*

nigra. 2. Pl. oblonga nigra, anterius truncata. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 179. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 3. 4.

*Habitat in* rivo, *subtus tota plana*, *posteriora versus*

*ſus poris duobus albidis ſecundum longitudinem diſpoſitis.*

brunnea. 3. Pl. oblonga brunnea : linea longitudinali nigra. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 180.
*Habitat - - - nigrae proxime affinis.*

ciliata. 4. Pl. elongata depreſſa ciliis cincta. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 55. *n.* 181.
*Joblot microſc.* I. 2. *p.* 66. *t.* 8. *f.* 5-11. & *t.* 10. *f.* 13 ? Solea aurea & parva.
*Habitat in* aqua *ſub* lemna, *griſea, e granulis quaſi conflata, ciliis mobilibus, organo antico rotatorio vorticellam mentiens, an proprii generis ?*

Gulo. 5. Pl. elongata pellucida, anterius truncata. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 56. *n.* 182.
*Habitat rara in* aquis *ſub* lemna *primo intuitu ciliatam referens, pellucida granuloſa, at ciliis orba, margine omni ſtriis tenerrimis teſſulato, pro lubitu lente celeriterve incedens, cyclidia cohabitantia uno hauſtu ingurgitans, & poſt aliquot horas ſimul iterum evomens.*

punctata. 6. Pl. elongata teres viridis. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *n.* 183.
*Habitat primo vere in* pratis inundatis, *antrorſum obtuſa, poſterius ſubacuminata punctulis nigris conſperſa, & ova* 5 *rubra, ſphaerica undique pellucida continens.*

flaccida. 7. Pl. elongata brunnea : linea laterali tranſverſisque albis. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *zool. dan. prodr.* 2678. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 69. *zool. dan. t.* 64. *f.* 3. 4.
*Habitat inter rudera teſtarum in* ſinubus Norwegiæ, *quietus ſpiraliter ſe convolvens, & partem corporis quamcunque pro lubitu attenuans, dilatans,*

*tans, corrugans, utroque fine subattenuata, supra convexiuscula subtus plana, rubicunda, immaculata.*

rosea. 8. Pl. elongata rubra. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 58. *zool. dan. prodr.* 2679. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 68. *zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 1. 2.
*Habitat in* sinubus Norwegiæ *passim nigro-striata, utroque fine obtusa, supra convexa nigro-punctata, subtus pallidior: anterius pone caput lunula utrinque ex punctis nigris conflata.*

angulata. 9. Pl. elongata ruso fusca: anterius angulis binis albis. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 58.
*Habitat in fundo arenoso* Oceani, *ingens, anterius subacuminata, posterius obtusa, supra convexa subtus pallida, tubulo albo pellucido, intestino subrubente spirali instructo, ano terminali.* O. Fabricius.

rubra. 10. Pl. oblonga depressa pallide rubra. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2683. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 9. 10. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 304.
*Habitat in* profundo littoris Groenlandici *super ulvas & fucos frequens, supra lineis transversis tenerrimis exarata.* O. Fabricius.

viridis. 11. Pl. oblonga supra convexa viridis: striis transversis albis. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2684. *zool. dan.* 2. *p.* 77. *t.* 68. *f.* 1-4. *O. Fabr. Fn. groenl.* 305.
*Habitat in* radicibus fucorum marinorum, *crassiuscula, subtus pallidior, unicolor, antrorsum obtusa: rima utrinque rubra; posterius oblique truncata, subtus versus medium foramine ovato, ano in dorsi medio.* O. Fabricius.

oper-

operculata. 12. Pl. ſubovata griſea ſubtus operculo tubulum exſertilem condente inſtructa. *Mull. zool. dan. rar. 2. p. 78. t. 68. f. 5-8. O. Fabr. Fn. groenl.* 307.

*Habitat rara in* littoribus arenoſis *& inter* fucos ſinuum minorum Norwegiæ, *fabae coffeae non diſſimilis, marginem flectendo cito ſatis progrediens, plicarum marginalium ope ſuperis quoque corporibus ſe affigens & adſcendens, ex viridi griſea, ſubtus, dorſique linea longitudinali pallidiori, operculo candido, margine ſubtus plicato.*

ſubulata. 13. Pl. elongata, anterius acuminata poſterius truncata. *Mull. zool. dan. 2. p. 79. t. 68. f. 11. 12. O. Fabr. Fn. groenl.* 308.

*Habitat copioſa in* confervis Groenlandiæ marinis *& fundo limoſo* cavernarum rupium aquam ſub æſtu retinentium, *alba, ſupra griſea, motu roſtri ſerpentino celerrime ingrediens, roſtro autem tacto in cubum minutum ſe contrahens.*

ventricoſa. 14. Pl. ovata ventricoſa, anterius collo cylindrico-conico elongata, poſterius obtuſa.

*Pall. ſpicil. zool. 10. p. 17. t. 1. f. 9. 10.* Faſciola ventricoſa.

*Habitat in* Amboina, *praegrandis, ex livido exalbida, ſtriis rugisque tenuiſſimis exarata, poro utrinque ad feſſam colli baſilarem ampliſſimam circularem; nonne eadem cum tetragona?*

quadrangularis. 15. Pl. pallida ovata anterius acutiſſima membranulis quatuor longitudinalibus criſpulis alata.

*Pall. ſpicil. zool. 10. p. 20. t. 1. f. 12. a-e.* Faſciola quadrangularis.

*Habitat haud infrequens prope* Hagam Comitum *in foſſis inter lemnam, molliſſima, pellucida, forma mutabili, limacis more ingrediens, ſuper alia*

*corpora glifcens , & alteri animalculo obvia quaſi territa contracta quieſcens : An hujus tribus ?*

bicornis. 16. Pl. ovato-lanceolata utrinque obtuſa ex griſeo cinerea nigro-punctata : anterius tubulis binis breviſſimis divergentibus.
*Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 14. a. b. Faſciola punctata.
*Habitat in* Belgii aquis lemna coopertis , *forma mutabili , laeſa aut irritata tubulorum ope hirudinis more corpus figens , ſubtus albidior : venis fuſceſcentibus ; an hujus tribus & generis ? an diverſa a tentaculata ſpecies ?*

griſea. 43. Pl. corpore griſeo dilatato antrorſum elongato-acuminata , fine poſteriori abbreviata acuta.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 38. *t.* 105. *f.* 1.
*Habitat in* aquis lacuſtribus *inter confervas.*

fulva. 44. Pl. depreſſa latiuſcula utroque fine acuta , macula longitudinali nigra elongata media. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 2.
*Habitat* - - -

viridata. 45. Pl. oblonga teres viridis utroque fine acutiuſcula. *Mull. zool. dan. prodr.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 4.
*Habitat auctumno in* pratis inundatis.

** *oculo unico.*

glauca. 17. Pl. ſubelongata cinerea , iride alba. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60. *n.* 184.
*Habitat in* aquis , *torvae affinis , lineam longa , anterius acuminata , poſterius latiuſcula , linea interdum duplici nigra in medio dorſi anterius & poſterius coeunte.*

lineata. 18. Pl. elongata ſupra convexa cinerea : linea lon-

longitudinali pallida. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60.

*Habitat vaga in* littore maris Balthici, *ſeſquilineam longa, ſubtus alba: area media fuſca, antrorſum attenuata, retrorſum dilatata.*

rutilans. 46. Pl. linearis, antrorſum acute attenuata, oculo nigro. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 10. 11.

*Habitat in* maris balthici *fucis.*

**** oculis duobus.*

fuſca. 19. Pl. fuſca nigro-venoſa oblongo-lanceolata anterius truncato ſubretuſa, poſterius acuta.

*Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 21. *t.* 1. *f.* 13. a. b. Faſciola fuſca.

*Habitat vulgatiſſima in* Europæ aquis ſtagnantibus herboſis, *ad* Menyanthis, Sii aquatici, Nymphææ folia, *tenerrima, limacis more in ſuperficie aliorum corporum gliſcens, per aquas ſat celeriter currens, dum quieſcit aut irritatur, ſe contrahens forma mutabili; nonne eadem cum torva?*

lactea. 20. Pl. depreſſa oblonga alba anterius truncata. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 61. *n.* 185. *zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 109. *f.* 1. 2.

*It. goth. p.* 250. Hirudo depreſſa alba, lateribus acutis.

*Habitat frequens in* paluſtribus *ſub* nymphææ foliis, *poſterius acuminata, margine laterali acuto, macula media lactea retrorſum in lineam pallidam extenſa, vaſis linearibus apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interaneis ſæpe laete purpureis.*

torva. 21. Pl. depreſſa oblonga cinerea vel nigra ſubtus albida, irine alba. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 62.

*n.* 186. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 5. 6.
*Habitat in* aquis, 4-5 *lineas longa, anterius obtusa, posterius subacuminata, oculis subtus pellucentibus, poris ventralibus albis interaneis pinnatis fuscis, interdum nigricans, poris subtus tribus, & macula pone oculos angulari alba.*

tentaculata. 22. Pl. depressa oblonga cinerea anterius tubulosa. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 63. *n.* 187.
*Habitat in* aquis paluſtribus, 7 *lineas longa, supra solida ventre repens, in aquis ventre dorsoque aeque mota, utrinque fere perinde obtusa, marginibus lateralibus sinuatis, macula dorsi media albida, ventre interdum albo dorsoque fusco, rarius dorso fusco punctis nigris marginato & ventre cinereo, interaneis subtus nunc conspicuis nunc inconspicuis: pinnis nunc simplicibus nunc furcatis.*

crenata. 23. Pl. depressa ovato-oblonga pallida margine crenulato. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 188.
*Habitat rara in* lacu vici Lyngbye Daniæ, *lacteat facie, dorso obscure brunneo: macula media alba, interaneis ramosissimis.*

Helluo. 24. Pl. ovata teres viridis. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 189. *zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 3. *prodr. n.* 2692.
*Habitat in* pratis inundatis, *ad sesquilineam longa, punctatae facie, anterius obtusa, posterius acuminata, dorso obscuro, ora candida.*

obscura. 25. Pl. ovato-oblonga utrinque obtusa alba. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 190.
*Habitat in* piscinis, *lineam longa, subpellucida.*

rostrata. 26. Pl. oblonga hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 191. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 6.

*Ha-*

*Habitat in* paludosis, *lineam longa, candida, media massa helvola.*

atomata. 27. Pl. plana membranacea alba, superne atomis sparsis rufis. *Mull. zool. dan prodr.* 2706. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 73. *zool. dan.* 1. *p.* 115. *t.* 32. *f.* 3. 4.
*Habitat in* sinu Norwegiæ Droebacensi, *doridis obvelatae facie, subtus immaculata, punctorum nigrorum agminibus* 2 *oculos referentibus.*

cornuta. 28. Pl. plana oblongiuscula, tentaculo ab utroque capitis latere. *Mull. zool. dan. prodr.* 2681. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 74. *zool. dan.* 1. *p.* 116. *t.* 22. *f.* 5-7.
*Habitat in* sinu Norwegiæ Droebacensi, *albida, subtus albo-punctata, fine anteriori probosscidis instar exsertili & retractili, pone tentacula agmen punctorum nigrorum angulatum aliudque ad basin utriusque.*

radiata. 29. Pl. oblonga rufa, dorso rosula candida. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.*66. *n.*192. *zool. dan.* 3. *p.*41. *t.* 106. *f.* 1. & *t.* 109. *f.* 7-9.
*Habitat rara in* aquis silvaticis, *prima facie vorticellam rotatoriam referens, sesquilineam longa, opaca: margine pellucido, antrorsum radiis pallidis, medio macula candida varia.*

strigata. 30. Pl. oblonga pallida: lineis tribus longitudinalibus. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 193. *zool. dan.* 3. *p.* 41. *t.* 105. *f.* 8.
*Habitat in* aquis paludosis, *strigis rufis.*

grossa. 31. Pl. cylindracea alba, anterius & posterius acuminata: oculis nigris. *Mull. hist. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 194. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 5.
*Habitat in* plantis aquaticis, 2 *lineas longa, inter-*

*terdum decuplo minor , pellucida , ovis 5-33 magnis , ſphaericis , rubris , confertis.*

linearis. 32. Pl. elongata teretiuſcula pallide lutea. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.*67. *n.* 195. *zool. dan.*3. *p.*42. *t.* 106. *f.* 2.

*Habitat in* ſilvarum foveis paluſtribus , *ſeſquilineam longa , decuplo latitudine ſua longior : margine pellucido candido , obvia evitans.*

terreſtris. 33. Pl. linearis ſupra convexa cinerea ſubtus alba. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 68. *n.* 196.

*Habitat in* aſſeribus muſcisque humidis , *qua terram ſpectant , extra humiditatem paucorum minutorum intervallo pariens , hirudinis inſtar ſe contrahens & expandens , limacis more progrediens , & viſcoſa , ut igitur utrumque genus jungat , opaca.*

tetragona. 34. Pl. lutea , lamellis quadrangulis quatuor. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 69. *n.* 197. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 1-5.

*Habitat rarior in* ſtagnis foveisque aquæ purioris , *lamellis ſubmembranaceis pellucidis , ſæpius octolatera , rarius bilatera.*

capitata. 35. Pl. oblonga cinerea , capite diſcreto. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70.

*Habitat in* mari Balthico , *torvae affinis , at capite diſcreto faſciolas limacibus aquaticis nectens , reſupinata quieſcens & ut plurimum aquae innatans , viſcida , anterius obtuſa , poſterius acuminata , ſupra gibba nigricans : punctis albis ſparſis , ſubtus plana alba ; verſus oram utriuſque lateris ſuperne macula alba , in cujus angulo externo oculus.*

caudata. 36. Pl. anterius rotundata , poſterius in caudam at-

attenuata. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70. *zool. dan. prodr.* 2702. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 80. *zool. dan.* 2. *t.*68. *f.*13. 15. *O. Fabr. Fn. groenl.*310.
*Habitat gregaria in* Groenlandiæ fucis ulvisque littoralibus, *vivaciſſima*, 2 *lineas longa*, *a flavo rufa ſubconvexa.*

auricu-lata. 37. Pl. oblonga anterius truncato-emarginata, poſterius acuta. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.*16. 17. *rar.* 2. *p.* 81.
*Habitat in* ſinuum Norwegiæ aqua marina, *nudo oculo inconſpicua*, *gelatinoſa*, *pellucida*, *macula media opaca oblonga*, *in formam ſphaericam & ovatam paſſim ſe contrahens.*

filaris. 38. Pl. linearis, cauda filiformi contractili. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 18-20. *rar.* 2. *p.* 82.
*Habitat in* madrepora prolifera, *limacis more vitri parietes adſcendens*, *pollicem longa*, *lineam lata*, *carnoſa*, *ex rufo fulva*, *anterius obtuſa*, *poſterius macula rufa notata*, *antrorſum ciliis breviſſimis micantibus obſita.*

Lingua. 47. Pl. pellucida fuſco cinerea utroque fine obtuſiſſima. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 7.
*Habitat* auctumno *in* piſcinis.

**** *oculis tribus.*

Geſſe-renſis. 39. Pl. elongata viridis pone caput rufa. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 5-8. *rar.* 2. *p.* 70.
*Habitat in littoris* Geſſerenſis Falſtriæ fuco furcellato, *teres*, *anterius obtuſa*, *poſterius acuminata*, *corporis ſegmentis inæqualibus*, *ſeric punctorum albidorum minimorum inſcriptis : interſectionibus pallidis.*

***** *oculis quatuor.*

marmorata. 40. Pl. oblonga pallida. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71. *n.* 198. *zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 2.
*Habitat rara in* foſſis aquaticis, *dimidiam lineam longa, ex caeruleo griſea, interaneis glomeratis albis: macula media magna rotunda flava.*

candida. 41. Pl. elongata albida. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71.
*Habitat in* Groenlandiæ *littore ſub* lapidibus, 2-3 *pollices longa, admodum glutinoſa, linea media longitudinali lactea, ore tubulum exſerente.* O. Fabricius.

truncata. 48. Pl. pallide rubens, antrorſum late truncata, poſterius acutiuſcula. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 1.

****** *oculis pluribus.*

tremellaris. 42. Pl. plana membranacea lutea, margine ſinuato. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 72. *zool. dan.* 1. *t.* 32. *f.* 1. 2. *prodr.* 2705. *rar.* 1. *p.* 72.
*Habitat in* mari Balthico Hafniam *alluente in* ſinu Chriſtianenſi & Droebacenſi Norwegiæ, *tremellam referens, 9 lineas longa, tarda ſupra cineraſcens, diſco ſubluteo: media linea pinnata infraque hanc lunulae duae albae, ſubtus albicans, maculis tribus lacteis.*

279. SIPUNCULUS. *Corpus* teres elongatum.
*Os* anterius attenuatum cylindricum.
*Apertura* lateralis corporis verruciformis.

nudus. 1. S. epidermide ſtricta. *Martin. on marin. verm. &c.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1078. *n.* 1. Sipunculus corpore nudo.
*Geſn. aq.* 1026. Vermis mærorhynchopterus Rondeletii 2.
*Bohadſch mar.* 93. *t.* 7. *f.* 6. 7. Syrinx.
*Habitat in* Oceano europæo *ſub lapidibus.*

ſaccatus. 2. S. epidermide laxa.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. Sipunculus corpore tunica laxa induto.
*Martin. on mar. vermſ.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3 ? Sipunculus reticulatus.
*Amoen. acad.* 4. *p.* 454. *t.* 3. *f.* 5. Nereis ſacculo induta.
*Geſn. aq.* 1026. Vermis macrorhynchopterus 1.
β) Lumbricus phalloides. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 8.
*Habitat in* Oceano indico, *etiam* Vitamnico β) americano, inſulam Granadam *alluente.*

280. HIRUDO. *Corpus* oblongum, anterius & poſterius truncatum, muticum, cartilagineum, os caudamque dilatando progrediens.

indica. 1. H. depreſſa fuſca, ſtriis tranſverſis muricatis centum.
*Ha-*

*Faſciola cornuta* Com. Raſumowsky *vix hujus generis.*

*Habitat in* Indiæ marinis, *ore admodum dilatato, ſtriis annularibus expanſis elevatis.*

medicinalis. 2. H. elongata nigricans: ſupra lineis verſicoloribus, ſubtus maculis flavis. *Muſl. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 37. *n.* 167.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1079. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2079. *Amoen. acad.* 7. *p.* 42. Hirudo depreſſa nigricans ſupra lineis flavis ſex intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata.

*Hill. hiſt. anim. p.* 16. Hirudo nigreſcens flavo variegata.

*Raj. inſ.* 3. *Schmuck chir. Schrift.* 1. Hirudo medicinalis.

*Geſn. piſc.* 425. *t.* 425. Hirudo major & varia.

*Bergman act. Stockh.* 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2.

*Gisler act. Stockh.* 1758. *p.* 95. *n.* 1.

*Salomon act. Stockh.* 1760. *p.* 35.

*Habitat in* ſtagnis & paludoſis, *praeſtantiſſima phlebotomus, imprimis haemorrhoidum, ſupra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis conſtans, lineis in dorſo utrinque 4, prima rufa, altera rufa nigro maculata, tertia nigra, quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis orisque uncis, ut videtur, nullis.*

ſanguiſuga. 3. H. elongata nigra, ſubtus cinereo-virens: maculis nigris. *Muſl. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 38. *n.* 168.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1079. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2078. *Amoen. acad.* 7. *p.* 44. Hirudo depreſſa fuſca, margine laterali flavo.

*Hill hiſt. anim. p.* 26. Hirudo nigra abdomine plumbeo.

*Raj. inſ.* 3. Hirudo maxime vulgaris.

*Fetiv. gazoph. t.* 130. *f.* 7.

*Bergm. act. Stockh.* 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.

*Gisl. act. Stockh.* 1758. *p.* 95. *n.* 2.

*Ha-*

*Habitat in* foſſis, ſtagnis, paluſtribus, *ultra* 4 *pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculato, a Norlandis medicinalis inſtar adhibita, cruoris adeo avida, ut novem ſanguine & vita privare equum dicuntur, a dyticorum larvis nonnunquam ad mortem usque exſuctа.*

lineata. 10. H. elongata griſea, dorſo lineis quatuor longitudinalibus nigris. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 39. *n.* 169.

*Habitat rara, primo vere in paludoſis,* 16 *lineas longa rugis confertis annulata, oculis* 6 *aterrimis ſerie duplici tranſverſim diſpoſitis.*

vulgaris. 4. H. elongata flavo fuſca, oculis octo: [illegible] nata. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 40. *n.* 170.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1079. *n.* 4? *Fn. ſuec.* 2080. Hirudo (octoculata) depreſſa fuſca, punctis octo nigris ſupra os.

*Bergm. act. Stockh.* 1756. *p.* 199. & 1757. *t.* 6, *f.* 5-8.

*Habitat vulgatiſſima in* plantis aquaticis, 15 *lineas longa monoculis & animalculis infuſoriis minimis, helicum quoque incolis victitans, ab his poſtremis jure talionis iterum exſucta, ovulis in gravida ſphaericis diaphanis ad* 70, *oculis interdum* 9, *nunc fuſca immaculata, nunc cinerea punctis nigris ſuperius conſperſa, nunc fuſca, punctis flaveſcentibus ſupra conſperſa, nunc luteo-fuſca: linea media nodoſa, laterali nigricante anterius intus pinnata, nunc flaveſcens, lineis longitudinalibus, media nodoſa, lateralibus punctis remotis ſanguineis.*

biocu-lata. 5. H. elongata cinerea, oculis duobus. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 41. *n.* 171. *Syſt.*

---

*Non miſſura extim, niſi plena cruoris hirudo pellitur inſperſa muria.*

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1079. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2081. Hirudo (ſtagnalis) depreſſa nigra, abdomine ſubcinereo.

*Bergm. act. Stockh.* 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 9-11.

*Habitat frequens in* paludoſis foveis nemoroſis, rivis, 9 *lineas longa, cum incola helicis planorbis ſaepe conflictans, tota albida, pellucida, punctis cinereis conſperſa, ad latus plicata, crenulata, ovis ad* 40 *ingravida, circulo pellucido cinctis, junioribus cinereis, maturioribus fuſcis, pullis jam excluſis cauda matris ventri adhaerentibus.*

complanata. 6. H. dilatata cinerea, linea dorſi duplici tuberculata, margine ſerrato. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 47. *n.* 175.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1079. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2082. Hirudo depreſſa ovato-oblonga interaneis fuſcis pinnatis pellucentibus.

*Hill. anim. p.* 16. Hirudo lateribus atttenuatis.

*Bergm. act. Stockh.* 1757. *t.* 6. *f.* 12-14. Hirudo ſexoculata.

*Habitat haud frequens in* rivis 4 *lineas longa, deſes, helicum incolas aggrediens, faſciis tranſverſis e lineis* 3 *pallidis compoſitis varia, margine albido, ſubtus griſea, capite acuminato albo, oculis ſex, cauda orbiculata cinerea.*

hyalina. 7. H. dilatata pellucida flava: margine integro. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 49. *n.* 176.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1080. *n.* 7. Hirudo (heteroclyta) hyalina poſtice lutea.

*Trembl. hiſt. polyp. t.* 7. *f.* 7.

*Ledermull. microſcop. p.* 165. *t.* 84. *f.* k-q. (Junior.)

*Habitat in* rivorum plantis aquaticis, *quieta,* 7 *lineas longa, ſaniem ex incolis helicis planorbis emanantem frequenter ingurgitans, planiuſcula, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, ſupra ſtriis*

*ſtriis atomorum longitudinalibus cineraſcentibus, ſubtiliſſimis, confertis, & tranſverſis remotis fuſceſcentibus, remotioribus nigris punctisque fulvis ſparſis varia, capite albo, oculis 4-6, matre ova ſphaerica, viridia, annulo pellucido cincta ad 100, ex quibus pulli primi partus flavi, ſecundi virides prodeunt geſtante.*

piſcium. 8. H. elongata flavicans: linea dorſali pinnata alba. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 43. *n.* 172. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1080. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2083. Hirudo (geometra) teres, extremitatibus dilatatis.
*Hill. hiſt. anim. p.* 17. Hirudo dorſo elevato, cauda latiore.
*Friſch inſ.* 6. *p.* 25. *t.* 11. Hirudo ore caudaque ampla.
*Roeſ. inſ.* 3. *p.* 199. *t.* 32. Hirudo piſcium.
*Bergm. act. Stockh.* 1757. *p.* 310. *n.* 3.
*Ledermull. microſcop. t.* 84. *f.* a-i.
*Geſellſchaftl. Erzaehl.* 4. *p.* 303.
*Habitat in* aquis dulcibus, 8 *lineas longa, piſces infeſtans, antrorſum attenuata, interdum cinerea: ſubtus flava, fuſco-punctata ſine anteriori albo: margine diſcoque fuſceſcente, poſteriori albido, radiis fuſcis punctoque intermedio nigro, oculis* 4.

teſſulata. 11. H. cinerea, margine teſſulato, oculis octo: ſerie duplici longitudinali. *Mull. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 45. *n.* 173.
*Habitat rara in* rivis, *pro aetate admodum varia, raro quieta, junior elongata, provectior dilatata, ad* 18 *lineas longa, atomis undique nigris, ſupra maculis aurantiis vel albis, margine maculis albis, vel partim griſeis partim aurantiis varia ſubtus griſea: maculis* 2 *mediis rotundis albis, femina interdum pullis* 300 *foeta.*

mar-

marginata. 12. H. dilatata fusca, margine tessulato, oculis quatuor. *Mull. hist. verm.* 1. 2. *p.* 46. *n.* 174.
*Habitat rara in* rivo, *tessulatae affinis*, 10 *lineas longa*, *capite candido pellucido*: *fasciis* 2 *transversis fuscis*, *anterius obtuso posterius coarctato*, *abdomine ex fusco brunneo*: *striis subtilissimis subtus in lineolas duplicatas fuscas coeuntibus*, *punctorum alborum in dorso seriebus* 5, *margine laterali albo*, *lineola duplici fusca in quadratas areas diviso*, *cauda orbiculata pallida*: *marginis maculis fuscis.*

grossa. 13. H. dilatata flavicans anterius fissa. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *t.* 21. *f.* 1-5. *prodr.* 2668. *rar.* 1. *p.* 43.
*Habitat in* mari, *venerem exoletam intrans*, 12 *lineas longa*, & 7 *lata*, *striis subtilissimis albis exarata*, *anterius angustata*, *obtusa*, *matre ovulis pellucidis sphaericis in latice gelatinoso natantibus ad* 1000 *referta.*

Hippoglossi. 14. H. dilatata albida medio corporis ocello didymo candido. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 54. *f.* 1-4. *prodr. p.* 2669. *rar.* 2. *p.* 41. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *t.* 1. *f.* 8.
*Bast. opusc. subsec.* 2. *p.* 138. *t.* 8. *f.* 11.
*Habitat in* cute Pleuronectis Hippoglossi, *cui tuberculis*, *hamulis*, *cuspidibus tenacissime adhaeret*, *ovalis*, *depressa*, *pellucida anterius subacuminata*, *posterius in orbiculum desinens*, *capite subtriangulari macula cinerea utrinque notato*, *oculis non conspicuis*, *cauda subtus tuberculis seriatim a centro excurrentibus hamulis* 2, *ac versus medium cuspidibus* 2 *armata.*

muricata. 9. H. teres, corpore verrucoso. *Fn. suec.* 2084. *Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *t.* 8. *f.* 3.
*Rondel. aquat.* 2. *p.* 111. Hirudo marina.
*Bast. opusc. subsec.* 1. *p.* 82 *t.* 10. *f.* 2. Hirudo piscium.
*Habitat in* Oceano atlantico.

11.

## II. MOLLUSCA.

*Animalia ſimplicia, nuda ( abſque teſta inhabitata ) artubus inſtructa.*

282. LIMAX. *Corpus* oblongum repens: ſupra clypeo carnoſo: ſubtus diſco longitudinali plano.
*Foramen* laterale dextrum pro genitalibus & excrementis.
*Tentacula* 4 linearia ſupra os, oculis in apice majorum.

lævis. 8. L. niger glabriuſculus. *Muller hiſt. verm.* II. *p.* 1. *n.* 199.
*Habitat haud frequens* Octobri *in* muſcis, 5 *lineas longus, nitidus, clypei ſtriis tranſverſis undulatis, atro anguſtior.*

ater. 1. L. niger rugoſus. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 2. *n.* 200.
α) Limax aterrimus ſubtus pallidus.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2088. *Liſt. anim. angl. p.* 131. *t.* 2. *f.* 17. *ſynopſ. f.* 102. *tab. anat.* 5. *f.* 1. 23. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 1-5. Limax ater.
*Aldrov. inſ.* 702. Limax tota nigra.
*Geſn. aquat. p.* 254. Cochlea nuda.
*Argenv. conch. t.* 28. *f.* 28.

*Sib-*

Limaces *voraces, hortis, agris, pratis infeſti, a cornicibus, anatibus, aliisque volucribus & mammalibus ſæpius devorati, cineribus, fuligine arcendi pellendi, crebræ experimentorum redintegrationem vermium teſtantium victimæ, gelatina ſua viſcida glutinant, nutriunt, involvunt, hinc nuperius a medicis commendati, diſcutiente etiam vicelebrati; an diſtincti a reliquis faſciatus & luteus a* Com. Raſumowsky *hiſtor. natur. Jorat.* 1. *p.* 267, & 209. *memorati?*

*Sibbald. prodr. hiſt. nat. Scot.* 2. *l.* 3. *p.* 34.
*Hill. hiſt. anim. p.* 87. *t.* 3.
*Berl. Magaz.* 3. *p.* 341. *t.* 5. *f.* 72.
β) Limax ater, dorſi carina pallide virente.
γ) Limax niger, ore luteſcente ſubtus albus.
*Swammerd. bibl. nat.* t. 9. *f.* 1.
δ) Limax ex fuſco caſtaneus, ore luteſcente ſubtus albus.
*Liſter ſynopſ. t.* 101. a. *f.* 103. & *app. t.* 2. *f.* 1. Limax ſubrufus.
*Berl. Magaz.* 3. *p.* 339. *t.* 6. *f.* 71.
ε) Limax obſcure fuſcus, ore ſtrigaque utrinque luteſcente.
*Habitat* α) *vulgaris in* ſilvaticis, β) *in nemoroſis*, γ, δ, ε *rariores in* hortis, *a* 16 *lineis ad* 5 *pollices longus, tentaculis ſemper nigris, clypeo punctis confertis ſcabriuſculo, abdominis dorſo ſulcis rugoſo, corporisque ora lineolis nigris tranſverſis teſſulata.*

albus. 2. L. albus. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 4. *n.* 201.
α) Limax totus albus.
β) Limax albus, margine flavo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 2. *Muller Efterv. an. Swamp. Hafn.* 1763. *p.* 61.
γ) Limax albus, margine & ſyncipite aurantio.
δ) Limax albus, tentaculis nigris.
*Habitat in* nemoribus ſilvisque, 3 *lineas ultra* 5 *pollices longus, colore conſtante.*

ſucci-neus. 3. L. ſupra ſubrufus, ſubtus albus. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 7. *n.* 203.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 3. Limax (rufus) ſubrufus.
*Aldrov. inſ.* 702. Limax magna colore rufo.
*Hill. hiſt. an. p.* 87. *t.* 3.
*Habitat in* umbroſis, ad montium radices, *ſeſquipollicaris, ſine maculis aut cingulo, tentaculis majoribus ſupra nigris.*

cinereus. 4. L. cinereus maculatus & immaculatus. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 5. *n.* 202.
*Liſter exerc. anat. t.* 3. *f.* 6. 7. 9. 10. Limax maximus cinereus ſtriatus.
α) Limax immaculatus, clypeo nigro-cæruleo.
β) Limax clypeo maculis, abdomine faſciis longitudinalibus nigris.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2090. *It. oel.* 61. Limax (maximus) cinereus maculatus.
*Liſter anim. angl. p.* 127. *t.* 2. *f.* 15. Limax cinereus maximus ſtriatus & maculatus.
*Swammerd. bibl. nat. t.* 8. *f.* 7. Cochlea nuda domeſtica.
*Sibb. prodr. hiſt. nat. Scot.* 2. l. 3. *p.* 33.
*Schirach von Erdſchneck. t.* 2. *f.* 10.
*Berl. Magaz.* 3. *p.* 336. *t.* 9. *f.* 69.
γ) Limax clypeo abdomineque maculis nigris.
*Liſt. ſynopſ. f.* 104. *tab. anat.* 5. *f.* 6-10. Limax variegatus ſive faſciatus cellarius.
*Argenv. conchyl. t.* 28. *f.* 31. Limax cellaria.
δ) Limax abdomine ſtriis quinque albidis: infima abrupta.
ε) Limax abdomine rugis albis cinereisque ac maculis nigris ordine duplici.
ζ) Limax margine albo.
*Habitat* α) *vulgaris* β) *rarior in* nemoroſis, *reliquae rariores* γ) *in* hortis, ε) *in* ſilvis, δ) & ζ) *in* umbroſis, *ultra* 5 *pollices longus*, ζ) *minor.*

hyalinus. 5. L. hyalinus, tentaculis obſoletis: lineola fuſca a tentaculis ad clypeum.
*Habitat in* muſcis, *phaſeoli cotyledonibus infeſtus, cineribus clavellatis petlendus, rugis ventris creberrimis interruptis.* Scopoli.

agreſtis. 6. L. albidus, tentaculis nigris. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 8. *n.* 204.

*Siſt. nat.* XII. 2. *p.* 1082. *n.* 6. Limax cinereus immaculatus.

*Liſt. anim. angl. p.* 130. *t.* 2. *f.* 16. Limax cinereus parvus immaculatus pratenſis.

*Liſt. ſynopſ. f.* 101. *tab. anat.* 5. *f.* 11. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 11. Limax parvus cinereus.

*Argenv. conchyl. t.* 28. *f.* 27.

*Berl. Magaz.* 36. *p.* 345. *t.* 8. *f.* 74.

*Schirach von Erdſchn. t.* 1.

*Blanka inſ.* 151. *t.* 13. *f. X.*

α) Limax totus albidus immaculatus.

β) Limax albidus clypeo flaveſcente.

γ) Limax albidus, capite nigro.

δ) Limax albidus, dorſo cinereo.

ε) Limax albidus, atomis nigris ſparſis.

*Habitat in* hortis, pratis, agris nemoribusque α Majo *ad* Decembrem *usque*, 2-9 *lineas longus*, *autumno ſecale recens ſatum depaſcens*, *in hortis ſaepius nocte helianthum annuum adſcendens ejusque folia conſumens*, *tactus digito quaſi mortuus viſcoſitate ſua adhaerens*, *occidente ſole revivi-ſcens*, *victumque quaerendo vagans*, *ſi digito rurſus tangatur*, *tentacula quidem condens*, *mox vero exſertis pergens*, *clypei & abdominis linea longitudinali nulla*, *tentaculis minoribus minimis*, *medicato uſu celebris.*

cinctus. 9. L. flaveſcens, clypes abdomineque cingulo cinereo. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 9. *n.* 205.

*Habitat haud frequens in* nemoroſis, *immaculatus*, *ſubtus albus*, 2 *pollices longus.*

margi-natus. 10. L. cinereus, clypeo utrinque ſtriga obſcura, abdomine pallide cæruleſcente. *Mull. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 206.

*Habitat in* fago, *primo vere & Novembri vulgaris*, *colore cum aetate non mutato*, *dorſi carina alba*, *utrinque ex cinereo ſubcaeruleſcente*, *abdomine interdum nigro-maculato.*

re-

reticulata. 11. L. fuscus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. *Mull. hist. verm.* II. *p.* 10. *n.* 207. *Schaeff. Vers. mit. Schnecck.* 1. *t.* 1. & *t.* 2. *f.* 1-3. *Habitat vulgaris in* Daniæ & Germaniæ hortis, *sesquipollicaris.*

flavus. 7. L. flavus maculatus. *Fn. suec.* 2092. *List. exerc. anat.* 1. *t.* 1. Limax succini colore, albidis maculis insignitus. *Habitat inter* herbas; *an propria species?*

aureus. 12. L. flavus immaculatus. *Mull. hist. verm.* II. *p.* 10. *n.* 208. *Habitat in* Daniæ & Norwegiæ umbrosis, *sesquipollicaris, subtus albus, linea inter tentacula intermedia tentaculisque ipsis nigris.*

fuscus. 13. L. rufescens, linea laterali dorsoque nigricante. *Mull. hist. verm.* II. *p.* 11. *n.* 209. *Habitat in* nemorosis, *subtus albus, abdominis macula longitudinali fusca,* 8 *lineas longus.*

tenellus. 14. L. virescens, capite tentaculisque nigris. *Mull. hist. verm.* II. *p.* 11. *n.* 210. *Habitat primo vere in* nemorum fossulis *foliis aridis repletis,* 10 *lineas longus, clypeo albido in luteum vergente.*

lanceolaris. 15. L. lineari lanceolatus utrinque acutissimus, margine undique limbo membranaceo aucto, tentaculis nullis. *Pall. spic. zool.* 10. *p.* 19. *t.* 1. *f.* 11. *Habitat in* mari Cornubiam *alluente, margine subtus bilabiato & sulcato, laterum striis obsoletis antrorsum obliquatis, prope dorsum angulo recurvatis: vix hujus generis, sed cujus?*

283. APLYSIA. *Corpus* repens, obvelatum membranis reflexis: *Clypeo* dorsali membranaceo pulmones obtegente.
*Foramen* laterale dextrum pro genitalibus.
*Anus* supra extremitatem dorsi.
*Tentacula* quatuor anterius sita.

depilans. 1. Apl. tentaculorum membranarumque margine cum disco concolore.
*Syst. nat. X. p.* 653. Tethys limacina.
*Rondel. pisc.* 1. *p.* 520. Lepus marinus.
*Gesn. aquat.* 475. Lepus marinus Rondeletii.
*Bohadsch. marin.* 3. *t.* 1. 2. 3. Lernea (graphice).
*Seb. mus.* 3. *t.* 1. *f.* 8. 9.
*Habitat in* Mari mediterraneo, *sanie depilans tactu* (*B.* 51.) *foetidissima ad nauseam usque.*

fasciata. 2. Apl. nigra unicolor, membranis tentaculisque margine coccineis. *Poiret voy. en* Barbarie. 2. *p.* 2.
*Habitat ad* Barbariæ *littora, sub rupibus degens, contacta laticem nigrum rubrumque, nequaquam tamen foetidum aut depilantem eructans.*

284. DORIS. *Corpus* repens, oblongum, subtus planum.

*Os* anterius subtus.

*Anus* posterius in dorso, supra cinctus ciliis.

*Tentacula* duo ad quatuor, supra corpus antrorsum intra foramina retractilia.

* *corpore retrorsum acuminato, supra convexo nudo*, Limaciæ Mulleri.

verrucosa. 1. D. corpore supra undique tuberculato.
*Rumpf mus.* 38. Limax marina verrucosa.
*Seb. mus.* 2. *t.* 61. *f.* 5. Mitella verrucosa.
*Habitat in* oceano indico, *semicylindrica, fine anteriori rotundato, tentaculis brevissimis, margine laterali deflexo, pede ovali, oblongo, margine plano.*

clavigera. 5. D. ovalis candida, pedicellis dorsi clavatis croceis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2770. *zool. dan.* 1. *p.* 58. *n.* 22. *t.* 17. *f.* 1-3. *Act. Nat. Curios.* 6. *p.* 118.
*Bommé act. Vliss.* 3. *p.* 296. *n.* 4. *f.* 3 ? geknootide Zee-Slakje met *vie.* Hoornen.
*Habitat in* fucis maris Norwegici, *gelatinosa, subpellucida, cauda acuta: macula flava; capitis verruca laterali flava, truncata, tentaculis 2 croceis.*

quadrilineata. 6. D. alba, lineis quatuor nigris, auriculis sulphureis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 59. *n.* 23. *t.* 17. *f.*

---

Dorides, *in mari habitantes structurae quoque majori elegantia a limacibus in terra degentibus distant, plures jam, sed imperfectius justo ab* Aldrovando *descriptae, prima ab* Aeliano.

*f.* 4-6. *prodr.* 2771. *Act. nat. Cur.* 6. *p.* 50.
*Habitat in* sinuum maris Norwegici *fucis, congeneribus agilior, sulphureis maculis varia, tentaculis* 2 *albis, brevibus distantibus.*

fasciculata. 7. D. linearis ex cinereo ferruginea, papillis dorsi acutiusculis subferrugineis.
*Forsk. Fn. arab. p.* 99. *n.* 3. *anim. t.* 26. *f.* 5. Limax marinus.
*Habitat in* mari mediterraneo, *frustulis ligneis natantibus adhaerens, pollicem longus, fabius pallidus, tentaculis* 4 *pallidis, pellucidis.*

papillosa. 8. D. supra papillis tecta: linea dorsali lævi.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1082. *n.* 8. *Fn. suec.* 2093. Limax papillosus.
*Baster op. subs.* 1. *p.* 81. *t.* 10. *f.* 1. Doris spinis mollibus hirsuta.
*Forsk. anim. mar. t.* 26. *f.* H? Limax marinus.
*Act. havnienf.* 10. *f.* 11-16. Doris bodoensis.
*Act. Vlissing.* 3. *p.* 318. *f.* 2.
*Habitat in* Oceano europæo.

auriculata. 9. D. alba, fasciculis dorsalibus rubris apice albis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2778.
*Act. havn.* 10. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 6.
*Habitat in* mari Norwegico.

lacinulata. 10. D. albida, papillis dorsi obovatis utrinque sex.
*Forsk. Fn. arab. p.* 99. *n.* 4. *anim. t.* 26. *f.* 4. Limax tergipes.
*Habitat in* fundo maris ad fretum Oeresund *inter* fucos, *magnitudine pediculi majoris, forma variabili, plurium vermium more supinus reptans.*

minima. 11. D. pallide cinerea, papillarum dorsalium seriebus quatuor. *Forsk. Fn. arab. p.* 100. *n.* 5. *Ha-*

*Habitat in* mari mediterraneo, *fucis natantibus incumbens, feminis oryzae magnitudine, subtus pallidior, oblongo-orbata, tentaculis 4, juxta caput albis, papillis plurimis ex ovato oblongis, obtusis, cinerascentibus.*

cervina. 12. D. ex rubescente cinerea, papillis dorsi octonis ramosis.

*Bommé act. Vliss.* 3. *p.* 290. *n.* 2. *f.* 1. Haarts hoorn gelyk getakte Zee-flakje.

*Habitat in* fertularia abietina, $\frac{1}{3}$ *pollicis longa, capite etiam caudaque papillis ramosis ornata, clavigerae affinis.*

radiata. 13. D. ex argenteo caerulea, subtus alba, papillis lateralibus quaternis radiato-dentatis. *du Pont act. angl.* 53. *p.* 57. 58. *t.* 3.

*Habitat in* Oceano, *ultra pollicem longa, fasciculatae affinis, tentaculis 4, linea dorsi media argentea, lateralibus 2 apice profunde caeruleis.*

coronata. 14. D. lactea, subtus hyalina, papillis dorsi rubro punctati pyramidalibus utrinque sex apice rubris.

*Bommé act. Vliss.* 1. *p.* 394. *t.* 3. *f.* 1-3. & 3. *p.* 288. Gekuifde of gekroonde Zeeflakje.

*Habitat ad littus insulae* Walcheren Seelandiae, $\frac{3}{8}$-$\frac{5}{8}$ *pollicis longa.*

pennata. 15. D. dorso papillis retrorsum incumbentibus subcylindricis tecto.

*Bommé act. Vliss.* 3. *p.* 292. *t.* 3. *f.* 2. Gevederde of zacht gedoornte Zeeflakje.

*Habitat ad* Seelandiae *littus in zoophytis, quorum quoque colorem nunc ex cinereo album, nunc rubescentem refert,* $\frac{1}{8}$-$\frac{1}{4}$ *pollicis longa, fertilissima, tentaculis 4.*

pe-

peregrina. 16. D. tentaculis quatuor non retractilibus, corpore lacteo, cirrorum ex fusco caeruleorum in dorso seriebus decem. *Cavolin. polip. mar. 3. p. 190. t. 7. f. 3.*

*Habitat in* mari mediterraneo, *ad* promontorium Misenense.

affinis. 17. D. purpurea, dorso cirrorum seriebus septem, tentaculis quatuor non retractilibus annulatis apice albis. *Cavol. polip. mar. 3. p. 193. t. 7. f. 4.*

*Habitat in* mari mediterraneo, *circa promontorium* Misenense.

tetraquetra. 18. D. quadrangularis coriacea, posterius acuminata supra plana: angulis carunculato-hiulcis. *Pallas nov. act. Petrop. 2. p. 237. t. 5. f. 22.*

*Habitat in* mari Kurilas *insulas alluente, a quarum incolis conda coctaque comeditur, media inter utrumque tribum.*

** *corpore utrinque obtuso, plano, tecto.*

fusca. 2. D. ovalis, lamella scabra punctata. *Mull. zool. dan. 2. p. 22. t. 47. f. 6-8. prodr. 2768. rar. 2. p. 22.*

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1083. *n.* 2. Doris (bilamellata) corpore supra lamella plana scabra.

*Fn. suec.* 2094. Limax bilamellatus.

*Habitat in* mari Norwegico, *limacis more incedens, glaber, supra pallide fuscus cinereo punctatus, subtus albus, lamella tegente supra sulphureo punctata, subtus alba, glabra, tentaculis 2 fuscis, ano transverso plumis 6 sulphureis cincto.*

obvelata. 19. D. alba, corpore elongato: lamella repanda supra punctata. *Mull. zool. dan. 2. t. 47. f. 1. 2. prodr. 2768. rar. 2. p. 19.*

*Planc.*

*Planc. conch. min. not. p.* 105. *t.* 5. *f.* G. H. Concha fine teſta.

*Habitat in* fundo ſinus Droebacenſis Norwegiæ, *limacis inſtar incedens, ſubpellucida, ſubtus glabra, lamina ſupra punctis convexis aſpera, tentaculis* 2 *ſimplicibus.*

muricata. 20. D. ovalis ſupra undique verrucis luteis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 7. *t.* 85. *f.* 2-4. *prodr.* 2773.
*Habitat in* mari Norwegico.

piloſa. 21. D. corpore ovato luteo pilis mollibus albis tecto, tentaculis occultis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 7. *t.* 85. *f.* 5-8.

lævis. 22. D. ovalis alba, corpore ſupra planiuſculo lævi. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 47. *f.* 3-5. *prodr.* 2774. *rar.* 2. *p.* 21.
*Habitat in* mari Norwegico atlantico, *carnoſa, glabra, ano plumis* 8 *cincto.* Koenig.

arboreſcens. 23. D. tentaculis ramoſis, dorſo gibbo fruticante. *Mull. zool. dan. prodr.* 2776. *Act. havn.* 10. *p.* 14. *t.* 5. *f.* 5.
*Habitat in* mari Norwegico.

frondoſa. 24. D. corpore utrinque cirrhis plurimis ramoſis. *Aſcan. act. Dronth.* 5. *p.* 155. *t.* 5. *f.* 2. Amphitrite frondoſa.
*Habitat in* mari Norwegico, *tentaculis* 2.

Argo. 4. D. ovalis, corpore lævi, tentaculis duobus ad os, ano ciliato phrygio.
*Bohadſch mar.* 65. *t.* 5. *f.* 4. 5. Argo.
*Column. ecphr. t.* 32. Lepus marinus alter major.
*D equemere, journ. de phyſ.* 1779. *jul. p.* 56. *t.* 2. *f.* 10. Limace a plante.
*Habitat in* mari mediterraneo, *coccinea, ano cincto ramis, quaſi opere phrygio laceris.* ſtel-

ſtellata. 25. D. ovalis, ſtella ad anum octoradiata : radiis ramoſis.

*Bommé act. Vliſſing* 3. *p.* 298. *n.* 5. *f.* 4. Eegeltje met cene ſter op de ſtuit.

*Habitat ad littora* Seelandiæ *in alcyoniis, ex albo cinerea, ſubtus plana, ſupra tuberculis obtuſis aſpera, tentaculis* 2.

285. APHRODITA. *Corpus* repens oblongum, ſquamis tectum : pedibus utrinque ſetoſis.

*Os* terminale, cylindricum.

*Tentacula* duo ſetacea annulata.

*Oculi* quatuor.

aculeata. 1. Aphr. ovalis hirſuta aculeata. *Fn. ſuec.* 2099. *Gunner. act. Nidroſ.* 3. *p.* 59. *Pall. miſc. zool. p.* 77. *t.* 7. *f.* 1-13. *Baſter opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 62. *t.* 6. *f.* 12.

*Muſ. Ad. Frid.* 1. *p.* 93. Aphrodita nitens.

*Jacob apud Barthol. act. Hafn.* 3. *p.* 88. *t.* 88. Vermis aureus.

*Barrel. ic. plant. rar. p.* 131. *t.* 1284. Eruca marina.

*Swammerd. bibl. nat. t.* 10. *f.* 8. Phyſalus.

*Red. opuſc.* 3. *p.* 276. *t.* 25. Hyſtrix marina.

*Molyn. act. angl. vol.* 19. *n.* 225. *p.* 405.

*Ruyſch theatr. an.* 1. *p.* 23. *n.* 49.

*Dale hiſt. of Harwich and Doverc. p.* 394.

*Seb. muſ.* 1. *t.* 53. *f.* 3. & *t.* 90. *f.* 1. 2. & 3. *t.* 3. *f.* 7. 8.

*Column. ecphr.* 25. *t.* 26.

*Ha-*

Aphroditæ *per mare vagantur, ſexu diſtincto, ſiccæ facile cum crepitu in ſiuſta diſſiliunt.*

*Habitat in* Oceano europæo, 4-7 *pollices longa*, *teſtaceis victitans*, *craſſa utrinque* 40-41 *pedunculis ornata*, *& ſupra pedunculos faſciculo villorum aureo, cupreo & viridi-caeruleo colore ſplendentium.*

ſcabra. 2. Aphr. oblonga, dorſo ſquamato ſcabro.
*Habitat in* mari belgico, *oniſco paulo longior*, *ſquamis* 20 *alternis*, *ſcabris obtecta*, *pedibus utrinque circiter* 20; *an vere diſtincta ſpecies?*

ſquamata. 3. Aphr. oblonga ſquamis aſperis unicoloribus nigro punctatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1084. *n.* 3. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXIV.
*Mull. von Wurmern &c. p.* 170. *t.* 13. *zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 99. *f.* 1-4. *prodr. n.* 2642. Gedupfelte Aphrodite.
*Pallas miſc. zool. p.* 91. *t.* 7. *f.* 14. a-d.
*Baſt. op. ſubſ.* 2. *l.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
*Habitat in* Oceano europæo, mari glaciali *& ad* promontorium bonæ ſpei, *inter fucos & ſentularias libera vagans*, *& per maris fundum circumrepens*, 11 *lineas ad pollicem usque longa*, *ventre medioque dorſo laevi & nudo*, *reliquo dorſo ſquamis piſcinarum aemulis rigidis ſemipellucidis ochroleucis tecto.*

imbricata. 4. Aphr. oblonga, ſquamis glabris variegatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1084. *n.* 4. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXXVI.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *an propria ſpecies diverſa a ſequenti?* Koenig.

plana. 5. Aphr. oblonga, ſquamis lævibus bicoloribus.
*Mull. von Wurmern. p.* 180. *t.* 14. *f.* 1-5.
*Mull. prodr. zool. dan.* 2644. Aphrodita (cirrata) poſtice acuminata, pedibus cirratis.

*Ha-*

*Habitat in* mari boreali, *praesertim* Islandiam *alluente*, 8 20 *lineas longa*, *utrinque plana*, *caudam versus angustata*, *segmentis* 36, *totidem utrinque pedibu*, *totidemque caudam versus decrescentibus in* 2 *series digestis squamis dorsum contegentibus instructa*, *proboscide magna crassa*.

lepidota. 6. Aphr. oblonga, fascia dorsi longitudinali sanguinea. *Pall. misc. zool. p.* 94. *t.* 7. *f.* 15. a. b. *t.* 8. *f.* 1. 2.
*Bast. opusc. subs.* 1. *l.* 1. *t.* 4. *f.* 3. A-C.
*Habitat satis copiosa in* mari *inter* Angliam & Belgium *intermedio*, *pedunculis* 16, *squamis subtilissime punctatis imbricatis* 14 *parium*, *an satis distincta a plana?*

cirrhosa. 7. Aphr. lineari-attenuata, pedunculis compressis apice bipartitis, squamis vesiculosis. *Pall. misc. zool. p.* 95. *t.* 8. *f.* 3-6.
*Habitat in* mari septentrionali, *tenerrima*, *squamis subrotundis* 11 *parium*, *pedunculis utrinque* 35 *productioribus*; *an satis distincta species?*

violacea. 8. Aphr. oblonga violacea, squamis dorsalibus utrinque quindecim. *Mull. prodr. zool. dan.* 2645. *Act. Nidros.* 4. 93.
*Habitat* - - -

longa. 9. Aphr. squamis concoloribus, medio dorsi nudo, pedibus papilla simplici setigera, cirris lateralibus nullis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2646.
*Habitat in* mari Groenlandiam *alluente*, *inter squamatam & lepidotam media*.

SPIO. *Corpus* protenſum in tubulo, articulatum: filis dorſalibus.
*Pedunculi* ſetis hiſpidi dorſum verſus poſiti.
*Tentacula* 2 longa ſimplicia.
*Oculi* 2 oblongi.

ſeticornis. 1. Sp. tentaculis tenuibus ſtriatis. *O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Geſ.* 6. *p.* 259. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1-7. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1085. *n.* 4. Nereis (ſeticornis) tentaculis capitis binis longitudine fere corporis.
*O. Fabr. Fn. groenl. ſp.* 288. Nereis ſeticornis.
*Baſter op. ſubſ.* 2. *p.* 134. *t.* 12. *f.* 2.
*Habitat gregaria in* Oceano, *potiſſimum ſinus* Groenlandiæ *fundo argillaceo, rarius arenoſo, ad* 3 *pollices longa, tubulo e particulis terreis formato tenui erecto triplo longiore, e quibus animalcula piſcatura exſerit tentacula capillaria, alba, ceterum ex albido viridis: linea dorſi media ſanguinea, poſterius thalaſſina, anterius ex nigro cinerea: ſtriis tranſverſis albis, capite pallido.*

filicornis. 2. Sp. tentaculis craſſis annulatis. *O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Geſ.* 6. *p.* 264. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 8-12.
*Habitat gregaria in* ſinu Groenlandiæ, *oblonga, pollicem longa, flavicans aut rubicunda, linea media & utroque fine cinereis, tubulo fragili, erecto, vireſcente, quem non niſi invita relinquit, tentaculis exſertis & circumvolutis planarias piſcans.*

AM-

AMPHITRITE. *Corpus* protensum in tubulo, annulatum.
*Pedunculi* verrucosi.
*Tentacula* acuminata approximata, plumosa.
*Oculi* nulli.

reniformis. 1. A. corpore rotundato, palpis simplicibus. *Mull. von Wurm. p.* 194. *t.* 16. *f.* 1-3.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 13. *t.* 89. *f.* 1. 2. *prodr.* 3063. Tubularius unicillus.
*Habitat gregaria in fundo* maris Islandiam *alluentis, pulcerrima, rubra, 3 pollices longa, capite arcubus duobus semicircularibus munito, plumis* 14 *colore rubro alboque alternante amoeniss. ornatis, corporis annulis* 80-90, *utrinque tuberculis minimis appositis, cauda acuta non articulata, tubulo, quem vix reliquit, rubro, tenaci, coriaceo, simplici,* 4 *pollices longo; an ad tubulariam referenda?*

Penicillus. 2. A. scuto aculeato, proboscide clavata. *Mull. von Wurm. p.* 8. *n.* 3.
*Column. aquat. & terr. c.* 11. *p.* 22. Προβοσκιδολεκτανος.
*Habitat in syrtibus* maris Neapolin *alluentis ultra* 2 *pollices longa linea media nigra, per totam corporis longitudinem excurrente, fasciculo plumarum numerosissimarum tentacula exornante rubro flavo maculato, proboscide huic aequali; pedunculo albo tubuloso, clava rubra striata, tubulo albo, laevi firmo, interdum inflexo.*

Ventilabrum. 3. A. corpore verrucoso, proboscide nulla. *Muller von Wurmern. p.* 8. *n.* 4.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1269. *n.* 814. Sabella (Penicillus) testa membranacea erecta radicata.
*Ellis corall.* 92. *t.* 34. Corallina tubularia melitensis.

O.

*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 438. *n.* 449. Tubularia Penicillus.

*e) Baſter opuſc. ſubſec.* 2. *p.* 178. *t.* 9. *f.* 1.

*Habitat in* mari mediterraneo, *faſciculo plumarum tentacula exornante in* 2 *brachia diviſo.*

auricoma. 4. A. cirris binis utrinque, anterius flabellis duobus aureis rigidis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 87. *t.* 26. *f.* 1-6. *prodr.* 2622. *rar.* 1. *p.* 54. *O. Fabr. Fn. groenl.* 272.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1268. *n.* 809. Sabella (granulata) teſta ſolitaria libera ſimplici curvata granis arenaceis fuſcis.

*Pall. miſcell. zool. p.* 117. *t.* 9. *f.* 1-13. Nereis cylindraria.

*Martin. Conchyl. p.* 18. & *p.* 69-72. *t.* 4. *f.* 26. 27. Tubulus vermicularis.

*Klein tubul. mar. p.* 21. *t.* 1. *f.* 5. & *echinod. p.* 62. *t.* 33. *f.* A. B. Solen fragilis.

*Brit. zool.* 4. *p.* 130. *t.* 92. *f.* 163. Sabella tubiformis.

*Dicquemar. journ. de phyſiq.* 1779. *Jul. p.* 54. *t.* 2. *f.* 1-12. Ver a fourreau conique.

*Martin. Conchyl.* 1. *t.* 4. *f.* 26.

*Habitat in* mari ſeptentriona'i, glaciali atlantico, indico, *tubulo fuſco, diaphano, fragili: altero fine cuneato angulo, intus laevigato, capite ramoſo albo: anterius uncis* 16 *albis armato, truncato inverſe conico, chalybeo, laeviſſimo, ad marginem utrinque faſciculis ſetarum ternarum quaternarumve aurearum* 14, *cauda ex lamellis tribus ovalibus minutis duris confiata.*

criſtata. 5. A. corniculis ramoſis binis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 70. *f.* 1-4. *prodr.* 2620. *rar.* 2. *p.* 87.

*Habitat in* oſtreis vetuſtis ſinuum maris Norwegici, *elongata, teres, flexuoſa, ex rubro flava, poſterius acuminata, ſegmentis* 17, *anterioribus utrin-*

*utrinque verruca ſetaque inſtructis, capitis cirris pluribus, corpore ſextuplo brevioribus, tubulo fragili flexuoſo, e limo teſtarumque rejectamentis compoſito.*

chryſo- cephala. 6. A. capitis diſcreti vertice paleolis aureis concertis bifariam coronato.

*Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 235. t. 5. f. 20.* * Nereis chryſocephala.

*Habitat in* indici maris *fundo, ſabellae alveolatae affinis, mollis attenuata, ſupra planiuſcula, 4 circiter pollices longa, pedunculis criſtam aemulantibus, penicilligeris, cirrigeris, mucrone carneo & 2-4 tum retrorſum brachiolo terminatis, tentaculis numeroſis.*

plumoſa. 7. A. tentaculis binis articulatis ſub faſciculis ſetarum porrectarum, corpore tereti caput verſus incraſſato clavato hiſpidulo. *Mull. zool. dan. 3. p. 16. t. 90. f. 1. 2. prodr. n. 2621.*

*Habitat in* maris Norwegici *argilla inter mytilos edules.*

291. TEREBELLA. *Corpus* oblongum repens nudum, branchiis ad latera inſtructum, ſæpius in tubulo.

*Os* anterius labiatum edentulum, proboſcidem clavatam exſerens.

*Tentacula* circum os capillaria plura, ciliata.

cirrata. 1. T. corpore tereti, penicillis corporis lateralibus triplicibus.

*Syſt. nat. XII. 2. p. 1085. n. 3.* Nereis (cirroſa) tentaculis oris longiſſimis, capite utrinque cirris X. *Mul-*

*Muller von Wurmern. p.* 188. *t.* 15. *f.* 1. 2. *prodr. zool. dan.* 2617. Amphitrite cirrata.

*Dicquemare Journ. de phyſ.* 1777. *Mars. p.* 215. *t.* 1. *f.* 10. 11. Ver-meduſa.

*Habitat in* maris Islandiam alluentis *fundo arenoſo, a* Koenigio *detecta*, & Spio *cirrata nuncupata, rubra*, 3-4 *pollices longa, ſenſim retrorſum attenuata, annulis conflata* 60-70 *retrorſum decreſcentibus, labio ſuperiori cirris protenſis, dorſi ſuperioris lateribus breviorum ſerie ornatis, tubulo craſſo, fragili, incolae longitudine, laeſa rubrum ſuccum fundens, quo aquam tingit & opacat.*

lapidaria. 2. T. cirris ad anteriora corporis octo, circa os quatuor.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1092. *n.* 1. Terebella.

*Kaehl. act. Stockh.* 1754. *p.* 144. *t.* 3. *f.* A-E.

*Habitat in* mari mediterraneo, *intra rupium foramina, quae jam excavata deprehendit.*

conchilega. 3. T. albida, cirris oris numeroſis filiformibus: ſuperioribus longiſſimis, branchiis ruberrimis.

*Pall. miſc. zool. p.* 131. *t.* 8. *f.* 17-22. Nereis conchilega.

*Habitat in* mari Belgium *alluente copioſa, ad quinque pollices longa, lumbrici aemula, taenia ſubtus rubra, capite ſubtus ſquamis* 4 *munito, tubulos e teſtaceorum fragmentis calami anſerini craſſitie & ad* ½ *pedem longos ſtruens.*

complanata. 4. T. depreſſa, cirris oris quatuor, corporis verrucis lateralibus penicilligeris duplici utrinque ſerie digeſtis.

*Pall. miſc. zool. p.* 109. *t.* 8. *f.* 19-26. Aphrodita complanata.

*Brown jam. p.* 395. *t.* 39. *f.* 1. Nereis tentaculis capitis binis tripartitis, corporis pluribus pe-

nicilliformibus duplici ferie ad latera positis.
*Habitat in* mari insulis canbæis *circumfuso*, *corporis segmentis* 130 *minutis*, *dorsi cristula carnosa*, *obtusa*, *longitudinaliter adnata*.

carunculata. 5. T. depresso-quadrangula, penicillorum corporis serie quadruplici ventralium cirris nullis.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 10. Nereis (gigantea) tentaculorum fasciculis triplici ordine.
*Pall. misc. zool. p.* 102. *t.* 8. *f.* 12. 13. Aphrodita carunculata.
*Seba mus.* 2. *p.* 31. *t.* 81. *f.* 7. Millepeda marina amboinensis.
*Habitat in* mari americano & indico, *tenera*, 9-14 *pollices longa*, *penicillis lateralibus flavescentibus papillae transversae insidentibus*, *ventralium cirris nullis*, *pone cirros dorsi caruncula ovali depressa*, *branchiis ramosissimis*, *segmentis corporis ultra* 90.

rostrata. 6. T. tetraëdra, penicillorum corporis serie quadruplici, palato quasi elongato.
*Pall. misc. zool. p.* 106. *t.* 8. *f.* 14-18. Aphrodita rostrata.
*Habitat in* mari indico, *carunculatae affinis*, *at cute rudiori*, *penicillis magis prominentibus*, *omnibus cirro instructis*, *branchiis insignibus distincta*, 8 *pollices ad pedem longa*, *penicillorum setis rigidis*, *ventralium ex fusco aureolis*, *dorsalium ex ferrugineo fuscescentibus*.

flava. 7. T. depressa, branchiis utrinque 37, cauda bifurca.
*Pall. misc. zool. p.* 97. *t.* 8. *f.* 7. 11. Aphrodita flava.
*Habitat in* mari indico, $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *segmentis corporis* 33-40, *penicillorum cirratorum pilis tenuissimis flavicantibus*, *dorsi cristula ex*

*ex triquetro compressa, cirris duobus anterius ornata.*

rubra. 8. T. rubra, depressa, cauda cirris duobus terminata, capite maxillis duabus corneis mobilibus.

*Bommé act. Vlissing.* 6. *p.* 379. *f.* 4. A. B. Roodglinsterende Nereide of Zee-duezend-been.

*Habitat in* mari, Seelandiæ *insulis circumfuso, branchiis oculorumque defectu ad hoc genus accedens, 3 circiter pollices longa, stria dorsali nigra, capite albo cylindrico, quassata saniem mucosam albidam fundens, nitens, corporis segmentis* 144.

aphroditois. 9. T. teres retrorsum lente attenuata, subtus depressiuscula sulco obsoleto exarata: branchiis in segmentis octo prioribus nullis, in sequentibus tribus simplicibus, in postremis sensim majoribus uno versu pinnatis.

*Pall. nov. act. Petrop.* 2. *p.* 229. *t.* 5. *f.* 1-7. Nereis aphroditois.

*Habitat in* Oceano indico, *sesquipedalis segmentis* 148 *& ultra, pedunculis carnosis cirro instructis, papilla penicilligera, capite bicirrato.*

bicornis. 10. T. proboscidis disco simplici terminali bicorni. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 4. *Seb. mus.* 3. *t.* 16. *f.* 17.

*Habitat in* Oceano americano.

stellata. 11. T. proboscidis disco triplici perfoliato, anteriore armato cornu truncato aculeis radiato. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 5.

*Habitat in* Oceano americano.



*An hujus generis vermis a* M. Slabbero, *act. Vlissingens.* 1. *p.* 387. sqq. *descriptus, & t.* 2. *delineatus indicus?*

286. NEREIS. *Corpus* repens longum.
*Pedunculi* laterales penicillati.
*Tentacula* simplicia, rarius 0.
*Oculi* quatuor aut duo, rarius 0.

* *ore unguiculato* s. forcipato.

versicolor. 2. N. subdepressa, pedunculis acuminatis setiferis. *Mull. von Wurm. p.* 104. *t.* 6. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2624.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1064. *n.* 11. *It. wgoth.* 191. *Stroem. sondm.* 1. *p.* 160. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 534. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 13. Scolopendra (marina) pedibus utrinque, corpore pallido, linea dorsali rubra.
*Habitat in* mari septentrionali, *male pro cauda mali haleces infestantis habita, corporis articulis* 85, *posterioribus sensim minoribus, ochroleuca, stria media obscure rubra, cauda segmentisque corporis anterioribus sordide viridibus, medium versus iridis coloribus ludentibus, tentaculis superioribus brevibus subulatis* 3, *inferioribus pellucidis conicis* 2, *lateralibus corneis* 4, *sanguine rubro.*

noctiluca. 1. N. corpore vix conspicuo. *Fn. suec.* 2098. *Mull. zool. dan. prodr.* 2623. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 291. *n.* 273.
*Amoen. acad.* 3. *p.* 203. *t.* 3. Noctiluca marina. *Grisl. venet. quart.* Scolopendra marina lucida. *Vianell. monogr.* Luciolella aquæ marinæ.
*Habitat in omni facile* mari, *minutissima, agilissima, fulgore e caeruleo viridi micans, & aquas perfundens.*

fimbriata. 3. N. subdepressa, pedunculis cirratis lentigeris. *Muller von Wurm. p.* 144. *t.* 8. 1-3. *prodr. zool. dan.* 2627. Ha-

*Habitat in* mari Balthico, *linearis*, 3 *pollices longa*, *fulva*, *dorso medio ventrisque linea longitudinali media caeruleis*, *tentaculis capitis* 8, *cauda* 2 *filis terminata.*

armillaris. 5. N. subdepressa, pedunculis conicis: cirris lenticularibus. *Mull. von Wurm. p.* 150. *t.* 9. *f.* 1-5. *zool. dan prodr.* 2626. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 234. *n.* 276.

*Habitat in* mari septentrionali, *in fabulo littorum profunde se condens*, *agilissima*, *filiformis*, 15 *lineas longa*, *tentaculis ad utrumque capitis latus* 3 *moniliformibus*, *corporis articulis* 120, *singulis utrinque pedunculo munitis*, *cauda filis* 2 *longis terminata.*

mollis. 5. N. fasciculis pilorum lateralibus supra pedunculos. *Fn. suec.* 2097.

*Habitat in* mari norwegico; *an hujus generis & tribus?*

delagica. 6. N. supra convexa, pedunculis cirratis verrucosis. *Muller von Wurm. p.* 140. *t.* 7. *f.* 1-3. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 6. *Fn. suec.* 2096. Nereis segmentis XL., subtus sulcata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 292. *n.* 275. *Mull. prodr. zool. dan.* 2628. Nereis verrucosa. *Act. Havn.* 10. *p.* 169. *t.* e. *f.* 10. Nereis ferruginea. *Buster op. subs.* 2. *p.* 133. *t.* 6. *f.* 6.

*Habitat in* Oceani europaei *fundo*, *inter radices ulvarum*, *sub lapidibus & intra testas vacuas*, *motu flexuoso ingrediens*, *& urceolis frontis fundum perfodiens*. *spadicea*, *tentaculis*, *cirris frontalibus*, *caudalibusque lateralibusque & pectunculis albidis*, *maxillis ex fusco nigricantibus*, *linea dorsi coccinea*; *ad* 7 *pollices longa*, *macula capitis inter oculos trigona alba*, 2 *aliis ad late-*

*tera, ſetis ferrugineis, cauda binis cirris terminata.*

tubicola. 10. N. ſubdepreſſa, pedunculis ſubcirratis globoſis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 60. *t.* 18. *f.* 1-6. *rar.* 1. *p.* 38. *prodr.* 2625.
*Habitat in* mari ſeptentrionali, *linearis, tentaculis capitis* 5 *rectis, tubulum tenacem ex proprio ſucco indurato ſtruens.*

norwegica. 11. N. convexa, pedunculis cirratis pennigeris. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 11. Nereis glabra, ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato dupliciter forcipato.
*Mull. zool. dan.* 1. *p.* 99. *t.* 29. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 60. *prodr.* 2630. Nereis pennata.
*Gunner act. Nidroſ.* 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 7-12. Nereis madreporæ pertuſæ glabris ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato & dupliciter forcipato.
*Muſ. Kirch. cl.* 13. *p.* 412. *f.* 8-10.
*Habitat in* maris norwegici *ſinubus, calami anſerini craſſitie, flavicans, linea dorſi obſcure rubra, capitis tentaculis* 5, *aequalibus, collo ſuperne utrinque cornuto, corporis articulis* 126, *cauda filis* 2 *ſubtilibus terminata, tentaculis triplo longioribus.*

pinnata. 12. N. convexa, pedibus cirratis pinnigeris. *Muul. zool dan.* 1. *p.* 102. *t.* 29. *f.* 4-7. *rar.* 1. *p.* 62. *prodr.* 2629.
*Habitat in* ſinuum maris norwegici *limo caerulescente, ſpadicea, nitoris chalybei, tentaculis capitis,* 5 *articulatis, ſegmentis corporis* 106-122, *cauda filis* 2 *craſſis breviſſimis terminata, norwegicae proxime affinis.*

corniculata. 13. N. ſubdepreſſa pinnata, pedunculis cirro ſe-

ta-

taque longa ſimplici. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 33.

*Habitat in* mari Norwegico, *minima, ſplendida, agilis, albida, utrinque inciſa, capitis tentaculis* 6, *oculis glomeratis ruberrimis, corporis ſegmentis* 28, *cauda cirris* 2 *longioribus terminata.*

pusilla. 14. N. depreſſa, pedunculis cirratis: filamentis articulatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2631.

*Habitat in* mari norwegico.

inciſa. 15. N. convexa, ſegmentis diſtantibus, pedunculis ſimplicibus cirratis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 295. *n.* 277.

*Habitat rara in* mari Groenlandiam *alluente prope a littore inter radices ulvarum maximarum,* 2½ *pollices longa, elongata, ſubtus ex albido rubicunda, ſulco medio longitudinali exarata, ſupra pallida, ferruginea, medio ſubgriſea, capitis tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *maxillis flavis, corporis ſegmentis* 80.

aphroditoides. 16. N. depreſſa, non ſulcata, pedunculis cirratis papilligeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 296. *n.* 278.

*Habitat haud frequens in* maris Groenlandiam *alluentis fundo limoſo, admodum vivida, vix pollice longior, capite albo: maxillis oculisque nigris, tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *pellucida anterius ochroleuca, ceterum rubicunda, lineis abdominis* 2 *ferrugineis, rarius viridans, lineis abdominalibus, dorſi & tranſverſalibus rubris.*

** *ore proboſcideo.*

cærulea. 7. N. glabra cæruleſcens. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 198. *n.* 280.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 7. *Amoen. acad.* 4.

*p.*

*p.* 254. *n.* 38. *Fn. fuec.* 2095. Nereis glabra cæruleſcens ſegmentis CLXXXIV.

*Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. Nereis tentaculorum 184 paribus.

*Habitat in* Oceano *ſplendida.*

viridis. 8. N. depreſſa, lamellis pedunculorum lanceolatis. *Mull. von Wurm. p.*162. *t.* 11. *f.*1-6. *zool. dan. prodr.* 2636. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 297. *n.* 279.

*Habitat in* mari Islandiam & Groenlandiam *alluente, in foraminibus lavae a monte* Hecla *ejectae*, 3 *pollices longa, graminea (junior rubicunda, linea dorſi longitudinali viridi, capite, tentaculis cirris lamellisque niveis) filiformis, capitis tentaculis utrinque* 3, *oculis* 2 *nigris, proboſcide clavata, quam laeſa protrudit, corporis ſegmentis* 130 *aequalibus, caudae cirris* 2 *brevibus.*

maculata. 9. N. convexa, lamellis pedunculorum ſubcordatis. *Mull. von Wurm. p.* 156 *t.* 10. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2635. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 298. *n.* 281.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 9. Nereis viridis, dorſo nigro-punctato, articulis CC.

*Habitat ad* Islandiæ & Groenlandiæ *littora*, 2½-4 *pollices longa, ſupra vireſcens: linea utrinque longitudinali obſcuriore, ſubtus caudaeque cirris brevibus pallidior unicolor, collo & parvo capite cum frontis cirris brevibus utrinque* 2, *& tentaculis* 4 *albis, pedunculorum ſetis & lamellis ex flavo viridibus, oculis tantum* 2, *proboſcide clavata longa, alba, rubro ſtriata.*

craſſa. 17. N. depreſſa, proboſcide cylindrica, pedunculis ſanguineis: ſetis ramoſis. *Muller von Wurm. p.* 166. *t.* 12. *f.* 1-3.

*Ha-*

*Habitat in* Oceani fuco natante, 4 *pollices longa, aequalis, capitis parvi tentaculis* 4 *cirris* 2 *frontalibus rubris brevioribus, oculis* 2 *nigris, proboscide truncata emissili, caudae setis* 2 *rigidis inaequalibus.*

stellifera. 18. N. depressa, pedunculorum lamellis ellipticis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 1-3. *prodr.* 2632. *rar.* 2. *p.* 62.

*Habitat in* maris Norwegici *sinubus, proboscide squamisque dorsi oblongis, nereides aphroditis jungens, at flexilis, filiformis, alba, subtus linea media longitudinali rubra, capitis tentaculis sex, oculis* 2, *pedunculis conicis, retrorsum curvatis: apicis alteriusque lateris setis in ventilabrum dispositis.*

punctata. 19. N. subdepressa, pedunculis longissime cirratis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 4. 5. *prodr.* 2633. *rar.* 2. *p.* 63.

O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 301. *n.* 284? Nereis rosea.

*Habitat in* Norwegiæ & Groenlandiæ *sinubus, in testis ostrearum aut fabulo sub lapidibus latens, flavescens: striis transversis fuscis, lineaque dorsi longitudinali rubra, capitis cirris, oculisque* 4, *pedunculorum cono punctis* 4 *nigris notato, corporis segmentis* 40 & *ultra, caudae cirris* 2.

alba. 20. N. convexa, fronte cornuta, pedunculis bifidis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 6. 7. *prodr.* 2634. *rar.* 2. *p.* 64.

*Habitat in* Norwegiæ *sinuum fundo argilloso, alba, annulata, retrorsum attenuata, oculis nullis, proboscide membranacea, pellucidissima, in duplam corporis latitudinem inflanda, pedunculis utrinque* 77, *verrucosis.*

fla-

flava. 21. N. depreſſa, pedunculorum lamellis oblongo-ovatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 299. *n.* 282.

*Habitat in* mari ſeptentrionali *procul a littore* Groenlandiæ *inter radices ulvarum, 27 lineas longa, viridi affinis, tota flava, ſolis pedunculorum ſetis, 2 oculis caudaeque cirris nigris, roſtri cirris 2 breviſſimis, tentaculis 2 baſi unitis, corporis ſegmentis* 140.

longa. 22. N. ſubdepreſſa, papillis mammillaribus pro lamellis pedunculorum. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 300. *n.* 283.

*Habitat ad littora ſinuum* Groenlandiæ *in fundo argillaceo vel arenoſo, praeſertim ad fluviorum oſtia, ad 9 pollices longa, nunc alba, ſetis modo caudaeque cirris nigricantibus, nunc ſupra rubicunda vel ex griſeo viridis, nunc ſupra virеſcens: lateribus obſcurioribus, ſubtus ex aeneo albida, corporis ſegmentis* 190, 200, 240, *pedunculis bifidis.*

priſmatica. 23. N. triquetra, pedunculis diſtantibus: papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata. *Mull. prodr. zool. dan.* 2637. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *n.* 285.

*Habitat in maſſa flava ſpongioſa foetida, quae lapides majores ad littus* Groenlandiæ *ſubtus veſtit, rarius in arena, 6 lineis vix longior ochroleuca, lineis dorſi 3 griſeis, capitis colliique cirris* 11, *plurimis, caudaeque 2 albis, oculis 4, corporis ſegmentis* 25.

bifrons. 24. N. depreſſa, pedunculis papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata, mediis ſimul ramigeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 303. *n.* 286. *Mull. prodr. zool. dan.* 2638.

*Habitat cum* priſmatica, *continuo ſe movens, pallicem longa, ex fulvo brunnea, priſmaticae affi-*

*nis,*

*nis, capite albo, oculis 4, cirris 7, corporis utrinque attenuati segmentis 56.*

cæca. 25. N. subconvexa, tentaculis duobus breviſſimis, lamellis pedunculorum duplicatis ciliatis.
*O. Fabr. Fn. groenl. p. 304. n. 287.*
*Habitat in* Groenlandiæ *littoribus arenoſis ſub lapidibus more lumbrici papillaſi cuniculos profundos agens, 8 pollices longa, candide lineatis, tentaculis obtuſe conicis, proboſcide ampla, ſphaerica, corporis ſegmentis 86-100, oculis nullis; an eadem cum naide caeca.*

ebranchiata. 26. N. teres annuloſa utrinque attenuata: pedunculis cylindricis brevibus utrinque bifariam pinnata, tentaculis nullis.
*Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 231. t. 5. f. 8-10.*
*Habitat (caeruleſcens) in* mari germanico, *(ex griſeo fuſca) in* indico, *pannis ſegmentis corporis 269, ultimo crenato.*

lamelligera. 27. N. teres utrinque attenuata: proboſcide mucronibus quatuor carneis ſtellata, pedunculis compreſſis folio ſupra ſemilunato ſubtus majore ſemicordato auctis.
*Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 233. t. 5. f. 11-17.*
*Habitat in* mari indico, mediterraneo & ſeptentrionali, *inter plantas & quiſquilias marinas, bipedalis, ſegmentis 200-550, capitis tentaculis 4, oculis 2 nigris.*

ciliata. 28. N. depreſſa, ore cylindrico retractili, margine anteriori ciliato, tentaculis nullis.
*Mull. zool. dan. 3. p. 14. t. 89. f. 1-4.*

**** ore tubulato.*

proliſera. 29. N. depreſſa, pedunculis cirratis, tentaculo fron-

frontis solitario. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 5-9. *rar.* 2. *p.* 34.

*Habitat rara in* Norwegiæ *sinubus*, *generationis modo naidibus similis*, *rufa*, *capitis tentaculis* 3, *oculis* 4 *nigris*, *forcipe & proboscide nulla*, *sed loco ejus tubulo pellucido crassо flexuoso*, *corporis segmentis* 32-46, *caudae cirris* 2.

NAIS. *Corpus* repens, longum, lineare, pellucidum, depressum.
*Pedunculi* setis simplicibus.
*Tentacula* nulla.
*Oculi* duo aut nulli.

vermicularis. 1. N. setis lateralibus nullis, mento barbato. *Mull. von Wurm. t.* 4. *f.* 1. 2. *hist. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 151. *zool. dan. prodr.* 2647.
*Roes. inf.* 3. *p.* 578. *t.* 93. *f.* 1-7.
*Habitat in* aquis stagnantibus, *lemnae adhaerens*, 2 *lineas longa*, *capite subclavato*, *oculis nullis*, *verrucis pedunculorum setis* 5-6.

serpentina. 2. N. setis lateralibus nullis, collari triplici nigro. *Muller von Wurm. p.* 84. *t.* 4. *f.* 3. 4. *hist. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 152. *zool. dan. prodr.* 2648.
*Roes. inf.* 3. *p.* 567. *t.* 92.
*Habitat in* Europæ *aquis* stagnantibus *ad radices lemnae*, *vermiculari minus depressa & longior*, 9 *quippe lineas longa*, *pedunculis verrucosis*: 3 *uncinatis*.

proboscidea. 3. N. setis lateralibus solitariis, proboscide longa.

---

Naides *partitione transversa naturali & artificiali mirifice multiplicandae*, *plurimae in aquis dulcibus degunt*; Nereides, Terebellae, Amphitritae, Spiones, Aphroditae *omnes in aqua salsa*.

ga. *Mull. von Wurm. p.* 14. *t.* 1. *f.* 1-4. *verm. hist.* I. 2. *p.* 21. *n.* 153. *zool. dan. prodr.* 2649. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1085. *n.* 2. Nereis (lacustris) linearis, lingua exserta.
*Roes. inf.* 3. *p.* 483. *t.* 78. *f.* 16. 17. & *t.* 79. *f.* 1.
*Trembley hyst. polyp. t.* 6.
*Ledrm. microsc. t.* 82. *f.* f. & h.
*Schaeff. Armpolyp.* 1754. *t.* 3.
*Habitat in* Europæ aquis *paludosis*, *rivis*, piscinis &c. 2¼ *lineas longa*, *hyalina*, *intestino flexuoso nigricante*, *segmentis singulis utrinque seta simplicissima munitis*, *capite forficato*, *oculis* 2 *nigris*, *ore linguaque instructo*, *ano terminali*, *partibus & incolis aquae invisibilibus victitans.*

elinguis. 4. N. setis lateralibus solitariis, proboscide nulla. *Mull. von Wurm. p.* 74. *t.* 2. *f.* 1-4. *hist. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 154. *zool. dan. prodr.* 2650.
*Habitat rarior in* aqua rivulari, *proboscideae affinis*, *at angustior*, 4-5 *lineas longa*, *ore anterius obtuso*, *forficis & proboscidis experte*, *ano laterali.*

digitata. 5. N. setis lateralibus solitariis, cauda laciniata. *Muller von. Wurm. p.* 90. *t.* 5. *f.* 1-4. *hist. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 155. *zool. dan. prodr.* 2651.
*Habitat in* rivorum sedimento arenoso, *capite in limo condito*, *oculis nullis* 5 *lineas longa*, *subtus duplici verrucarum fusillarum ciliatarum instructa*, *cauda in* 6 *lacinias inaequales sursum porrectas divisa*, *vena rubra.*

barbata. 6. N. setis lateralibus fasciculatis, proboscide nulla. *Muller von Wurm. p.* 80. *t.* 3. *f.* 1-3. *hist. verm.* I. 2. *p.* 23. *n.* 156. *zool. dan. prodr.* 2652. *Bonnet tr. d'insectol. obs.* 21.
*Habitat in* fossis silvarum aquosis, *helicibus planorbibus saepe adhaerens*, *digitatae similis*, *at sub-*

*ſubtus pilis, & ad ſingula ſegmenta corporis utrinque ſetis 4 divergentibus munita, oculisque 2 nigris gaudens, 4 lineas longa.*

cæca. 7. N. verrucis lateralibus ſetoſis, oculis nullis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2653.
*Habitat in* ſinubus Islandiæ, & Chriſtianienſi Norwegiæ, *an propria ſpecies hujus generis?*

littoralis. 8. N. ſetis lateralibus nullis ſolitariis geminatis faſciculatis varia *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 80. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 120.
*Habitat in* Havniæ *littore ſabuloſo, marina aqua tecto, fragiliſſima, elongata, filiformis, aequalis, rubra, raro ex albo griſea, ſegmentis pluribus* 16, 30, 37 *ſeta marginali diſtinguendis, ex annulis confertis compoſita.*

marina. 9. N. ſetis lateralibus ſolitariis tubulo exſerendo. *O. Fabr. Fn groenl. p.* 315. *n.* 295.
*Habitat in* Groenlandiæ littoribus *ſub confervis marinis, vix* 10 *lineis longior, ſupra convexa, ſubtus plana, poſtirius acuminata, albicans, linea media longitudinali ex flavo griſea, oculis* 2 ? *an vere diſtincta a nereide prolifera?*

quadricuſpidata. 10. N. verrucis lateralibus bifidis ſetoſis, cirris abdominalibus & cauda quadrifida. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 3015. *n.* 296.
*Habitat ſatis frequens in* Islandiæ *ſabulo maritimo ſub lapidibus, gordiis minutis victitans,* $2\frac{1}{3}$ *pollices longa, utrinque attenuata, ſubtus magis plana, oculis tentaculisque carens, nunc pallide rubra, nunc ex rubicundo griſea, linea longitudinali, ſubtus praeſertim pulchre purpurea, corporis ſegmentis* 104 *annularibus, caudae brevis cylindricae, cirris* 4.

287. ASCIDIA. *Corpus* fixum, teretiuſculum, vaginans.

*Aperturæ* binæ utplurimum ad ſummitatem : altera humiliore.

papillosa. 1. A. ſcabra, tuberculis coccineis.
*Bohadſch mar.* 130. *t.* 10. *f.* 1. Tethyum coriaceum.
*Habitat in* mari adriatico.

gelatinosa. 2. A. lævis coccinea ſubdiaphana.
*Bohadſch mar.* 131. *t.* 10 *f.* 3. Tethyum gelatinoſum.
*Gunn. act. Nidroſ.* 3. *p.* 101. Tethyum elegans.
*Habitat in* mari mediterraneo ; *nonne eadem cum venoſa ?*

intestinalis. 3. A. elongata lævis alba, facculo in collum producto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2733.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1087. *n.* 3. Aſcidia lævis alba membranacea.
*Gunn. act Nidroſ.* 3. *p.* 81. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tethyum ſociabile, Soepungen.
*Bohadſch mar.* 132. *t.* 10. *f.* 4.
*Buſter opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 84. *t.* 10. *f.* 5.
*Habitat in* Oceano europæo.

quadridentata. 4. A lævis alba, aperturis quadridentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2721. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 317.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *ſubglobosa, roſtris* 2 *prominentibus, balanis adhaerens,* 4 *lineas longa.* Koenig.

ruſtica. 5. A. ſcabra ferruginea aperturis incarnatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 49. *n.* 18. *t.* 15. *f.* 1-5. *prodr.* 2720. *rur.* 1. *p.* 30. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 316.

*Oiaſſ.*

*Olaff. ref. isl.* 900. C. b. Tethya corpore ovato rubro, auriculis duabus.

*Rondel. piſc.* 2. *c.* 19. *poiſſ. p.* 87. *Aldrov. zooph. p.* 583. *Geſn. Fiſch. anh. p.* 82. Tethya.

*Jonſt. exang. t.* 19. *f.* 8. Tethyorum ſpecies.

*Habitat in* mari ſeptentrionali & mediterraneo, *edulis, teſtaceis, lapidibus, fucis adhaerens, ſubdiaphana, dolioli facie, 2 pollices circiter longa, cute exteriori craſſa coriacea, intus laevi albida, ſaculo molli laevi carnoſo, roſeo, infra flaveſcente, aqua a cute exteriori diſcreto.* Koenig.

echinata. 6. A. hemiſphærica hiſpida, oculis hiantibus coccineis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2722. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 318.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1087. *n.* 6. Aſcidia verrucoſa hiſpida.

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *fuco ſcoparia aliisque adhaerens, albida, verrucis adſperſa, ſingulis apice armatis, cacti inſtar, aculeis divergentibus ſubcitiatis, ſupremis 2 majoribus incarnatis in aperturas terminatis.* Koenig.

Mentula. 7. A. compreſſa piloſa, ſaculo rubro, aperturarum altera laterali. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 8. *f.* 1-4. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 319.

*Rondel. piſc. c.* 2. *p.* 129. *poiſſ.* 2. *p.* 81. Pudendum alterum.

*Aldrov. zooph. p.* 589. Mentula marina altera.

*Geſn. Fiſchb. p.* 154. *f.* 1. *Anh.* 4. *p.* 84. Mentula marina, pudendi marini altera ſpecies.

*Jonſt. exſang. t.* 20. *f.* 2. Mentula marina.

*Planc. conch. p.* 109. *t.* 7. *Comment. Bonon. p.* 243. *t.* 2. *f.* 4-7. Mentula marina informis.

*Hill. anim.* 1. *t.* 5. Salecia.

*Dicquemar. Journ. de phyſ.* 1777. *Mai. p.* 356. *t.* 2. *f.* 1. 2. 3. Reclus marin.

*Ha-*

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *rudis quaſi & indigeſta, ochroleuca, pellucida, gelatinoſa*, 5-6 *pollices longa, confervarum fibrillis veſtita.*

venoſa. 8. A. elongata ſubcompreſſa toroſa rubra, ſaccu-lo concolore. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 85. *t.* 25. *f.* 1-3. *prodr.* 2736. *rar.* 1. *p.* 52.
*Habitat in* mari Norwegico, *fucis in fundo ſinuum naſcentibus adhaerens, firma, aperturis ſanguineis.*

Prunum. 9. A. ovata lævis hyalina, ſacculo albo, aperturarum altera laterali. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 127. *n.* 61. *t.* 34. *f.* 1-3. *prodr.* 2730. *rar.* 1. *p.* 83.
*Habitat in* maris Norwegici ſinu Chriſtianenſi & glacialis Karikenſi, *pruni figura & magnitudine, cute lactea ſubtiliſſime rugoſa, aperturarum radiis fuſcis.*

conchilega. 10. A. fruſtulis teſtarum veſtita, ſacculo albo in caeruleum tranſeunte. *Mull zool. dan.* 1. *p.* 128. *n.* 62. *p.* 34. *f.* 4-6. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 84. *Muſ. Ad. Fr. p.* 96. Microcoſmus gelatinoſus pellucidus.
*Habitat in* Norwegiæ ſinu Droebacenſi, *gelatinoſa, ſubdiaphana, cylindrica vel ovalis.*

parallelogramma. 11. A. candida convexa hyalina, ſacculo reticulato luteſcente, aperturarum altera laterali. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 1-3. *prodr.* 2737. *rar.* 2. *p.* 25.
*Habitat haud frequens in fucis* ſinus Norwegiæ Laurwigenſis, *oblonga, ſubquadrata; angulis obtuſis, lineis interdum coccineis pictis.*

virginea. 12. A. elongato-compreſſa cryſtallina lævis; ſtriis tranſverſis coccineis, ſacculo rubente. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 4. *prodr.* 2732. *rar.* 2. *p.* 27.

*Habitat sub initium Julii ad rupes orientales arcis* Norwegicæ Stavern, *glaciem referens, parallelogramma durior; apertura utraque punctis raris coccineis cincta.*

canina. 13. A. elongata teres flaccida: sacculo rubro. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 55. *f.* 1-6. *prodr.* 2734. *rar.* 2. *p.* 43.

*Red. opusc.* 3. *t.* 21. *f.* 6. & *anim. viv. negl. anim. p.* 101. *t.* 15. *f.* 6. Mentula marina.

*Planc. conch. p.* 45. *t.* 5. *f.* 5. Tethyum s. mentula marina penem caninum referens.

*Bohadsch anim. mar. p.* 132. *t.* 10. *f.* 4. 5. Tethyum fasciculatum.

*Dicquemar. journ. de phys.* 1777. *Fabr. p.* 137. *t.* 1. *f.* 1-7. Sac-animal.

*Habitat in* mari Norwegico & atlantico, *cute ampla, glabra, alba, subpellucida, aperturarum anteriorum ambitu ruberrima.*

patula. 14. A. teretiuscula lutescens scabra, sacculo rufo, orificiis coccineis patulis: altero laterali. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 1. *prodr.* 2725. *rar.* 2. *p.* 71.

*Habitat in fucis rupium* Suenerne oceani norwegici, *pellucida, sacculo lagenae formam mentiente.*

aspersa. 15. A. subcompressa scabriuscula alba, sacculo maculis rubris. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 2. *prodr.* 2728. *rar.* 2. *p.* 72.

*Dicquemar. journ. de phys. Oct.* 1780. *p.* 304. *t.* 2. *f.* 1-3?

*Habitat in* mari Norwegico, *fucis racematim adhae-*

---

Ascidiae, *in [illegible] [illegible], [illegible] alternatim & [illegible], exspuunt tamquam [illegible], [illegible], lapidibus, fucis, testaceis [illegible], [illegible] interdum [illegible], [illegible] frequens esca, nonnullae etiam hominibus esculentae, paucae olim officinales.*

*haerens, cordiformis, cute pellucida intus laevi, ſacculo flavicante.*

ſcabra. 16. A. compreſſa albida ſcabriuſcula, ſacculo rubro, orificiis concoloribus. *Mull. zool. dan. 2. t. 65. f. 3. prodr. 2726. rar. 2. p. 73.*
*Habitat in* Norwegiæ *ſinu* Chriſtianienſi, *fucis latere adhaerens, prima facie patulam referens, ab oculo glabra; digito tantum aſpera, aperturis potius coarctatis, collo utroque conico, ſacculo non maculato, cute exteriori pellucidiſſima, gelatinoſa, duriuſcula.*

orbicularis. 17. A. depreſſa albida, ſacculo punctis elevatis inæqualibus. *Mull. zool. dan. 2. t. 79. f. 1. 2. rar. 2. p. 117.*
*Habitat ſolitaria Auguſto in* ſinu Norwegiæ Chriſtianienſi, *fuco rufo affixa, gelatinoſa, orbicularis, pollicis diametro, pellucida, diſco opaco, aperturis collateralibus 6-7 dentatis: punctis in apice dentium coccineo, ſacculo albido.*

corrugata. 18. A. elongata glabra, ſacculo cinereo: faſciis albis. *Mull. zool. dan. 2. t. 79. f. 3. 4. prodr. 2735. rar. 2. p. 118.*
*Habitat in* Norwegiæ ſinubus, *baſi fibrilloſa fucis adhaerens, teres, flaccida, plicata, rugoſa, cute exteriori hyalina, orificiis luteis.*

lepadiformis. 19. A. clavata hyalina, inteſtino flavo. *Mull. zool. dan. 2. t. 79. f. 5. prodr. 2738. rar. 2. p. 119.*
*Habitat in* Norwegiæ ſinubus, *fucis & cancris brachyuris adhaerens, facile flaccefcens, clava compreſſa ſubquadrangula.*

complanata. 20. A. depreſſa inaequalis albida, interaneis nigris, orificiis fulvo punctatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 320.*

*Habitat frequens in littore arenoſo* Groenlandiæ, *baſi ſua lapidibus arcte adhaerens, ſubcarnoſa, oblonga, pellucida, 9 lineas longa.*

Tuberculum. 21. A. oblonga compreſſo-gibba flavicans, punctis eminentibus concoloribus, orificiis verticalibus rubris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 321.*

*Habitat in fundo* maris Groenlandiam *alluentis, ulvarum radicibus arcte aahaerens, 3 lineis vix longior.*

villoſa. 22. A. obovata radicata albida lanugine conferta veſtita, aperturis terminalibus concoloribus. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 333. n. 322.*

*Habitat in fundo* maris Groenlandiam *alluentis, radice inter radices ulvarum fixa, 4 lineas longa, erecta, teres, cute ſubſtupoſa, verrucis minutiſſimis confertis obſita.*

clavata. 23. A. ſtipite filiformi, aperturarum utraque laterali. *Mull. zool. dan. prodr. 2740. O. Fabr. Fn. groenl. p. 333. n. 323.*

*Mant. plant. p. 522.* Vorticella Bolteni.

*Bolten. epiſt. de nov. zooph. Hamb. 1771. 4.*

*Habitat in* mari ſeptentrionali, *ſcopulis rupibusque baſi ſua arctiſſima adhaerens, ſerpulis & zoophytis ſaepius tota obducta, 9 pollices, & ultra longa, ſpadicea, rarius rubicunda, radicata, cute craſſa calloſa, intus glabra, alba, ſtipite filiformi, rigido, erecto, ſubflexuoſo, ſurſum incraſſato dilatato, nunc longiori, nunc breviori, clava ovata, nunc laevi, nunc ſubſulcata, aperturis rugoſis, eminentibus.*

pedunculata. 24. A. ſtipite ſenſim attenuato, capitulo fuſiformi, apertura utraque terminali.

*Syſt. nat. XII. 2. p. 1319. n. 14.* Vorticella (*ovife-*

fera ) ſimplex ſolitaria , flore ovali , ſtirpe ſimpliciſſima ſcabra.

*Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 16. Aſcidia clavata.

*Edw. glean. t.* 356.

*Habitat in* mari *inter* Aſiam & Americam borealem *intermedio , baſi variis marinis affixa , coriacea , rugoſiſſima , coccinea , orificiis papillaribus , rugis aliquot circularibus cinctis.*

mammillaris. 25. A. ſubparallelepipeda albicans , aperturis terminalibus concoloribus. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 24. *t.* 1. *f.* 15.

*Habitat in* ſalo Cornubienſi , *ſitu horizontali ſcopulis ſubmarinis tenaciſſime adnata , valde irritabilis , diformis , varie rugoſa & gibboſa , hinc inde ſetis mollibus adſperſa , coriacea ſordide albicans , aperturarum papilla hemiſphaerica intus elegantiſſime coccinea.*

globularis. 26. A. ovali-ſphærica ſemipellucida , aperturis terminalibus vix prominentibus. *Pall. it.* III. *p.* 309. *n.* 57.

*Habitat copioſa in littoribus vadoſis arenariis* Oceani glacialis , *ceraſi magnitudine , pedunculo brevi ſſimo affixa , cute duriuſcula extus laevi , arenulis adglutinatis obducta.*

Phuſca. 27. A. teres rubra , apertura utraque laterali. *Forsk. Fn. arab. aeg. p.* 129. *n.* 82. Alcyonium Phuſca.

*Habitat in* Smyrnam & Conſtantinopolin *alluente mari , ſaxis adhaerens , 2½ pollices longa , laevis , utrinque obtuſa , nunc recta , nunc incurva , cortice ſtrepoſo rejecto Graecis cum ſucco limoniorum edulis.*

Gelatina. 28. A. compreſſa laevis alba , ſacculo pallido , ori-

orificiis punctis luteis cinctis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2723.
*Habitat in* mari Norwegico.

cryſtallina. 29. A. compreſſa lævis, ſaccvlo albo atomis coccineis ſparſo. *Mull. zool. dan. prodr.* 2725.
*Habitat in* mari Norwegico.

octodentata. 30. A. oblonga biroſtris lævis albicans, aperturis hinc octo illinc ſexdentatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2731. *Act. Havn.* 10. *p.* 168. *f.* 7. *a.* 8. 9.
*Habitat in* mari Norwegico.

patelliformis. 31. A. alba, diſco rubro. *Mull. zool. dan. prodr.* 2739.
*Habitat in* mari Norwegico.

Pyura. 32. A. conica lævis intus papilloſa rubra, tubulis duobus terminalibus punctisque inter hos duobus nigris. *Mol. hiſt. nat. Chil. p.* 172.
*Habitat gregatim ſacco incluſa ad littus* Chilenſe *edulis; utrum hujus, an proprium genus?*

Aurantium. 33. A. ſubgloboſa: ſaccvlo coccineo punctis duriuſculis ſcabro, pupillis terminalibus cylindraceis rugoſis.
*Pallas n. act. Petrop.* 2. *p.* 246. *t.* 7. *f.* 38.
*Habitat in* mari Curilas inſulas *alluente, baſi teſtis lapillisque adhaerens pomi aurantii magnitudine.*

globularis. 34. A. ovato globoſa ſemipellucida glabra pedunculata: ſaccvlo extus ſubtiliſſime punctata, aperturis diſtantibus vix prominulis.
*Pallas n. act. Petrop.* 2. *p.* 247. *t.* 7. *f.* 39. 40.
*Habitat frequens in* maris hyperborei *littoribus vadoſis arena ſubtili ſtriatis* e. g. *ad ſinum* Caræ, *ceraſi majoris magnitudine, ſimpliciſſima, cinereſcens, arena tenera agglutinata ſcabra, pedunculo breviſſimo.*

SAL-

SALPA. *Corpus* liberum gelatinosum utroque apice apertum intus vacuum : intestino obliquo.

* *appendice instructae.*

maxima. 1. S. corpore utroque apice appendiculato. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 112. *n.* 30.
*Habitat in* Mari mediterraneo & Archipelago, *hyalina, spithamam longa subquadrangula, nucleo obscure testaceo opaco ad anum, appendice posteriore subulata, priore conica longiore.*

pinnata. 2. S. ore terminali, linea dorsali hinc flava inde alba, abdominis lineis duabus albo rubentibus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 31.
*Habitat in* mari mediterraneo, 2 *pollices longa, hyalina, subtriquetra, dorsi linea opaca, appendice pinnam aemulante, triquetro-prismatica.*

democratica. 3. S. punctata fasciata, aculeis pone octo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 32.
*Habitat numerosissima ad* Majorcam, *ovalis, antrorsum truncata, digitum latum longa, nucleo baseos opaco caeruleo, rarius ejus loco circulo multiradiato caerulescente, cauda biseta.*

mucranata. 4. S. ore laterali, mucrone hyalino interno ad frontem dextro, ad anum sinistro, nucleo caeruleo oblongo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 33.

---

Salpae, *gregariae*, [illegible] *et* [illegible] *monstrantes*, [illegible] *gysa*, [illegible] *dicent* [illegible] *et* Solander [illegible] *rio* [illegible] *ribus conspicuae.*

*Habitat ad* Yvicam, *hyalina, oblongo-ovata, posterius acuta, digitum transversum longa, nucleo opaco.*

** *appendice nulla.*

punctata. 5. S. ore subterminali, dorso rubro-punctato pone mucronato, ano porrecto. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 34.
*Habitat rarior in* mari mediterraneo, *sesquipollicaris, hyalina, abdominis fasciis obsoletis, nucleo ad anum globoso opaco ex ferrugineo flavescente.*

confoederata. 6. S. ore terminali, dorso gibboso. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 35.
*Habitat in* Mari mediterraneo, & Archipelago, *pollice longior, subtetragona, hyalina, mollis, nucleo pone gibbum dorsi globoso-ovato, opaco, obscure brunneo: linea ex hoc exeunte pellucida.*

fasciata. 7. S. ovato-oblonga, ore terminali, abdomine fasciato, intestino filiformi incurvo supra nucleum. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 36.
*Habitat rarior ad* ingressum Archipelagi, *sesquipollicaris, hyalina, abdominis fasciis* 5, *nucleo marginali ferrugineo, opaco.*

Sipho. 8. S. subcylindrica obtusa hyalina, nucleo brunneo, fronte tubulis duobus: apicibus perforatis rubris. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 37.
*Habitat in* mari rubro ad Djiddam, *basi saxis marinis aut spongiae affixa, vix digitum transversum longa, nucleo prope basin globoso, opaco, intestino ex fusco caeruleo.*

africana. 9. S. subtriquetra transverse, decemstriata, ore terminali, gibbo ad basin aucto nucleis tribus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 38. *Ha-*

*Habitat ad littora* Tunetana, *sesquipollicaris, hyalina, nucleo priori opaco brunneo globoso, reliquis albidis subpellucidis.*

solitaria. 10. S. hyalina ovalis, ore terminali: tubulo cæruleo, ano laterali cæruleo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 39.
*Habitat in* mari rubro ad Djiddam, *gramini adhaerens, digitum transversum longa, depressiuscula, nucleo prope basin mediam globoso pallide brunneo*

polycratica. 11. S. ore infra apicem, fronte caudaque truncatis. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 40.
*Habitat in* mari mediterraneo, *sesquipollicaris, congeneribus rigidior, abdominis fasciis* 5 *transversis, nucleo globoso fusco.*

DAGISA. *Corpus* angulatum cavum, utroque fine apertum.

notata. 1. D. altero fine macula fusca notato. *Banks & Solander apud Hawkesworth. it.* 2. *p.* 2.
*Habitat in* mari hispanico, 3 *pollices longa, at* 1 *crassa, lateribus altera alteri adhaerente.*

CLAVA. *Corpus* carnosum, gregarium clavatum, pedunculo tereti affixum: apertura unica verticali.

parasitica. 1. Cl. pedunculo albido pellucido, clava rubra opaca, mucronibus pellucidis conicis erectis obsessa. *Muller Beschr. berl. Naturf.* 1. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 3. 4.
*Habitat in* maris balthici *fuco nodoso, testaceis, palis, tralibus, parum vivida, os tamen dilatans & contrahens, hydris affinis.*

288. ACTINIA. *Corpus* rugosum, cirris eccentricis, apertura unica terminali, basi affixum.

rufa. 1. A. rufa, foramine rosaceo, cirris pallidis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 75. *t.* 23. *f.* 1-5. *rar.* 1. *p.* 47. *prodr.* 2797.

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1088. *n.* 1. *Mull. zool. dan. prodr.* 2793. Actinia (equina) semiovalis læviuscula.

*Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. Tethys (mentula) semiovatus.

*Brown jam. p.* 787. Actina subfusca mollis, fundo musculoso.

*Rondel. poiss. p.* 380. Urtica marina libera Aristotelis.

*Aldrov. zooph. p.* 567. Urtica parva Rondeletii.

*Gesn. Fisch.* 2. *p.* 10. Urtica parva marina.

*Jonst. exang. t.* 18. Urtica parva.

*Hill. anim. t.* 5. Medusa, species 1.

*Dicquem. act. angl. vol.* 63. *t.* 16. *f.* 1-3. Anemone de la premiere espece.

*Habitat in* Oceano, *etiam* glaciali, & mari mediterraneo, *rupibus adhaerens, rarius versicolor, formae variabilis, nunc cylindricae, nunc globosae, nunc conicae, nunc evolutae, cirris albidis, tenuibus flexilibus, mobilissimis, diametro corporis brevioribus, apice truncatis.*

crassicornis. 2. A. rubra, cirris conico elongatis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 77.

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1088. *n.* 2. Actinia (senilis) sub-

---

Actiniæ, *quibus pro ore & ano unica apertura data est, tentaculis, [illegible] aliis animalculis marinis victitant, ipsae sentiunt, nonnullae [illegible] sapidae, [illegible] ob [illegible] nunc retractae, nunc magis [illegible] [illegible] variabiles, abscissas partes redintegrant, lucem vividissime sentiunt, plurimae viviparae.*

ſubcylindrica transverſe rugoſa.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2792. Actinia rubra, cirris fuſiformibus.

*Baſt. opuſc. ſubſ.* 3. *p.* 120. *t.* 13. *f.* 1. Actinia rugis longitudinalibus, proboſcidibus longis craſſis.

*Fn. ſucc.* 2103. Priapus ſenilis.

*Forsk. fn. arab. aeg. p.* 101. Priapus ruber.

*Rondel. poiſſ. p.* 381. *c.* 14. *Bellon. aq. p.* 342. *Goſn. Fiſchb.* 2. *p.* 11. *Jonſt. exſang. t.* 18. *f.* 2. Urtica rubra.

*Aldrov. zooph. p.* 568. Urtica rubra, Urtica explicata Bellonii, Urtica contracta Bellonii.

*Dicquem. act. angl. vol.* 63. *t.* 16. *f.* 10. & *t.* 17. *f.* 11. 12. Anemone de la ſeconde eſpece.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 204.

*Gunn. act. Stockh.* 1767. *t.* 4. *f.* 4. 5.

*Fabr. it. norw. p.* 261.

*Habitat in* mari atlantico, mediterraneo, ſeptentrionali, glaciali.

plumoſa. 3. A. tentaculis parvis, margine penicillis cirrata.

*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 12. *t.* 88. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 77. *prodr* 2791.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1088. *n.* 3. Actinia (folina) ſubcylindrica ſtriata lævis glande muricata.

*Baſt. opuſc. ſubſ.* 3. *p.* 122. *t.* 13. *f.* 2. Actinia rugis orbicularibus, proboſcididus multis tenuibus.

*Olaſſ. it. isl.* 2. *p.* 1002. Actinia corpore ventricoſo molli, tentaculis numeroſis variis.

*Gunn. act. Nidroſ.* 5. *p.* 425. *t.* 7. Actinia (polymorpha) lævis rufa, baſi inæquabili & dilatabili, tentaculis duplicis generis.

*Dicquem act. angl. vol.* 63. *p.* 397. Anemone de la quatrieme eſpece.

*Planc. conch. min. nat. p.* 43. *t.* 4. *f.* 6, Urtica ſoluta caryophyllum referens.

*Ha-*

*Habitat in* Oceano europæo, *pulcherrima, nunc caſtanea, nunc ex luteo fuſca, nunc ex luteo virens, nunc alba: modo opaca, modo pellucidiſſima, faucis laciniis nunc albis, nunc rufis, nunc aurantiis.*

judaica. 4. A. cylindrica lævis truncata, præputio interne undulato lævi.
*Planc. conch. min. not. p.* 43. *t.* 6. Colum marinum.
*Habitat in* mari mediterraneo.

effœta. 5. A. ſubcylindrica anguloſo-ſtriata.
*Baſt. opuſc. ſubſ.* 1. *p.* 122. *t.* 14. *f.* 2.
*Habitat in* Oceano.

coccinea. 6. A. albo rubroque varia, cirris cylindricis annulatis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 1-3. *prodr.* 2794. *rar.* 2. *p.* 65.
*Nov. act. nat. Cur.* 6. *p.* 53. Actinia virginea.
*Habitat rara in* Norwegiæ ſinubus, *fucis lapidibusque adhaerens, cylindrica, truncata, glabra: margine ſupero tentaculorum conicorum albarum rubro annulatorum, duplici ſeric muricato, glande glabra: centro fiſſuris perforato.*

undata. 7. A. conica pallida, ſtriis duplicatis rugoſis fulvis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 4. 5. *rar.* 2. *p.* 66.
*Habitat in* Norwegiæ ſinu Chriſtianienſi, *fucis & milleporae polymorphae adhaerens, truncatae facie, porrecta cylindracea, retracta truncato-conica, tentaculis ex centro exeuntibus pallidis, pellucidis, longis.*

viduata. 8. A. griſea, ſtrigis longitudinalibus cirrisque albis. *Mull. zool. dan* 2. *t.* 63. *f.* 6-8. *prodr.* 2799. *rar.* 2. *p.* 67.

Al-

*Aldrov. zooph. p.* 565. Urtica cinerea Rondeletii.
*Habitat haud frequens in* fuco laccharino maris Norwegici, *conico-truncata, ſtrigis* 24, *aperturae centro rugoſo rubro.*

truncata. 9. A. rufo-lutea conica glabra pellucida. *Mull. zool. dan. prodr* 2795.
*Dicquem. act. angl.* 63. *p.* 387. *t.* 17. *f.* 13?
Anemone de la troiſieme eſpece.
ε) Actinia inteſtinalis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 342.
*Habitat in* Oceano europæo.

nodoſa. 10. A. rugoſa ſulcata, utroque fine ampliori ſupero tuberculato cum cirris intermediis brevibus compreſſis coccineis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 341.
*Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis profundis, fundo rupeſtri adhaerens, 4 pollices longa, ex albo rubens, apertura cirrorum duplici ordine cincta.*

ſpectabilis. 11. A. cærulea lævis, cirris craſſis albo maculatis, foramine radiato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 351. *n.* 342. b.
*Habitat ad* Groenlandiæ *littora, in cavernis rupium frequens, ad 2 pollices longa, ſtrigis longitudinalibus albo punctatis varia.*

digitata. 12. A. fulva punctis albis, cirris roſeis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2796.
ε) Actinia craſſicornis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 348. *n.* 340.
*Habitat in* Oceani ſeptentrionalis *rupibus littorcis in fiſſuris,* ε) *tota mollis, lubrica, nunc lenticulae magnitudine, nunc pollicem longa, albida, ſubgriſea vel rubicunda; lineis longitudinalibus albo punctatis.*

gi-

gigantea. 13. A. cinereo virescens, limbo plicato corpore multoties latiore, tentaculis papilliæformibus virescentibus.

*Forsk. fn. ar. aegypt. p.* 100. *n.* 8. Priapus giganteus.

*Habitat in* mari rubro *ad littora vadosa* Lohajæ & Moccæ, *in coeno fabuloso se recondens*, 4 *pollices longa*, *tentaculis apice violaceis.*

alba. 14. A. gelatinosa albido-hyalina, tentaculis parvis papilliformibus oblongis.

*Forsk. fn. aeg. arab. p.* 101. *n.* 9. Priapus albus.

*Habitat in* mari rubro, *lapidibus littoreis adhaerens*, *vix pollicis diametro*, *vittis longitudinalibus obscuris.*

viridis. 15. A. fusco virens, tentaculis diametri longitudine.

*Forsk. fn. aeg. arab. p.* 102. *n.* 11. Priapus viridis.

*Habitat* Alexandriæ *in* Ægypto, *lapidibus submarinis insidens*, *pollicis diametro*, *tentaculorum serie multiplici*; *sub his glandulae marginales.*

Priapus. 16. A. corpore cylindrico basi dilatato, tentaculis maculatis.

*Forsk. fn. aeg. ar. p.* 102. *n.* 12. Priapus Polypus.

*Habitat in* mari rubro *prope urbem* Ghomfoda, *testaceis adhaerens*, *albida fusco nebulosa*, *ad 2 pollices longa*, *circulo circa os rubro*, *tentaculis diametro triplo brevioribus*, *exterioribus rufescentibus*, *interioribus flavis.*

candida. 17. A. laevis foramine rugoso, tentaculis setiformibus flexuosis ad summum marginem dispositis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 58. *t.* 115. *prodr. n.* 2798.

*Habitat in* Oceano septentrionali.

bi-

bicornis. 18. A. hemiſphærico-ovalis glabra bicornis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2800.
*Olaff. it. isl. p.* 900.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali.

Volva. 19. A. corpore cylindrico ſuperne plano, appendicibus orificii ſex. *Mull. zool. dan. prodr.* 2801.
*Olaff. it. isl.* 900. Gigarpuſia.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali; *an hujus generis?*

Caryophylius. 20. A. rubro fuſca, tentaculis parvis penicilliformibus. *Martin in marine verm.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
*Habitat in* mari britanico.

Iris. 21. A. corpore tentaculisque obtuſis cylindricis: exterioribus rufis; interioribus cæruleis, centro albido. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 82. *f.* 5. 6.
*Habitat in* Oceano norwegico.

Fiſcella. 22. A. rugis longitudinalibus tranſverſim ſtriatis, tentaculis cylindricis obtuſis annulatis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 13. *t.* 88. *f.* 3.
*Habitat in* mari norwegico.

puſilla. 23. A. elliptica lævis, radiis duplicis ordinis; exterioribus apice nigris. *Ol. Swarts n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 2.
*Habitat in* Oceano 57. *latitudinis*, *piſi majoris magnitudine*, *cataceorum pabulum.*

MAMMARIA. *Corpus* læve cirris nullis: apertura unica.

Mammilla. 1. M. conico ventricoſa alba. *Mull. zool. dan. prodr.* 2718.
*Habitat in* mari norwegico.

va-

varia. 2. M. ovata, albo & purpureo varia. *Mull. zool. dan. prodr.* 2719.
*Olaff. it. isl.* 900. Saettu Koppar i Sæ.
*Habitat in* Oceano feptentrionali.

Globulus. 3. M. globofa cinerea libera. *O. Fabr. Fn.groenl. p.* 329. *n.* 315.
*Habitat frequens in* Groenlandiæ *littore inter radices fucorum, terebellae cirratae cibus praecipuus, fimpliciffima, mollis, laevis, fesquilineae diametro, gelatinofa, cute tenuiffima.*

PEDICELLARIA. *Corpus* molle pedunculatum: pedunculo rigido fixo, apertura unica.

globifera. 1. P. capite fphærico, collo nullo. *Mull. zool. dan* 1. *p.* 52. *t.* 16. *f.* 1-5. *prodr.* 2782. *rar.* 1. *p.* 32.
*Habitat inter* echini Droebacenfis aculeos, *mucorem referens, capite rubefcente, cerafi facie, pedunculo fpadiceo fextupio longiore: cute gelatinofa hyalina.*

triphylla. 2. P. capite trilobo: lobis fubquadrangularibus muticis, collo tereti. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 16. *f.* 6-9. *prodr.* 2781. *rar.* 1. *p.* 33.
*Habitat rarior in* echini Droebacenfis *aculeis, collo flaxuofo cyaneo, capitis lobis rubentibus aut hyalinis, interdum ovatis, pedunculo fpadiceo.*

tridens. 3. P. capite trilobo; lobis ovalibus ariftatis, collo tereti. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 10-15.
*Habitat frequens inter* echinorum Droebacenfium *aculeos, collo laevi, hyalino, interdum rubente, lobis capitis interdum* 4, *collo triplo longioribus, rarif-*

*rariſſime muticis : pedunculus rubeſcens , collo triplo longior.*

289. TETHYS. *Corpus* liberum , oblongiuſculum, carnoſum , pedunculis nullis.
*Os* proboſcide terminali cylindrica , ſub labio explicato.
*Foramina* duo ad latus colli ſiniſtrum.

leporina. 1. T. labro ciliato.
*Column. aquat.* 27. *t.* 26. Lepus marinus major.
*Rondel. piſc.* 526. Leporis marini tertia ſpecies.
*Habitat in* mari mediterraneo.

Fimbrica. 2. T. labro crenulato.
*Bohadſch mar* 54. *t.* 5. *f.* 1. 2. Fimbria.
*Habitat in* mari adriatico.

PTEROTRACHEA. *Corpus* liberum , gelatinoſum , pinna gelatinoſa mobili ad abdomen vel caudam.
*Oculi* duo intra caput.

coronata. 1. Pt. ventre caudaque pinniferis , capitis proboſcide tereti perpendiculari , frontis coronula aculeis decem. *horsk. Fn. aeg. ar. p.* 117. *n.* 41.
*Habitat in* mari mediterraneo & archipelago , *ſpithamae fere longitudine , pollicis craſſitie , proboſcide 2 fere pollices longa , oculis ovalibus fuſcis , cauda verticali triangulari : lineis utrinque 4 aculeatis ſcabra , pinnula utrinque horizontali ſemicordata terminata , ventris pinna pone medium, orbiculari , & altera ſubtus in margine campanulata , hyalina.*

hyalina. 2. Pt. capite elongato porrecto lævi, pinnula centrali. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 42.

*Habitat in* mari - - - *celerrime mota, vix pollicem longa, oculis fuscis internis ad basin capitis non coronati, pinnula subrotunda.*

pulmonata. 3. Pt. capite obtuso hyalino, intestino respiratorio plumis ciliato. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 43.

*Habitat* - - - - *subcylindrica, hyalino-rufescens, capite a trunco non distincto, oculis pellucidis, transversis, ovalibus, nigris, trunco subtus punctis albidis opacis vario: pinna subrotunda longitudinali, intestino respiratorio ante subalbido, pone rufescente, insinuato membro violaceo basi fusco, cauda hyalina, compressa, attenuata, dimidium pollicem longa.*

aculeata. 4. Pt. ventre aptero, cauda trunco longiore: lineis aculeatis pinnaque terminalli horizontali. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 44.

*Habitat ad* Archipelagi *ingressum*, $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, hyalina, nucleo opaco flavescente gelatina alba pellucida circumdato, cauda trunco plus duplo longiori ensiformi: pinna duplici semicordata.*

290. HOLOTHURIA. *Corpus* liberum crassum, cylindricum.
*Os* anticum inter tentacula ramosa.

elegans. 10. H. tentaculis viginti racemosis, corpore papil-

---

Holothuriæ [illegible] *maris incolæ per* [illegible] *anteriorem* [illegible] *hauriunt, & [illegible] expellunt, per posteriorem aquam ingressam [illegible], [illegible] figuram non [illegible] et tentaculis nunc [illegible], nunc [illegible] tractis mutantes, corpus quoque ipsum nunc expandendo, nunc contrahendo.*

pilloſo ſupra rubeſcente, ſubtus albo. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1-3. *prodr.* 2804. *var.* 1. *p.* 3.
*Strœm. ſondm.* 1. *p.* 205.
*Gunn. act. Stockh* 1767. *t.* 4. *f.* 3.
*Habitat in* mari norwegico, *aquam ſiphonis inſtar extrudens, ex foramine minori* 8-11 *pollices longa, ex rubro alboque varia, papillis acuminato diſtantibus, dorſi in* 6 *ſeries digeſtis, tentaculis carneſis albis, apice faſciculo fibrarum intus nodul-ſarum inſtructis.*

frondoſa. 1. H. tentaculis frondoſis, corpore lævi. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 344.
*Gunner act. Stockh.* 1767.
*Habitat in* Oceano norwegico, *ovato oblonga, tentaculis* 10. *capite longioribus, foraminibus pone caput* 3 *approximatis & 1 laterali magis remoto.*

Phantapus. 2. H. tentaculis ramoſis, corpore poſterius attenuato ſubtus punctis ſcabro. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 54. *t.* 112. 113. *prodr.* 2804.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1089. *n.* 2. Holothuria tentaculis ramoſis, corpore ſubſquamoſo triſariam punctato.
*Aldr. zooph. p.* 590. Pudendum miſſum a Sittardo, Epipetrum quorumdam.
*Geſn. Fiſchb.* 2. *p.* 24. Pudendi marini alia ſpecies.
*Act. Stockh.* 1765. *p.* 265. *t.* 10.
*Habitat in* mari Norwegico & mediterraneo, *ovata, ſubtus plana, poſterius conica, apice perforato, tentaculis* 10 *retractilibus.*

tubuloſa. 3. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore ſupra papilloſo, ſubtus tubuloſo.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1090. *n.* 3. Holothuria

( tremula ) tentaculis fasciculatis , corpore papillis hinc subconicis , illinc cylindricis.

*Rond. zooph. c.* 17. *Aldr. zooph. p.* 508. Holothurii prima species.

*Jonst. exang. p.* 56. *c.* 2. *t.* 19. *f.* 1. & *p.* 57. *c.* 4. Holothurius Rondeletii.

*Aldr. zooph. p.* 590. Epipetro zoographi simile , & *p.* 589. Genitale.

*Bell. aq. p.* 441. Genitale marinum.

*Column. aq.* 16. Pudendum regale piscatorium.

*Planc. conch. min. not.* 108. *t.* 8. *f.* A. B. & *Vandell. diss. p.* 89. *t.* 3. *f.* 1-3. Mentula marina.

*Bohadsch anim. mar. p.* 75. *t.* 6. & *t.* 7. *f.* 1-5. Hydra.

*Forsk. Fn. aegypt. ar. t.* 39. *f.* A. Fistularia.

*Gesn. Fischb. anh.* 4. *p.* 82.

*Habitat in* mari mediterraneo & adriatico , *an haec , quae teste Ill.* Pallas *siccata Sinensibus in cibum cedit ?*

Physalis. 4. H. cirris difformibus filiformibus pendulis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 254. *t.* 3. *f.* 6.

*Rumpf mus.* 49 ? Holothuria.

*Sloan. jam.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *f.* 5. Urtica marina soluta purpurea oblonga , cirris longissimis.

*Brown. jam.* 386. Arethusa crista subrubella venosa.

*Osb. it.* 284. *t.* 12. *f.* 1. Physalis pelagica.

*Habitat in* pelago , mari atlantico , *ovata , subtrigona , hyalina , dorso acuto obscure viridi , anterius rufescens* ; rostrum *spirale rufescens* ; tentacula *plurima inaequalia , alia teretia , crassiora breviora , alia media capillaria* : *apice luteo globoso , alia longiora filiformia.*

Thalia. 5. H. crista compressa : lineis lateralibus integris. *Brown. jam.* 384. *t.* 43. *f.* 3. Thalia oblonga , cri-

crista perpendiculari compressa quadrata : lineis lateralibus integris.

*Habitat in* pelago americano ; *an hujus generis ?*

caudata. 6. H. caudata , crista compressa : lineis lateralibus interruptis.

*Brown. jam.* 384. *t.* 43. *f.*4. Thalia oblonga caudata , crista depressa rotundata : lineis lateralibus interruptis.

*Habitat in* pelago ; *an hujus generis ?*

denudata. 7. H. destituta crista caudaque.

*Brown. jam.* 384. Thalia oblonga lineis interruptis , cauda & crista destituta.

*Pis. bras.* 296 Moucicou.

*Habitat in* pelago americano ; *an hujus generis ?*

pentacta. 8. H. tentaculis denis , corpore quinquefariam verrucoso. *Mull. zool. dan.* 1. *p.*110. *n.*50. *t.*31. & 3. *p.*45. *t.* 108. *f.* 1-4. *prodr.* 2806. *rar.* 1. *p.* 71. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 352. *n.* 343.

*Plin. hist. nat. l.* 9. *c.* 2. *Rondel. pisc.* 2. *c.*25. *Aldrov. zooph. p.* 593. *Gesn. Fischb. anh.* 4. *p.*85. *Johnst. exang. c.* 5. *t.* 20. Cucumis marinus.

*Vandell. diss. p.* 87. *t.* 2. *f.* 12. Cucumer marinus.

*Planc. conch. min. not. p.* 99. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Comm. Bonon.* V. *p.* 242. *t.* 2. *f.* 1-3. Echinus coriaceus ad os fimbriatus.

*Hill. hist. an. t.* 5. Aphrodita quarta.

*Olaff. it. isl.* 2. *p.* 900. Brimbatus.

*Penn. act. angl.* 1701. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 3. A. B. Hydra corallifora , tentaculis retractilibus frondosis.

*Dicquemar. journ. de phys. Oct.*1778. *p.* 287. *t.*11. *f.* 1-6. Fleurilarde.

*Habitat in* mari europæo *omni , ad* 6 *usque pollices longa , in fundo maris decurrens , & longe a lit-*

*t.-*

*toribus natans, vivipara, laevis, ex viridi brunnea, tentaculis apice rubicundis, cute crassa.*

papillosa. 24. H. tentaculis decem frondosis, corpore ovato undique papilloso. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 108. *f.* 5.
*Habitat in* sinubus insularum Faeroe.

Spallanzani. 25. H. tentaculis 96 filamentosis. *Spallanzan. act. soc. ital.* 2.
*Habitat in* mari mediterraneo.

Priapus. 9. H. ore papillis carnosis, corpore striis annularibus glandis longitudinalibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 355. *n.* 347.
*Amoen. acad.* 4. *p.* 255. Priapus (humanus) cylindricus striis annularibus, glande striis longitudinalibus elevatis.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 27. *t.* 96. *f.* 1. *prodr. n.* 2807.
*Abilg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 133. *t.* 3. *f.* 1.
*Habitat in* Oceano indico & septentrionali, mari *quoque* mediterraneo, *ad* 6 *pollices longa, colli gobionis esca*: Paro *dimidia cylindrica striis numerosissimis annularibus exarata osculo terminatur, striis* 3 *rugosis cincto, & fasciculum tentaculorum oblongum protrudente, altera obovata glandiformis striis* 24 *longitudinalibus, parallelis, elevatis, distantibus, ciliato-scabris exarata, osculo concavo striis annulari excavata cincto, intus aculeis plurimis recurvis: exterioribus majoribus. An hujus generis?*

squamata. 11. H. tentaculis octonis subramosis, corpore supra scabro, subtus molli. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 35. *n.* 10. *t.* 10. *f.* 1-3. *prodr.* 2810. *rar.* 1. *p.* 20. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 356. *n.* 348.
*Nov. act. nat. Cur.* 6. *p.* 54. Actinia squamata.
*Pall. nov. act. Petrop.* 2. *p.* 244. *t.* 7. *f.* 34-37. Ascidia squamata.

*Habitat in* Norwegiæ *sinubus*, mari, Groenlandiam & *insulas* Kurilas *alluente*, *saxis tenacissime adhaerens*, *variae magnitudinis*.

Penicillus. 12. H. tentaculis racemosis octo, corpore osseo pentagono. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 36. *n.* 11. *t.* 10. *f.* 4. *prodr.* 2808. *rar.* 1. *p.* 21.
*Habitat in* Norwegiæ *sinus* Drocbacensis *fundo limoso profundo*, *immobilis*, *ventricosa*, *laevis alba*, *torque fusco*, *ad margines nigro*, *annuloque pone tentacula carinata ex nigro flava*, *parallelo*, *pallido*, *grenulato*.

Fusus. 13. H. tentaculis denis, corpore fusiformi tomentoso. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 37. *n.* 12. *t.* 10. *f.* 5. 6. *prodr.* 2809. *rar.* 1. *p.* 22.
*Habitat in* Norwegiæ *sinus* Drocbacensis *limo profundo*, *cinerea*, *squamis minutis rugosa*, *fibrisque brevissimis obsita*, *corpus cavum cyathiforme protrudens*, *infra collo angusto instructum*, *supra in orbiculum foramine medio nigro pertusum dilatatum*, *tentaculis latere denticulatis*.

inhærens. 14. H. tentaculis duodenis, corpore papilloso sexfariam lineato. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 109. *n.* 49. *t.* 31. *f.* 1-7. *prodr.* 2811. *rar.* 1. *p.* 70. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 121. *t.* 38. *f.* A. Fistularia (reciprocans) tentaculis linearibus lanceolatis utrinque ramosis.
*Habitat in* Norwegiæ sinuum *profundo*, *etiam in* mari rubro, *aliquando a* piscibus *deglutita*, *papillis osseosis innumeris obsessa*, *quarum ope manui contingenti fortissime adhaeret*, *porrecta*, *pellucida*, *spadicea*: *fasciis albis*, *tentaculis carnosis*, *lanceolatis*, *rubris*, *utriaque denticulatis*.

Lævis. 15. H. elongata, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam lineato punctatoque. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 345.

*Ha-*

*Habitat ad scopulos* maris Groenlandiam *alluentis in fundo argilloso, quem tranat, & in quem se condit, tentacula sena alternatim exserens, mollis, laevis, candida, pellucida, 1-6 pollices longa, tentaculis mollibus, albidis, apice octofidis.*

minuta. 16. H. oblonga, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam papillato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 354. n. 346.*

*Habitat ad* littora Groenlandiæ *in fundo arenoso papillas extendendo lente incedens, laevi proxime affinis, 4 lineas longa, glabra, submembranacea, albida, rarius subrubicunda, papillis singularum serierum denis, tentaculis flavicantibus apice sexfidis.*

forcipata. 17. H. ventricosa, fine utroque angustato conico: anteriore forcipato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 357. n. 349.*

*Habitat in* fundo maris Groenlandiam *alluentis argilloso, a cotto scorpio saepe comesta, 5 pollices longa, mollis, lubrica, cute tenui punctis innumeris parum eminentibus subaspera, forcipis rigidae orichalceae cruribus curvis.*

zonaria. 18. H. oblonga depressa, vagina incarnata, sacco ex albido hyalino, zonis quinque luteis vario. *Pall. spicil. zool. 10. p. 26. t. 1. f. 17. A. B. C.*

*Habitat in* mari *insulam* Antiguam *alluente, oris transversi labiis extrinsecus prominulis hiantibus.*

vittata. 19. H. corpore molli laxo vittis albis fusca punctatis vario, tentaculis lineari: lanceolatis ad latera dentatis.

*Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 121. n. 43.*

*Habitat in* mari rubro *ad* Lohajam, *frequens inter*

*zoſteras, papillis ſuis viſcoſis digito contrectanti firmiter adhaerens ſeſquiſpithamalis, virid's 5 albis nigro punctatis, rarius interruptis, & fuſcis albo-guttatis alternatim anguſtis, tentaculis 12, medio fuſcis, ad latera pallidis.*

maxima. 20. H. corpore rigido ſubtetragono ſupra convexo, ſubtus plano marginato albo, tentaculis filiformibus apice pebato-laciniatis.

*Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 121. *n.* 50. Fiſtularia maxima.

*Habitat in* maris rubri *littore, pedalis, dura, pallida, fcabra, tentaculis cinereo-hyalinis.*

impatiens. 21. H. corpore rigido cinereo, tentaculis viginti filiformibus: apice pebla ſubſeptemfida denticulata.

*Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 121. *n.* 51. Fiſtularia impatiens.

*Habitat ad* maris rubri *littora ſub lapidibus vel in petris ſpongiae officinalis, duriuſcula, cinerea, faſciis maculisque varia, verrucis hemiſphaericis approximatis medio albidis aſpera, tentaculis hyalinis, nigro-punctatis, obtuſe denticulatis.*

nuda. 22. H. orbicularis caerulea, criſta nulla, tentaculis diſci nudis, radii trifariam glandiferis.

*Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 103. *n.* 14. Holothuria denudata.

*Habitat in* mari mediterraneo *a* Maſſilia *ad* Moliten, *diametro digiti tranſverſi, paginae ſuperioris diſco albido ſtriis concentricis radiato, margine diſci nigroque caerulea, tentaculis filiformibus hyalino-caerulefcentibus*; utrum propria *ſpecies* hujus *generis, an meduſa umbella*?

ſpirans. 23. H. ovalis caerulea oblique criſtata, ſubtus tentaculis diſci albis, radii longioribus nudis

cae-

cæruleis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 104. *n.* 15.
*Habitat in* mari mediterraneo, 2 *pollices longa, esculenta, diu in aqua asservata aquam caeruleo colore inficiens, exuviis suis oniscis & monoculis in habitaculum cedens, supra in umbonem albibum protuberans, crista bipartita semi-orbiculari, tentaculis filiformibus, mobilissimis*; utrum distincta hujus *generis species, an medusa vetella?*

LOBARIA. *Corpus* supra convexum subtus planum, lobatum.

quadriloba. 1. L. cauda lobalata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 30. *t.* 100. *f.* 1-5. *prodr.* 2741.
*Ascanius act. Stockh.* 1772. 4. 5. *t.* 10. *f.* A. B.
Philina quadripartita.
*Habitat in* mari septentrionali.

292. TRITON. *Corpus* oblongum.
*Os* proboscide involuta spirali.
*Tentacula* XII. bipartita, utrinque sex: posterioribus cheliferis.

littoreus. 1. TRITON.
*Habitat in* rupium submarinarum *foraminibus, in lepadibus obvius, tentaculorum articulatorum involutorum introrsum ciliatorum paribus sex, posterioribus tribus cheliferis, ad basin tentaculorum os; inter extrema probascis. Figura similis v. act. angl.* 50. *v.* 2. *p.* 847. *t.* 34. *f.* A. *Leeuwenh. arcan.* 465. *f.* 7.

293. LERNÆA. *Corpus* oblongum teretiuſculum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia æmulantibus ſe aſſigens.

*Ovaria* bina, tanquam totidem caudæ.

branchialis. 1. L. corpore tereti flexuoſo, ore laterali inter cornua tria ſubramoſa.

*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 65. *t.*118. *f.*4. *prodr.* 2743. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 336. *n.* 325. Lernæa gadina.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 209. *t.* 1. *f.* 18. Tokn trold.

ε) Lernæa minor. *Koelreuter comm. ac. Theod. Palat.* 3. *p.* 57.

*Habitat in* Oceani ſeptentrionalis gadorum *branchiis, Groenlandis eſculenta, digiti minimi longitudine, cava, membranacea, anterius & poſterius eminens, ſordide alba, vel obſcure rubra, cauda ſulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovariis ex cirris 2 longis contortuplicatis.*

cyprinacea. 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tentaculis apice lunatis. *Fn. ſuec.* 2100. *t.* 2. *f.* 2100. *

*Fn. ſuec.* 1. *n.* 1282. *f.* 1282. Lernæa tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.

*Habitat in* piſcinis *frequens ſupra corpus* cyprini caraſſii, *quod maculis rubris vulnerat.*

ſalmonea. 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus approximatis. *Fn. ſuec.* 2102. *

*Mull.*

---

Lernææ, *oculis carentes piſcibus infeſtæ, quorum ſanguinem [illegible], in pinnis [illegible] et branchiis [illegible], corpus [illegible] perpendiculari erecto, ovariis rigidis protenſis immobiliter et tenaciſſime adhærentes.*

*Mull. zool. dan. prodr.* 2744. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 327. Lernæa corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis.

*Brander pisc. cumoens.* 25. *t.* 1. *f.* 1.

*Gisler. act. Stockh.* 1751. *p.* 185. *t.* 6. *f.* 1-5. Pediculus salmonis.

*Habitat in* salmonum, *rarius in* gadi barbati *branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis, capite parvo, oblongo convexiusculo, labiis 2 horizontalibus; superiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori bifido, abdomine obovato latiori, ovariis candidioribus, teretibus, intus granulatis, magnitudine totius animalis.*

asellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. *Fn. suec.* 2101.

*It. wgoth.* 171. *t.* 3. *f.* 4. Lernæa, cauda duplici tereti.

*Habitat in* Oceani septentrionalis gadi *branchiis.*

huchonis. 5. L. corpore nodoso, tentaculis duobus, ovario duplici posterius adnato. *Schranck it. bavar. p.* 99. *t.* 2. *f.* A-D.

*Habitat in* salmonis huchonis branchiis *frequens, salmoneae affinis, candidissima, subcartilaginea.*

clavata. 6. L. corpore cylindrico subsinuato triplicato infra apicem rostri. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 110. *n.* 54. *t.* 33. *f.* 1. *prodr.* 2853. *rar.* 1. *p.* 75.

*Habitat in* percæ norwegicæ *pinnis, branchiis, ore, oculis, candida, pellucida, lineis rubris picta, intestino anguste, flavescente, apice acuminato, curvo, nodoso, ovariis tubulosis: ovis extrinsecus adhaerentibus.*

uncinata. 7. L. corpore subcordato, rostro simplici curvo, ore

ore terminali. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 120. *n.*55. *t.*33. *f.*2. *prodr.* 2745. *rar.* 1. *p.* 76. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 338. *n.* 328.

*Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis* gadorum *variorum pinnis & branchiis, mollis, pallida, dorsi medii sulco longitudinali, ovariis rotundatis, apicem versus incrassatis.*

gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque posterioribus nodosis, cornubus duobus arietinis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 121. *t.* 33. *f.* 3. *prodr.* 2747. *rar.* 1. *p.* 77. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 339. *n.* 329.

*Habitat in* cutti gobionis *branchiis*, 7 *lineas longa, ex albo caeruleſcens, inteſtino ſuperne translucente obſcuro, depreſſa, ſubtus ſubconcava, oris inter cornua* 2 *curvata intermedii labiis* 3, *ano biſido, ovariis ſpiralibus, tereti ſubulatis.*

radiata. 9. L. corpore quadrato depreſſo, branchiis utrinque tribus, cornubus quatuor reſtis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 122. *n.* 57. *t.* 33. *f.* 4. *prodr.* 2748. *rar.* 1. *p.*78. *O. Fabr. Fn. groenl. p.*340. *n.* 330.

*Habitat in* coryphænæ rupeſtris *oris angulis, rarior, lernaeae ab* Ariſtotele & Rondeletio *in* thynno *obſervatae proxima*, 11 *lineas longa, ſordide alba vel cinerea, tuberibus ſolidioribus lateris inaequalis, ad latera crenata, capite depreſſiuſculo rotundato, ſubtus convexiori, papillis crebris minutis inaequali.*

nodoſa. 10. L. corpore quadrato tuberculato, brachiis ſubtus breviſſimis utrinque duobus. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 123. *n.* 58. *t.* 33. *f.* 5. *prodr.* 2749. *rar.*1. *p.*79. *O. Fabr. Fn. groenl. p.*341. *n.*331.

*Habitat in* percæ norwegicæ rictu, *radiata minor, mollis, dilate cinerea, ſupra convexa, ſubtus con-*

*concava, medio dorso tuberculis 4 duris lacteis inaequali, dentibus utrinque 5 pariter lacteis, capite rotundato, per striam mediam candidam bipartito.*

cornuta. 11. L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite subovato. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 124. *n.* 59. *t.* 33. *f.* 6. *prodr.* 2750. *rar.* 1. *p.* 80.

*Habitat in* pleuronectis Platessa & Linguatula, *cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornubus* 2, *bis dente solitario armatis, oris palpis* 2, *ovariis fascis: ovis spadiceis.* Zoega.

pectoralis. 12. L. capite orbiculato hemisphærico, abdominis obcordati papilla terminali truncata. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 125. *n.* 60. *t.* 33. *f.* 7. *prodr.* 2751. *rar.* 1. *p.* 81.

*Habitat in* pleuronectarum & æglefini *pinnis, postissimum pectoralibus, monoculo piscino similis, alba, diaphana, punctis pallis adspersa, verticis mucronibus* 2 *falciformibus, rostro conico truncato: cornibus* 4 *minutis, mucronibus* 2 *brevissimis, & prope mucronem* 3 *conicum palpis* 2, *brachiis* 2 *non curvatis, ovariis angustioribus subannulatis diametri aequalis.*

lotæ. 13. L. ovariis quaternis inæqualibus. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 44. *t.* 2. *f.* 6.

*Habitat in* gadi lotæ *branchiis, oris uncinulis* 2, *appendicibus cruciatis* 4. Zujef.

cyclopterina. 14. L. corpore tereti flexuoso, orificio duplici in medio rostri cornibus tribus tripartitis terminati. *Mull. zool. dan. prodr.* 2745. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 326.

ε) Lernæa minor, ovariis virescentibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *Ha-*

*Habitat in* cyclopteri ſpinoſi, β) *in* liparis branchiis, *branchiali affinis, cornu tamen tenui ſurſum verſo, apice integro, cauda anguſtiori: lobis utrinque* 2 *convexis, ovariis ſimplicibus ſpiralibus, in longitudinem* 5 *pollicum extenſilibus.*

pinnarum. 15. L. rufa capite cylindrico anterius roſtrato, tentaculis duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. *F. Chr. Fabr. it. norw. p.* 282. *n.* 3.
*Habitat in* gadi barbati *pinnis dorſalibus, depreſſa, carnoſa, dorſo canaliculato, brachio cylindrico dorſo antrorſum inflecto in canali recondendo, ovariis elongatis cylindricis.*

294. SCYLLÆA. *Corpus* compreſſum: dorſo canaliculato.
*Os* foramine edentulo terminali.
*Tentacula* ſ. *Brachia* ſubtus trium parium.

pelagica. 1. Sc. fixa, tentaculis extremis ſimilibus, mediis papilloſis.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1094. Scyllæa.
*Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 56. Lepus pelagicus.
*Osb. it.* 296. Zoopterygius.
*Seb. muſ.* 1. *t.* 74. *f.* 1.
*Habitat in* pelagi fuco natante, *cui foſſula dorſi crenata affigitur, quieſcens, oblonga, dorſo retrorſum latiore obtuſo, tentaculis extremis minoribus rotundioribus, mediis foliaceis oblongis repandis, obtuſioribus.*

ghomfodenſis. 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis introrſum vittis ramoſis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 103. *n.* 13.
*Habitat ſparsius in* mari rubro *inter* Ghomfodam

& Djesan, *pollicaris, pellucida, flavescens: punctis ex fusco ferrugineis, dorso plano, ad margines fusco punctato, serie media longitudinali punctorum caeruleorum, cauda compressa, dorso in carinam rotundatam repandam margine fuscescentem anterius utrinque vittis ramosis parvis conspicuam elevato, abdomine caeruleo-punctato, utriusque lateris medio serie papillarum 5 albarum aspero, tentaculis primis minoribus obovatis, reliquis contiguis margine denticulato repandis.*

295. CLIO. *Corpus* vaginatum natans oblongum, brachiis duobus dilatatis membranaceis.
*Tentacula* tria præter duo in ore.

caudata. 1. Cl. vagina compressa caudata.
*Brown. jam.* 386.
*Habitat in* Oceano.

pyramidata. 2. Cl. vagina triquetra pyramidata, ore obliquè truncato.
*Brown. jam.* 386. *t.* 43. *f.* 1.
*Habitat in* Oceano.

retusa. 3. Cl. bitentaculata, ore horizontali bidentato, cauda acuminata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 334. *n.* 324. *nov. act. Havn.* 1.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1094. *n.* 3. *Mull. zool. dan. prodr.* 2742. Clio vagina triquetra, ore horizontali.
*Brown. jam.* 386.
*Habitat in* Oceano, *sesquipollicem longa, gelatinosa, pellucida, in aqua caerulescens, utroque fine coccineo, medusarum fœcia, omni anni tempore obvia, brachiis s. alulis suis tanquam remis utens,*

*utens, anarhichae, cyclopteri, lari tridactyli frequens cibus, capite angustiore globoso, sulco longitudinali in 2 buccas diviso; os terminale labio utrinque instructum dentibus 3 aperto ore stellatis armatum, interiori apertura alia dentibus 4 minoribus cruciatis munita, tentaculis ad os 2 mollioribus;* thorax *fere globosus brachiis sive alis submembranaceis, gula fulva.*

borealis. 4. Cl. albida, capitis lobis papilla carnea acuminata terminatis, tentaculis tribus carnosis conicis ori appositis. *Pall. spic. zool.* 10. *p.* 28. *t.* 1. *f.* 18. 19.

*Habitat in* mari hyperboreo, *mollis, balaenarum, ut fertur, esca, cute scabriuscula, capite subdidymo, ore bilabiato, tentaculis duobus minutis intra os, appendicibus foliaceis prope caput subtus quaternis, cauda vacua, depressa, acuta; an distincta a retusa species?*

helicina. 5. Cl. nuda, corpore spirali. *Phipps it. bor. p.* 195. *Martens Spitsb. p.* 141. *t.* Q. *f.* e. Snail slime-fish.

*Habitat numerosissima in* Oceano boreali, *pisi magnitudine, alis ovatis, obtusis, expansis, corpore majoribus.*

limacina. 6. Cl. nuda, corpore obconico. *Phipps it. bor. p.* 195. *Mart. Spitsb. p.* 169. *t.* P. *f.* 5.

*Habitat numerosissima in* mari boreali; *an diversa a boreali? An hujus generis est vermis marinus, a de la* Martiniere *Journ. de phys.* 1787. *Nov. p.* 366. *descriptus & t.* 2. *f.* 15. 16. *delineatus?*

296. SEPIA. *Corpus* carnosum : vagina excipiente pectus, ad cujus basin tubus.
*Brachia* ( præter bina tentacula pedunculata in plerisque ) octo interius adiperfa cirris verrucosis.
*Os* inter brachia terminale, corneum.

octopus. 1. S. corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. *Muf. Ad. Fr.* 1. *p.* 94. * *Mull. zool. dan. prodr.* 2813. *Strœm. fondm.* 1. *p.* 204. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 351.
*Haffelq. act. Upf.* 1750. *p.* 33. Octopodia.
*Jonft. exang.* 5. *t.* 1. *f.* 1. *Seb. muf.* 3. *t.* 2. *f.* 1-6. *Koelreut. act. petrop.* 7. *p.* 321. *t.* 11. 12. Polypus.
*Rond. pifc.* 513. Polypus octopus.
*Bell. aq.* 330. *t.* 331.
*Habitat in* mari, *a* mediterraneo & rubro *ad* Groenlandiam *ufque*, *cibo ex fuo condimento, quod coctione addito nitro in rubrum vertitur appofito* Lifter. *aliquando firmiffime adhaerens corporibus, ut in humano inflammationem & dolores atroces excitet ; brachiis bafi quafi palmatis, verrucis feffilibus alternis in 2 feries digeftis, abdomine ovato, convexo molli, pinnis lateralibus nullis, aperto tantus effudit fplendor, ut remota vefpere candela totum palatium ardere videretur.* Bartholin. *act. Hafn.* 5. *obf.* 109.

officinalis. 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Muf. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *Fn. fuec.* 2106.
*Amoen. acad.* 1. *p.* 325. * Sepia.
*Seb. muf.* 3. *t.* 3. *f.* 1-4. Sepia.
*Gefn. aquat.* 851.
*Aldrov. exfang.* 44.
*Bellon. aquat.* 336.
*Rondel. aquat.* 1. *p.* 498.
*Olear. muf.* 97. *t.* 97.

*Ha-*

*Habitat in* Oceano, & mari mediterraneo, *pleuronectae limandae, balaenarum frequens praeda, a congris quoque eius brachia rosa, at, sicut lacertis caudam, renasci*, Plinius *refert. hist. mund. l. 9. c. 29. Huic, quemadmodum sequentibus, squama dorsalis ossea, os sepiae vulgo dicta, & atramentum, quo effuso hosti persequenti se occultat, quo literae pingi, alia tingi possunt.*

unguiculata. 6. S. corpore ecaudato, brachiis unguiculatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 174.
*Habitat in* mari pacifico, Chili *alluente, rarior, sapidissima, brachiis loco verrucarum unguiculis armatis in proprias vaginas retractilibus.*

hexapus. 7. S. corpore caudato quadri-vel quinque-articulato, brachiis sex. *Molin hist. nat. Chil. p.* 175.
*Habitat in* mari pacifico, Chili *alluente, circiter semipedalis, digiti indicis crassitie, capite dissormi brevissimo, brachiorum verrucis minimis, manum contrectantem per breve temporis spatium rigefaciens.*

media. 3. S. corpore depresso caudato ancipiti.
*Rondel. pisc.* 508. Loligo parva.
*Habitat in* Pelago, *officinali similis, at latera membrana acuta non longitudinali, sed ad dimidium modo affixa.*

Loligo. 4. S. corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiti-rhombea. *Fn. suec.* 2107. *Osb. it.* 66.
*Rondel. pisc.* 506. *Stroem. sondm.* 1. *p.* 173. Loligo.
*Bellon. aquat.* 339.
*Seb. mus.* 3. *t.* 4. *f.* 1-4. & *t.* 3. *f.* 5. 6.
*Olear. mus.* 44. *t.* 26. *f.* 2.
*Needh. microsc.* 1. *t.* 12.
*Monro struct. & physiol. pisc. n.* 12.

*Habitat in* pelago, *media quasi inter pisces & vermes, corde triplici, arteriis aorta & pulmonali valvula munitis, aqua infuscata effuso atramento, bilis specie, se abscondens, cauda tamen extra aquam exsiliente, onisci, cancris, medusis victitans, phocarum & monodontis praeda, ad 9 pollices longa. Hujus squama dorsalis ossea a* Seba *mus.* 3. *p.* 40. *t.* 16. *f.* 9. *nomine* Pennæ marinæ maximæ *delineata, & in Syst. nat.* X. *p.* 108. *n.* 230. *inter pinnas relata est.* Pinna (pennacea) pellucida pennam referens.

Sepiola. 5. S. corpore posterius alis duabus subrotundis. †
*Jonst. aquat. t.* 1. *f.* 8. Sepiola.
*Rondel. pisc.* 519.
*Habitat in* mari mediterraneo, *parva.*

tunicata. 8. S. corpore toto tunicæ nigræ pellucidæ incluso, posterius alis duabus semicinulatibus. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 174.
*Habitat in* mari pacifico, *regnum* Chilense *alluente, sapidissima, magna, ut* 150 *libras aequare interdum pondere feratur.*

## LUCERNARIA. *Corpus* gelatinosum, rugosum, ramosum.
*Os* inferum.

quadricornis. 1. L. corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 147. *n.* 72. *t.* 39. *f.* 1-6. *prodr.* 2754. *rar.* 1. *p.* 102. *Leske Naturg.* 1. *p.* 508. *t.* 10. *f.* 5.
*Habitat in* maris norwegici *fucis, hydris monoculisque minimis victitans, capite oculisque carens, asteriis affinis, fusca, pellucida, tetragona: angulis singulis in brachium exeuntibus, cujus singu-*

*guli rami fasciculo* 30-40 *tentaculorum terminantur, cauda media flexuosa in multas plicas compacta, basi incrassata, sensim attenuata, apice obtusa, tentaculorum instar extensili, & in omnes partes mobili, ore albo cinereo-striato quadridentato.*

phrygia. 2. L. corpore elongato papilloso, brachiis numerosis globiferis in hemisphæria deflexis, basi bysso fixa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 343. *n.* 333. *Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis profundo, locum vix, formam saepius mutans, hydris ferquam affinis, semipollicaris, rubicunda, globulis papillisque albidioribus, collo erecto crasso papillis innumeris exsertilibus obsito, ipso exsertili, brachiis tenuibus, brevibus, implicatis.*

Auricula. 3. L. lagenam referens, collo tereti, extremitate ampliori: fasciculis octonis tentaculorum cincta. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 341. *n.* 332. *Mull prodr. zool. dan.* 2817. Holothuria lagenam referens, tentaculis octonis fasciculatis.
*Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis profundo, ulvarum maximarum foliis pertinacissime adhaerens, raro locum mutans, onisci vicitans, ad sesquipollicem usque longa, nigra aut rubicunda, varius ex brunneo aurea nitens, lubrica, glaberrima, margine tuberculis* 8 *granulatis cincto, quae prolongata totidem fasciculas tentaculorum bo & ultra nigrorum apice albarum referunt, ore albo.*

297. MEDUSA. *Corpus* gelatinosum, orbiculatum, depressum.
*Os* subtus centrale.

* *corpore costata : costis ciliatis*, Bercæ *Mulleri*.

Infundibulum. 13. M. ovata, costis ciliatis novem. *Mull. prodr. zool. dan.* 2816. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 352.
*Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 111. *n.* 29.
*Syst. nat.* X. *p.* 660. Medusa Beroë.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 1. Volvox (Beroë) ovatus, angulis ciliatis novem.
*Baster opusc. subs.* 3. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 5. Medusa ovata.
*Brown. jam.* 384. *t.* 43. *f.* 2. Beroë.
*Mart. Spitsb. t.* p. *f.* h.
*Habitat in* mari septentrionali, rubro, mediterraneo.

Pileus. 14. M. globosa, costis octo cirrisque duobus ciliatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2817. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 354.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1325. *n.* 2. Volvox (bicaudatus) octagonus, tentaculis duobus elongatis.
*Gron. act. helv.* 3. *p.* 36. Beroë corpore octagono tentaculis longissimis.
*Bast. opusc. subs.* 3. *p.* 126. *t.* 14. *f.* 6. 7.
*Mart. Spitzb. t.* p. *f.* g.
*Habitat in* mari septentrionali.

Cu-

Medusa *cyclopterorum aliorumque piscium majorum aviumque pelagicarum cibus, noctu vagatur; vis pruritus (scriptus) mordax; contrahit se rigens; ac præternatante pisciculo frondem suam spargit, complectensque devorat; ora ei in radice esse, excrementa per summa reddi Plin.* IX. 45. *marginem alternatim contrahendo & expandendo progrediuntur; aquæ fluviali immissæ cito pereunt.*

Cucumis. 15. M. oblonga, costis octo ciliatis, cirris nullis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 361. *n.* 353.
*Habitat in* mari Groenlandiam *alluente, minus vivida, cilia costarum movendo tarde ingrediens, tacta in pomi figuram se contrahens, caeruleo intermisto alba, punctis multis sanguineis conspersa, aperturis 2 terminalibus in cavitatem mediam oblongam coeuntibus.*

Ovum. 16. M. ovata, costis ciliatis octo, cirrorumque duobus paribus: altero longissimo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 362. *n.* 355.
*Habitat in* Groenlandiæ *sinubus, pileo affinis, ovi columbini, rarius anatini magnitudine oviscis victitans, cyclopteri lumpi frequens praeda, satis vivida fragilissima: fragmentis adhuc vivis, caerulea.*

** *corpore laevi.*

Porpita. 1. M. supra plana subtus convexiuscula sulcata villosa. *Amoen. acad.* 4. *p.* 255. *t.* 3. *f.* 7-9.
*Mus. Tessin.* 96. Medusa parva figura porpitæ.
*Act. angl.* 301. *p.* 2051. Animalcula ex Yvica maris mediterranei.
*Habitat in* India.

cruciata. 2. M. cruce alba. *Fn. suec.* 2110. *
*Habitat in* Oceano europæo.

hysocella. 3. M. convexa sedecimradiata: subtus tentaculis quatuor unitis. *Bast. op. subs.* 2. *p.* 62. *t.* 7. *f.* 5?
*Habitat in* Lusitaniæ Tago, *supra albescens, radiis ex punctis minimis e fusco rufescentibus, subtus concava, tentaculis corpore longioribus lanceolatis rufescenti striatis.* Vandelli.

æquorea. 4. M. planiuscula, margine inflexo villoso tenta-

cu-

culato. *Mull. prodr. zool. dan.* 2819. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 110. *n.* 28.

*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 364. *n.* 357. Meduſa orbicularis planiuſcula, margine inflexo ciliato.

*Baſt. opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 55. *t.* 5. *f.* 2. 3.

*Habitat in* pelago, *ſimpliciſſima, mollis, marginis ciliis albis.*

aurita. 5. M. cavitatibus ſubtus quatuor. *Fn. ſuec.* 2109.* *It. oel.* 160. *It. wgoth.* 172. *t.* 3. *f.* 2. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 76. 77. *rar.* 2. *p.* 109. *prodr.* 2820. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 363. *n.* 356.

*Rondel. poiſſ. l.* 17. *p.* 384. Sixieme eſpece d'ortie.

*Aldrov. zooph. l.* 4. *p.* 574. *f. inf.* Urtica ſexta.

*Kalm. it.* II. *p.* 109.

*Loeſt. it.* 105.

*Baſt. opuſc. ſubſ.* 1. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 3. 4. & 2. *p.* 58-60.

*Merret pin. p.* 197. *t.* 76. 77.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 172. *n.* 2.

*Habitat in* mari balthico, Oceano, *hemiſphaerica, hyalina* 2-4 *pollicum diametro, piſciculis, & ſcorpiorum praeſertim pullis victitans, cavitatum corporisque marginibus ciliatis flavis.*

capillata. 6. M. convexa, margine ſedecies emarginato, ſubtus piloſa. *Fn. ſuec.* 2108. * *It. wgoth.* 172. *t.* 3. *f.* 3. *Mull. prodr. zool. dan.* 2821. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 364. *n.* 358.

*Baſter op. ſubſ.* 2. *p.* 60. *t.* 5. *f.* 1.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 172. *n.* 1.

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *congenerum maxima, diametri* 8 *pollicum, ut cyprini minuti ab aliis piſcibus agitati ſub hac aſylum reperiant, oniſcis victitans, marginis lobos flectendo progrediens, intus purpurea, ſupra laevis, cu-*

*cute tenuiſſima, annexis veſiculis materiem purpuream (an ova?) continentibus aucta.*

pilearis. 7. M. diſco capitato, limbo foraminibus octo, ſubtus forniculato piloſa.
*Habitat in* Pelago.

marſupialis. 8. M. ſemiovata, margine tentaculis quatuor. *Planc. conch. rar.* 41. *t.* 4. *f.* 5. Urtica ſollata marſupium referens.
*Habitat in* mari mediterraneo.

hemiſphærica. 9. M. hemiſphærica, coſtis tranſverſalibus quatuor, tentaculis globoſisque marginalibus, margine integro. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 22. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 1-5. *prodr.* 2822. *rar.* 1. *p.* 13. *Gronov. act. helv.* 4. *p.* 38. *t.* 4. *f.* 7.
*Habitat in* Oceano belgico & norwegico, *hyalina, diametro* 2 *lineas aequans, marginem alternatim contrahendo & expandendo progrediens.*

pelagica. 10. M. hemiſphærico-concava, margine crenato-incurvato, tentaculis octo. *Loeſl. it.* 105. †

noctiluca. β Meduſa depreſſa, verrucis punctisque brunneis, marginis tentaculis octo rubris. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 109. *n.* 24.
*Habitat in* mari americano, atlantico, mediterraneo, *gregaria, magnisque ſaepe in glomeribus obvia, mare irradians, &) hyalino rufeſcens, rarius ſubpuca punicea, diametro tripollicari, in aqua marina concuſſa mirifice ſcintillans.*

branchiata. 11. M. margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. †
*Habitat in* pelago.

Velella. 12. M. ovalis concentrice ſtriata, margine ciliato, ſupra velo membranaceo.

*Loeſl.*

*Loefl. it.* 104. Medusa Velella s. Galera.

*Brown. jam.* 387. *t.* 48. *f.* 1. Pyllidoce labris cæruleis.

*Imperat. nat.* 912. *t.* 912. Velum marinum cotocis cæruleï.

*Col. ecphr.* 20. *t.* 22. Urtica marina soluta.

*Habitat in* pelago, mari mediterraneo, atlantico, *centro prominulo, supra linea oblique transversa, supra etiam membrana lineam dorsalem inferiorem secans, rigidula, latitudine corporis.*

Pulmo. 17. M. hemisphærico-concava, margine fimbriato, subtus striata, caudice quadri-fenestrato, brachiis octo. *Macri observ. del polm. mar. Nap.* 1778. *t.* 1.

*Habitat in* mari tyrrheno, *hyalina dura, tenax, nitida, caeruleſcens brachiis magnis, aequalibus, subcylindricis, posterius crispis, in corpore magno oblonga, crassa, laevia, tandemque in plana lata membranacea acuta terminatis, appendicibus 16 subtrigonis, anterius bifidis, rescissa membra reintegrans.*

tyrrhena. 18. M. convexa, margine crenato: filis longissimis, subtus tentaculis quatuor. *Macri observ. del polm, mar. p.* 19.

*Habitat in* mari tyrrheno, *laevis, tenera, hyalina, rubro maculata, 2 unicas pondere aequans, cavitatibus subtus 4, singulis stria rubra notatis; an varietas auritae?*

tuberculata. 19. M. disco prominulo, margine octies diviso subtus-striata, tuberculis octo. *Macri observ. del polm. mar. p.* 20.

*Habitat in* mari tyrrheno, *hyalina, 2 libras pondere aequans, subtus fulca fibris innumeris curvis, tuberibus ex alb. caeruleis in duos truncos membrana pellucida, albicante apice flaccida cas-*

ru-

*rulea aut lactea terminatos abeuntibus, pruritum contrectata nullum excitans.*

Utriculus. 20. utricolosa, subtus centri tentaculo longissimo granuloso, margine tentaculis numerosis cæruleis apice flavicantibus. *de la Martiniere Journ. de phys. Nov.* 1787. *p.* 365. *t.* 2. *f.* 13. 14.

*Habitat in* pelago, *hyalina, marginis cirris circiter* 30.

Caravella. 21. M. ovata, subtus medio tentaculis longissimis, supra velo crenulato. *Mull. Besch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 190. *t.* 9. *f.* 2.

*Sloan. jam.* 1. *p.* 7. *t.* 4. 5. Urtica marina soluta purpurea oblonga, cirris longissimis.

*Brown. jam. p.* 287. Aretusa crista subrubella venosa.

*Habitat in* mari atlantico, *pituita sua contrectantis manus inflammans, tenuis, laevis, nitens, caerulescens, hyalina utrinque attenuata, crista per totam dorsi longitudinem excurrente, semilunata, compressa, sulcis ramossis exarata, venis roseis picta, filis subtus cubitalibus articulatis, caeruleis, fragilibus: tubulis brevioribus intermistis.*

Umbella. 22. M. tentaculis disci nudis, marginis glandulosis. *Mull. Besch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 295. *t.* 9. *f.* 2. 3.

*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *rigida, depressa, supra sulcis radiatis, limbo membranaceo crenato, subtus in medio proboscide quasi clavata, tubulis brevibus clavatis cincta, tentaculis articulatis aequalis diametri, trifariam nodulosis.*

di-

*An hujus etiam generis* Medusa pallida. *Bohatsch t.* 11. *f.* 1. *Stroem sundm.* 1. *p.* 16[illegible]. *Palamarum* [illegible]; *plures etiam in maribus australibus viderunt species* Solandri & *uterque* Forsterus, *ut videtur novas, nondum, quantum novi, amplius descriptas.*

dimorpha. 23. M. dorso eminente, subtus cruce minuta foraminibus quinque cincta, margine ciliato. *Mull. zool. dan. prodr.* 2823. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 365. *n.* 359.

*Habitat in* mari, *potissimum* septentrionali, *aequorea paulo minor, expansa orbicularis, margine inflexo quadrata, dorso per radios sulcatos in 4 areas diviso, cruce centrali elata ciliisque albis, subtus concava.*

Campanula. 24. M. disco gibbo, limbo ampliato ciliato, subtus cruce pilosa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 360.

*Habitat in* Groenlandiae *sinubus, autumno haud infrequens, oniscos praedans, capillatae instar incedens, dimorphae magnitudine, conico-orbicularis, marginis crucisque ciliis flavis, his interdum albis, subtus cava, nivea.*

Digitala. 25. M. hyalina subtus centro pistillifero, margine ciliato. *Mull. prodr. zool. dan.* 2824. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 361.

*Habitat in* mari Groenlandiam *alluente, saltu vivida, margine flexo in aquam saliens, minima, conica, striata, ciliis introrsum hamatis flavis albisque, pistillo in penicillum nunc flavum, nunc albam terminato.*

frondosa. 26. M. disci margine maculis guttisque opacis albis vario, tentaculis octo dichotomis verrucis albis pedunculatis obsessis infloccos terminatis. *Pall. spicil. zool.* 10. *p.* 29. *t.* 2. *f.* 1-3.

*Habitat in* archipelago caribaeo, *volam implens, planiuscula, supra convexior, limbo membranaceo fasciolis albis fimbriato, nucleo subtus villoso, minoribus octogono, majoribus decagono.*

octopus. 27. M. marginis papillis semicircularibus, subtus cru-

cruce media, tentaculis octo, & foraminibus lunulatis intermediis. *Borl. corn. p.* 256. *t.* 23. *f.* 16. 17.

ε) Urtica marina ex trunco octopedali [illegible] imbricatim undante. *Boriaſ. cornw. p.* 257. *t.* 75. *f.* 15.

*Habitat in* Cornubiæ *littore & mari* Belgicum *inter & Angliam intermedio, magna, hyalina, interdum viresceſcens, appendicibus ſubtus* 8, *quarum* 4 *ſcutiformes*, 4 *cordatae*, *ſulco intermedio, marginis papillis apice caeruleis.*

tetraſtyla. 28. M. hemiſphærica, tentaculis nullis, tubulis marginalibus quatuor in priſma coadunatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 106. *n.* 17.

*Habitat in* mari rubro, *hyalina, rigidiuſcula, diametri ſeſquiſphithamalis, marginis tubulis linearibus, tripolicaribus rectis, planis.*

octoſtyla. 29. M. hemiſphærica, marginis tentaculis nullis, ſubtus columna quadriplicata: apice lobis octo multifidis, lateribusque appendicibus ſedecim. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 100. *n.* 18.

*Habitat in* mari rubro, *hyalino-caeruleſcens, diametri pedalis, columna ſubtus ſeſquipollicaris.*

Andromeda. 30. M. hemiſphærica, marginis brachiis nullis, brachiis octo teretibus ramoſiſſimis interius foliaceis. *Forsk. Fn. arab. p.* 107. *n.* 19.

*Habitat copioſa in fundo littoris* maris rubri *prope* Tor, *pulcerrima, ex hyalino fuſca, radiis albis margine integerrima, centri cruce nigra, obſoleta, brachiis albis ad baſin penna anſerina craſſioribus.*

Corona. 31. M. hemiſphærica, marginis tentaculis nullis, ſubtus brachiis octo cultratis, infra utrinque dentatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 20.

*Ha-*

*Habitat in* mari rubro *ad* Saez *ex hyalino rufescens, diametri quadripollicaris, centri cruce caerulea, brachiis subtus latis apice bilobis.*

Persea. 32. M. hemisphærica hyalina, intus annulo opaco albo quater interrupto, marginis tentaculis nullis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 21.
*Habitat in* mari mediterraneo, *diametri hipollicaris, margine longe prominente, brachiis* +, *sublanceolatis, fere pollicaribus, margine undulatis.*

Cephea. 33. M. hemisphærica tuberculata fusco-rufescens, margine crenato, brachiis subtus octo lanatis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 106. *n.* 22.
*Habitat* Djiddæ *ad littus* maris rubri, *pellucida, radiis octo pallidioribus, brachiis hyalinis fuscis.*

proboscidalis. 34. M. hemisphærica, subtus in medio proboscide longa, marginis tentaculis sex. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 108. *n.* 23.
*Habitat in* mari mediterraneo, *hyalina, diametri pollicum* 2½, *margine prominente aequali, proboscide subflexili apice truncata, membrana plicata versatili fimbriata.*

mollicina. 35. M. depressa, foraminibus lateralibus tentaculisque duodecim. *Forsk. fn. aeg. ar. p.* 109. *n.* 25.
*Habitat in* mari mediterraneo, *hyalina, diametri sesquipollicaris, marginis prominentis plicis* 12.

pileata. 36. M. ovato-campanulata superne globo hyalino, intus nucleo rubro oblongo, marginis tentaculis numerosis basi flavis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 26.
*Habitat in* mari mediterraneo, *sesquipollicem alta, margine parum coarctato.*

cru-

crucigera. 37. M. hemisphærica, cruce rufescente corporis latitudine. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 27.

*Habitat - - - - cerasi dimidii magnitudine, annulis supra 4 minutissimis albis approximatis, margine tenui prominente, varie flexili saepe rufescente, tentaculis innumeris hyalinis corporis semidiametro vix longioribus.*

unguiculata. 38. M. orbicularis supra plana sedecimradiata: margine crenato; unguibus sedecim subincurvis. *Ol. Swarts. n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 1.

*Habitat ad* Jamaicæ *littora, diaphana, caerulescens, maculata, nucis moschatae minoris magnitudine.*

PHYSSOPHORA. *Corpus* gelatinosum e vesicula aerea pendens, membris gelatinosis ad latera sessilibus, tentaculis subtus plurimis.

hydrostatica. 1. Ph. ovalis, vesiculis lateralibus trilobis plurimis extrorsum apertis, intestino medio tentaculisque quatuor majoribus rubris. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 119. *n.* 45.

*Habitat in* mari mediterraneo, *sesquipollicem longa, compressa vesiculae apice semper in aquae superficie conspicuo natans.*

rosacea. 2. Ph. orbicularis, foliolis oblongis horizontalibus vesicæ affixis imbricata. *Forsk. Fn. aeg. ar. p.* 120. *n.* 46.

*Ha-*

---

Physsophoræ *vix proprium constituere genus videntur, ad medusas foris referendæ. Asteriæ omnes supra macula alba, rugosa, lapidea notatæ, partes abscissas facile redintegrant, motu orbiculari jam dextrorsum jam sinistrorsum incedunt, dorso incumbentes radios flectunt, ut papillis fundo se affigant.*

*Habitat in* mari mediterraneo, *hyalina, pollicis diametro, flori pleno deorsum inclinato similis, vesica media obtusa ovata rufescente: foliolis planis, obtusis, curvis in denas series congestis tecta.*

filiformis. 3. Ph. membris lateralibus oblongis filiformibus dependentibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 120. *n.* 47.

*Habitat in* mari mediterraneo, *tenerrima, fili crassitie, ad spithamam usque longa, hyalina, capitulo ovato, obtuso, seminis oryzae magnitudine.*

298. ASTERIAS. *Corpus* depressum subtus sulcatum: crusta coriacea tentaculis muricata.
*Os* centrale quinquevalve.

* *lunatae.*

nobilis. 17. A. granulosa, margine pulvinato, disco pulvilli glabro.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2826. Asterias equestris.
*Pontopp. norsk. Naturg.* 2. *c.* 7. *p.* 291.
*Habitat in* mari Norwegico.

Pulvillus. 18. A. lubrica, margine integro mutico. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 64. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 1. 2. *prodr.* 2827. *rar.* 1. *p.* 40.
*Habitat rarior in* Norwegiae sinu Droebacensi *ad insulam* Kaholm, *supra convexa, cute laevi sanguinea, hinc inde transversim striata margine versus mucronibus mollibus obtusis, albis, seminis milii magnitudine, in* 10 *areas digestis obsoletas, margine non articulato, at in angulis papillis acutis* 10 *& ultra aspero, subtus concava, laevis, albida, roseo tincta, sulcis* 5 *utrinque baculis*

*lis horizontalibus tectis exarata, aquam calidam ſpadiceo colore tingens.*

militaris. 19. A. undique granuloſa, margine pulvinato conſimili. *Mull. zool. dan. prodr.* 2828.
*Habitat in* mari Norwegico.

Luna. 1. A. integra orbicularis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. *t.* 3. *f.* 14.
*Habitat in* India, *imperialis magnitude, compreſſa; punctis eminentibus undique adſperſa.*

** *ſtellatae.*

pappoſa. 2. A. muricata, marginali ſerie penicillata. *Mull. zool. dan. prodr.* 2832.
*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 369. *n.* 364.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1098. *n.* 2. Aſterias ſtellata, radiis XIII. undique muricata faſciculis.
*Retzius nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 4. Aſterias ſtellata, radiis tredecim, undique aculeata, aculeis ſubtus penicillatis ſupra pectinatis.
*Jonſt. inſ. t.* 26. *f.* 16. Stella marina.
*Pontopp. norsk. Naturl.* 2. *p.* 291. Soeſtierne.
*Olaff. isl.* 689.
*Linck aſt. t.* 32. *f.* 52. & *t.* 34. *f.* 54.
*Cluſ. exot.* 114.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 8. *f.* 5.
*Column. ecphr. t.* 38. *f.* A ?
β) *Linck ſtell. mar. t.* 17. *f.* 28.
*Habitat in* Oceano europæo & aſiatico, *ſupra ſubferruginea: diſco albo maculato radiisque pallidioribus apice coccineis & interſtitiis albidis, ſubtus alba, papillis pallidioribus, diſco rubro tincto, interſtitiisque radiorum caeruleſcentibus, diametro ad 3 pollices & 9 lineas aequante, radiis utplurimum 13, interdum 11, 12 & 15, lanceolatis, ſupra parum convexis.*

ſpongioſa. 20. A. ſcabriuſcula, radiis ſemicylindricis obtuſis, margine mutico. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 368. *n.* 363.

*Habitat rarior in profundo* maris Groenlandiam *alluentis inter ulvas rubenti affinis, diametro 7 linearum, pallide rubicunda, verruca minutiſſima dorſi centrali ſanguinea, aculeis minutiſſimis confertis decumbentibus aſpera, radiis 5: margine inflexo.*

rubens. 3. A. laxa, radiis convexis: ſuperne ſpinulis ſolitariis ſeriatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2830. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 367. *n.* 362.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1099. *n.* 3. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. *Fn. ſuec.* 2111. * Aſterias ſtellata, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.

*It. wgoth.* 172. Aſterias radiis quinis latiuſculis aſperis.

*Pet. muſ.* 6. *n.* 20. Aſteria.

*Barr. rar.* 130. *t.* 1288. Stella marina lacte rubens ſpinoſa.

*Linck ſtell. mar. t.* 7. *f.* 9. *t.* 9. 10. *f.* 19. *t.* 11. *f.* 15. *t.* 14. *f.* 23 *t.* 15. 16. *f.* 18. *t.* 30. *f.* 50. *t.* 34. *f.* 55. 58. *t.* 35. 36. *f.* 61. *t.* 37. *f.* 67. *t.* 40. *f.* 70. Stella marina.

*Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 116. *t.* 2. *f.* 1-4.

*Plot. axfordſh.* 85. *n.* 16. *t.* 2. *f.* 2. 3.

*Olear. muſ.* 55. *t.* 8. *f.* 4.

*Seb. muſ. t.* 5. *f.* 3. & *t.* 6. *f.* 3. 4.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 178. *n.* 1.

*Olaff. isl.* 1005. a.

*Jonſt. inſ.* 26. *f.* 5 ?

β) *Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 116. *t.* 12. *f.* 1-6.

*Column. aq.* 5. *t.* 6.

γ) *Linck ſtell. mar. t.* 38. *f.* 69.

*Habitat frequens in* Oceano, mari mediterraneo, *rarius pallida frequentius ſupra rufa, ſublutea, cinerea, nigra, rubra, violacea vel brunnea, ſub-*

*ſubtus rubicunda vel flavicans, diametro ad 9 pollices aequante, radiis lanceolatis, ſubtus quadrifariam papilloſis, frequentiſſime 5, rarius 6 aut 4, tuberculis nunc nullis, nunc raris, nunc ſparſis, nunc in ſeries digeſtis, aculeis nunc nullis, nunc ſetis ſubtilioribus, nunc validis.*

Sepoſita. 21. A. radiis quinque teretibus ſubtus reticulatis, ſupra aculeatis: aculeis pectinatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 2.
*Linck ſtell. mar. t.* 4. *f.* 5. *t.* 9. *f.* 16. *t.* 30. *f.* 62.
*Habitat ad* Scaniæ *littus, minuta.*

endeca. 22. A. radiis novem undique aculeatis: aculeis pectinatis. *Mant. p.* 543. *Retz. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 3.
*Mull. prodr. zool. dan.* 2855. Aſterias (aſpera) ſtellata aſpera, ſerie marginali pectinata.
*Linck ſtell. mar. t.* 14. *f.* 25. *t.* 15. 16. *f.* 26. *t.* 17. *f.* 27.
ε) *Rumpf muſ. t.* 15. *f.* F.
*Habitat in* mari ſeptentrionali, *radiis* 5, 8, 10, *utplurimum* 9.

minuta. 4. A. margine pinnulis porrectis diſtantibus.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2835. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 370. *n.* 395.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1099. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2112. *
Aſterias ſtellata obtuſa ciliata.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 5. *f.* 14. 15.
*Habitat frequens in* mari norwegico & Groenlandiam *alluente, ochroleuca, utrinque plana, diametri vix* $2\frac{1}{2}$ *linearum, radiis* 6.

glacialis. 5. A. radiis angulatis, angulis verrucoſo aculeatis.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 41. *rar.* 2. *p.* 3.
α) Aſterias radiata, radiis pentagonis: angulis verrucoſo-aculeatis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2838.

*Aldr. inf. p.* 749. Stella pectinata tertia ſpinoſa tuberculis plurimis.

*Linck ſtell. mar. p.* 33. *t.* 38. & 39. *f.* 69. Sol echinatus cancellatus.

*Linck ſtell. mar. p.* 34. Pentadactylos after echinatus tuberculoſus.

β) Afterias ſtellata, radiis heptagonis: angulis aculeatis.

*Syſt. nat.* XII. *p.* 1099. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2113.

*Habitat in* Oceano *ſeptentrionali, viva lacte ruſa albo undulata, rarius ex cinereo fuſca aut viridis, diſco ſupra tuberculis in circulum diſpoſitis aſpero, ſubtus cavo, radiis 5 craſſis lanceolatis, tentaculis innumeris pellucidis, utrinque ſerie pinnularum agilium ſtipatis.*

reticulata. 6. A. radiis reticulato-aculeatis.

*Muſ. Teſſ.* 114. *t.* 9. *f.* 1. Afterias radiata, centro dorſali nodis 5 circumvallata.

*Rondel. aq.* 122. Stella reticulata.

*Sloan. jam.* 2. *p.* 272. Stella marina maxima reticulata.

*Rumpf. muſ. t.* 15. *f.* D.

*Linck ſtell. mar. t.* 23. *f.* 36. & *t.* 41. *f.* 72.

*Seb. muſ.* 3. *t.* 7. *f.* 1.

*Habitat in* mari indico.

phrygiana. 23. A. ubique papillis ſubtus roſaceis obſita.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2829.

*Act. nidr.* 4. *p.* 424. *t.* 14. *f.* 1. 2.

*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 178. *n.* 2.

*Habitat in* mari norwegico; *an eadem cum reticulata?*

nodoſa. 7. A. radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis. *Muſ. Teſſin.* 114. *t.* 9. *f.* 2.

*Grew. muſ.* 123. *t.* 8. Stella marina coronalis.

*Rumpf muſ.* 39. *t.* 15. *f.* A. Stella marina quarta. *Lin-*

*Linck ſtell. mar. t.* 3 *f.* 3. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 40. *t.* 26. *f.* 41.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 5. *f.* 7. 8. *t.* 6. *f.* 1. 2. 11. 12 & *t.* 7. *f.* 3.
*Habitat in* Oceano indico.

violacea. 24. A. laxa, ſuperficie griſeo-fuſca: tuberculis violaceis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 46. *rar.* 2. *p.* 17. *Aldrov. inſ.* 7. *p.* 753. Stella reticulata noſtra. *Laid. apud Linck ſtell. mar. p.* 80. Echinaſtrum ſeu ſtella marina pentadactyla echinata. *Kade apud Linck ſtell. mar. p.* 97. *f.* 1-9. Stella marina quinque radiorum holſatica coloris violacei. *En. ſuec. p.* 512. Stella pentadactyla violacea.
*Habitat in* mari ſeptentrionali & mediterraneo, *jam tota ſuperficie, jam ſolis tuberculis violaceis, iisque nunc in ſeries diſpoſitis, nunc ſine ordine ſparſis, diſco orbiculari, radiis* 5 *lanceolatis, apice rubicundis, trifariam tuberculatis, ſubtus in ſulco luteſcentibus.*

ſanguinolenta. 25. A. ſupra ſanguinea, radiis apice albis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2836.
*Habitat in* mari Norwegico.

perforata. 26. A. mutica, dorſo punctis pertuſa. *Mull. zool. dan. prodr.* 2834.
*Habitat in* mari Norwegico.

aranciaca. 8. A. diſco lato, radiis ſubdepreſſis, ſummo margine aculeato. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 83. *f.* 1-3. *prodr.* 2031. *Act. nidr.* 4. *p.* 425. 426. *t.* 14. *f.* 3 6.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1100. *n.* 8. *Muſ. Lud. Ulr.* 719. *Muſ. Teſſ.* 114. *t.* 9. *f.* 3. Afterias ſtellata, diſco tentaculis hiſpidis muricato, margine articulato varie aculeato.

*Retz.*

*Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 5. Aſterias ſtellata, radiis quinque, ſubtus aculeis apice ſtellato-echinatis conſertis, margine articulato aculeato.
*Barr. ic.* 1281.
*Linck ſtell. mar. t.* 4. *f.* 14. *t.* 5. 6. *f.* 6. *t.* 8. *f.* 12. *t.* 27. *f.* 44.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 6. *f.* 5-8.
*Habitat in* mari mediterraneo & ſeptentrionali.

equeſtris. 9. A. diſco reticulato punctis pertuſo, tuberculis quinque, margine ſubarticulato, ſubtus ſimplici ſerie tentaculato.
*Bar. ic.* 1285.
*Linck ſtell. mar. t.* 6. *f.* 13. *t.* 12. *f.* 21. *t.* 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37. *t.* 24. *f.* 39. *t.* 27. *f.* 45. *t.* 33. *f.* 53.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 8. *f.* 6, 8.
*Habitat in* mari mediterraneo, *ſubtus etiam diſco gaudens.*

lævigata. 10. A. radiis ſemicylindricis obtuſe octogonis muticis.
*Rumpf. muſ. t.* 15. *f.* E.
*Grew. muſ. t.* 8. *f.* 1. 2.
*Linck ſtell. mar. t.* 28. *f.* 47.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *radiis tectis verrucis obſoletis, ad latera inter verrucas punctis excavatis, ſubtus verrucis in quincuncem diſpoſitis.*

membranacea. 27. A. pentagona utrinque tuberculis pectinato-aculeatis hiſpida, ſubtus coſtis quinque elevatis convexis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 6.
*Linck ſtell. mar. t.* 1. *f.* 2.
*Habitat in* mari mediterraneo.

gra-

granularis. 28. A. pentagona inermis utrinque teſſellato-granulata, margine articulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 231. *n.* 7.
*Linck ſtell. mar. t.* 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37 ? *t.* 24. *f.* 39 ? *t.* 27. *f.* 45.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 19. *t.* 92. *f.* 1-4.
*Habitat ad* inſulam S. Crucis.

*** *radiatae.*

roſea. 29. A. aſpera, granulis reticulata, radiis teretibus. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 67. *rar.* 2. *p.* 76. *prodr.* 2838.
*Seb. muſ.* 3. *p.* 13. *t.* 7. *f.* 5. Stella marina vulgaris batava.
*Habitat in* mari belgico & norwegico, *elegans, ſupra laete roſea, rarius aurantia, arcolarum punctis nigricantibus ſparſis, ſubtus albida: ſuturis dilatatis, tentaculorum ſerie quadruplici, pinnularum divergentium quintuplici, radiis ſummo apice albis.*

pertuſa. 30. A. ſcabra, radiis teretibus baſi anguſtatis gibbis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2839.
*Habitat in* mari Norwegico.

ophiura. 11. A. diſco ſquamoſo: ſquamula angulorum ſerrata. *Mull. zool. dan. prodr.* 2840. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 54. *t.* 2. *f.* 15. 16. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 371. *n.* 366.
*Syſt nat.* XII. 2. *p.* 1100. *n.* 11. Aſterias radiata radiis quinque ſimplicibus, ſtella orbiculata quinqueloba.
*Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 231. *n.* 8. Aſterias radiata, radiorum pectinibus appreſſis, diſco pentagono tunicato.
*Sloan. jam.* 2. *p.* 272. *t.* 244. *f.* 8. 9. Stella marina minor echinata purpurea.

*Planc.*

*Planc. conch. minot.* 38. *t.* 4. *f.* 4.
*Jonſt. inſ. t.* 26. *f.* 7.
*Stroem. ſondm.* 1. *p.* 179. *n.* 4. 5.
*Mart. Spitsb. t.* P. *f.* D.
*Linck ſtell. mar. t.* 11. *f.* 17.
*ε)* Aſterias radiis in morte diſſilientibus. *Olaff. isl. p.* 900.
*Habitat in* Oceano, *etiam maxime* ſeptentrionali, *inter minores hujus generis celerius incedit, rarior tota candida, ſed ſupra griſea, rubra vel violacea, aculeis* 4 *ſuperioribus cum apicibus ſtriisque tranſverſis aliis, glabra, radiis* 5 *corpore orbiculari quadruplo longioribus, quadrangularibus, gracilibus, flexuoſis, ſquamarum ſerie ſimplici obtectis, divergentibus, ſolidis: In hac acri ſpecie certis anni temporibus a mytilo eduli frequentius comeſta probabilis cauſa funeſtorum effectuum, quos hujus uſus aliquando excitat, latet. v. de Beunie act. Bruxell.* 1. *n.* 8.

aculeata. 12. A. aculeis glabris, latitudine radii breviori-bus. *Mull. zool. dan. prodr.* 2841.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1101. *n.* 12. Aſterias radiata, radiis quinque aculeatis.
*Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 232. *n.* 10. Aſterias radiata, radiorum pectinibus divergentibus, diſco orbiculato ſquamato muricato.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 29. *t.* 99. *f.* 1-3. *prodr.* 2841.
*Linck ſtell. mar. t.* 26. *f.* 42. *t.* 40. *f.* 71.
*Habitat in* Oceano, *colore ſummopere varians, orbicularis, ſubtus ſquamis minutis obtecta, quarum ſex corollam referunt.*

ciliaris. 13. A. ſpinis aſperis latitudine radii longioribus. *Mull. zool. dan. prodr.* 2842.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1101. *n.* 12. Aſterias radiata imbricata: radiis utrinque ciliatis.

*Retz.*

*Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 232. *n.* 9? Aſterias ( ciliata ) radiata , radiorum pectinibus patulis , diſco ſquamato laevi ſquamato.

*Barr. rar.* 131. *t.* 1295. *f.* 1. Stella marina minor ophiocnemos ſ. ophiurus.

*Linck ſtell. mar. t.* 34. *f.* 56. *t.* 37. *f.* 65. *t.* 40. *f.* 71.

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali , auſtraliori & indico.

filiformis. 31. A. diſco ſquamoſo , aculeis latitudine radii æqualibus. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 59. *rar. p.* 55. *prodr.* 2843.

*Habitat in* Norwegiæ *fundo argillaceo maritimo , gracillima , radiis flexuoſis fragilibus aliis corporibus abhaerens , orbicularis ſupra ex rufo fuſca margine nigricans , ſubtus nigra , quinqueloba , ſacculorum rubrorum ſerie ad baſin radiorum poſita ; hi* 5 *, ex luteo fuſci in fili tenuitatem abeuntes , diſco decuplo longiores , articulis ſingulis aculeis* 5 *punctо nigro & linea rubra notatis , & tentaculis* 2 *lateralibus inſtructis.*

tenella. 32. A. radiis duplicatis : ſuperioribus quinque bifidis pectinatis , inferioribus filiformibus : geniculis incraſſatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 233. *n.* 11.

*Habitat in* mari *inſulam* S. Crucis *alluente , pectinata multo minor , alba , caudice radiorum longiore.*

pectinata. 14. A. radiis duplicatis : ſuperioribus quinque bifidis pectinatis : inferioribus filiformibus paucioribus : geniculis æqualibus , diſco ſupra lævi. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 12. *Syſt. nat.* XI. 2. *p.* 1101. *n.* 14. *Amoen acad.* 4. *p.* 256. Aſterias radiata , radiis duplicatis : ſuperioribus pinnatis , inferioribus filiformibus.

*Barr.*

*Barr. rar. t.* 1282. *f.* 1. Stella marina decanemos fimbriata.
*Column. phytob.* 109. *t.* 29. Stella marina altera.
*Pet. gaz. t.* 4. *f.* 6. Stella chinenſis perelegans dupliciter radiata.
*Linck ſtell. mar. t.* 37. *f.* 64. 66.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 9. *f.* 3. 4.
*Habitat in* mari indico, *laevis, radiorum caudice vix conſpicuo.*

multiradiata. 15. A. radiis duplicatis: ſuperioribus decem palmato-ſubquadrifidis pectinatis; inferioribus filiformibus pluribus, diſco granulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 13.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1101. *n.* 15. Aſterias radiata, radiis palmato-multiplicatis pinnatis; inferioribus filiformibus.
*Linck. ſtell. mar. t.* 21. *f.* 33. *t.* 22. *f.* 34.
*Habitat in* mari indico.

Caput Meduſæ. 16. A. radiis dichotomis, diſco radiisque granulatis, ore depreſſo. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 34.
*Mull. zool. dan prodr.* 2844. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 367. Aſterias radiata, radiis duplicatis dichotomis.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1101. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 2114. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. Aſterias radiata radiis dichotomis.
*Jonſt. inſ. t.* 26. *f.* 11. Stella marina.
*Pontopp. norſk. Naturh.* 2. *p.* 292. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 179. *n.* 6. Soe-Soel.
*Mertens Spitsb. t.* P. *f.* E.
*Linck ſtell. mar. t.* 18. *f.* 29. *t.* 19. *f.* 30. *t.* 20. *f.* 32.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 1.
*Knorr. delic. nat. ſel. t.* G.
*Thunb. nov. act. Stock.* 1783. *p.* 236.

*Ha-*

*Habitat in* mari norwegico, mediterraneo, indico, æthiopico, ad caput bonæ ſpei, *viridis aut rufa.*

Eurya-le. 33. A. radiis dichotomis, diſco papilloſo radiisque glanulatis, ore ſubelevato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 235. *n.* 15.
*Linck ſtell. mar. t.* 29. *f.* 48. *t.* 30. *f.* 49.
*Rumpf muſ.* 41. *t.* 16.
*Habitat ad* caput bonæ ſpei, *fulva.*

oligæ-tes. 34. A. radiis longiſſimis ſimplicibus: articulis ſingulis baſi ſtilis binis mobilibus acutis. *Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 239. *t.* 6. *f.* 23. A. B.
*Habitat ad* Caratſino, *Gorgoniis adhaerens, pentagona, exigua, duriuſcula ochroleuca.*

nigra. 35. A. radiisque quinque articulatis ſuperne imbricatim ſquamatis: pectinibus lateralibus patulis diſco obtuſe pentagono granulato. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 20. *t.* 93. *f.* 1-4.

tricolor. 36. A. radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ſcabris, diſco hiſpido. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 97. *f.* 1-5.
*Habitat ad* inſulam Foeroe.

fragilis. 37. A. diſco orbiculato muricato, dorſo ſpinoſo, radiis quinque articulatis ad latera pecti atis: dentibus, ſerrato-muricatis. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 98. *f.* 1-3.
*Habitat in* mari norwegico & groenlandico.

299. ECHINUS. *Corpus* subrotundum, crusta ossea tectum, spinis mobilibus saepius asperа.

*Os* subtus, ( saepius ) quinquevolva.

* *ano verticali, tentaculis undique simplicibus*, Anocysti Kleinii.

† *hemisphaerici vel sphaeroidales*, Cidares Kleinii.

esculentus. 1. E. hemisphærico-globosus ambulacris denis, areis obsolete verrucosis. *Fn. suec.* 2116. *Mus. Lud. Ulr.* 705.

*Fn. suec.* 1. 1289. Echinus subglobosus vertice plano.

*Rondel. pisc. l.* 18. *c.* 32. *p.* 581. Echinometra.

*Aldrov. aq. p.* 405. 409. Echinometra.

*Planc. conch. min. not. p.* 20. Melo marinus.

*Gualt. ind. test. t.* 107. *f.* B. E. Echinometra spinis denudata.

*Phelsum Br. over* de Zee-egelen. *p.* 28. *n.* 21. eetbare Zee-egel.

*Klein echinoderm. ed Lesk. p.* 76. *t.* 38. *f.* 1. Cidaris miliaris.

*List. angl.* 69. *t.* 3. *f.* 13. Echinus marinus aculeorum vestigiis nonnihil eminentibus.

*Rumpf mus.* 31. *t.* 13. *f.* B. C. Echinus esculentus.

*Seb. mus.* 3. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 4. a. b. & *t.* 12. *f.* 1. 6. 8. 9.

*Davila catal. p.* 410. *n.* 926-928.

*Argenv. conchyl. p.* 307. *t.* 25. *f.* F.

De-

---

Echini, *multi esculenti, olim, petrefacti quoque, ad praecavendos & famosos morbos, nunc alii, nunc aliis partibus polioribus habitis commendati, et adhibiti maris omnes incolae, quod ad testam attinet, inter petrificata frequentissimi inter mollusca et testacea ambigui, nervis gaudent, cerebro carent. Ideam sculpturae distinctam formaturus computationem ejusdem instituat cum horto in areas sive pulvillos divisо, ambulacris distincto.*

*Delic. nat. Select. t.* D. *f.* 1. *t.* D. II. *f.* 1.

α) *Phelf. ov. de Zee-egel. p.* 28. *n.* 11. Bontgeringde Zee-egel met korte gruppels.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 14.

ε) *Phelſum. Zee-eg. p.* 28. *n.* 10. Bontgeringde Zee-egel met lange gruppels.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 6.

γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 28. *n.* 17. Kegelvormige Zee-egel.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.

δ) *Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 14. Tienſtraalige Zee-egel.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 9.

ε) Echinus albus. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 175.
*Habitat in* Oceano europæo & indico, mari mediterraneo, ζ) *in* pacifico *ruber, coccineus, flavescens vel ſpadiceus* η) *albus altitudinis interdum magis quam diadrantalis, verrucis ochroleucis, tuberculorum minorum circulo cinctis, ſpinis albidis, vel violaceis apice albis, ambulacris trifariam porosis, ano membrana coriacea ſpinulis hiſpida clauſo.*

Sphæra. 18. E. ſubſphæricus ruber, ſpinis ſubcæruleis.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2845.
*Pontopp. norsk. Naturh.* 2. *c.* 7. *p.* 275.
*Habitat in* Oceano norwegico, *utrum ſatis diſtincta ab eſculento ſpecies, an ſardicus?*

Droebachienſis. 19. E. hemiſphæricus pallidus, ſpinis longis pallidis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2846.
*Habitat in* Norwegiæ ſinu Droebachienſi.

miliaris. 20. E. hemiſphærico-depreſſus, ambulacris denis, areis bifariam verrucoſis.
*Klein echinod. ed. Leſk, p.* 82. *t.* 2. A. C. D. *t.* 31. A. D. *t.* 38. *f.* 2. 3. Cidaris miliaris ſaxatilis.

*Ron-*

*Rondel. aquat. p.* 578. *Geſn. aquat. p.*416. *Aldrov. exans. l.* 3. *p.* 402. Echinus ovarius.

*Phelſ. ov. Zee-egel. p.* 28. *n.* 23. 24. Frieſthe Zee-egel. & Klipegel platte.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2847. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 368. Echinus ( ſaxatilis ) hemiſphærico-depreſſus vel orbicularis , ſpinis diverſicoloribus.

*Sloan. jam.* 2. *p.* 268. *t.* 244. *f.* 1-3.

*Rumph. rar. nat. & art. p.* 97. *t.* V. *f.* 11.

*Gualt. teſt. t.* 107. *f.* G. H. I. L. N.

*Davila catal.* 1. *p.* 410. *n.* 928.

*Seb. muſ.* 3. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 1-4. 12. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 5-8. *p.* 25. *t.* 12. *f.* 1 ? 2. 7.

*Delic. nat. ſel.* 1. *p.* 94. *t.* D. II. *f.* 3. 4. 5. & *t.* D. III. *f.* 4.

Baſteri. ß) E. teſta depreſſa : tuberculis rarioribus , linea media arearum argute ſerrata , poris ambulacrorum in ſeriebus alternis trium & duorum foraminum poſitis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 87. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 49. *f.* 1. 2.

*Phelſum ov. de Zee-eg. p.* 18. *n.* 16. Zee-Klit.

*Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 112. *t.* 11. *f.* 2-8.

*Reaum. acĕ. par.* 1712. *p.* 177. *t.* 8.

*Gualt. teſt. t.* 107. *f.* A.

*Habitat frequens in* Oceano europæo , *teſta minore , vertice magis depreſſo , ambulacris anguſtioribus ab eſculento diſtinctus , nunc ex viridi cinereus , nunc ex olivaceo viridis , nunc ex violaceo ſubruber , areis majoribus tuberculorum minorum praeter interſperſa minima ſerie octuplici , minoribus majorum duplici minorumque ſimiliter duplici inaequalibus , ambulacris pororum duplicium ſerie triplici , ſpinis* 3-4 *lineas longis , ſtriatis , acutis vel obtuſis , albidis , violaceis , viridibus , vel ex olivaceo nigricantibus.*

hec

hemisphæricus. 21. E. hemisphærico depressus, ambulacris denis, arearum sutura media serrata lineisque transversis, ore pentagono: angulis obtusis. *Klein echinod. ad. Lesk p.*90. *t.* II. E. & *t.*XL. *f.* 7.
*Mus. Linck.* 1. *p.* 116. *n.* 43.
*Gualt. test. t.* 107. *f.* M.
*Delic. nat. sel. p.* 88. *t.* D. *f.* 6.
*Habitat* - - - *ex flavescenti ruber, ambulacris pallidioribus, basi ochroleuca, eminentiis majoribus minoribusque & granulis arearum poris interspitis asper; an varietas esculenti?*

angulosus. 22. E. hemisphærica, areis granulatis bifariam verrucosis, majoribus sutura media serrata bipartitis, ambulacris trifariam porosis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 92. *t.* 2. F. *t.* 42. *f.* 1.
*Phelf. Zee-eg. p.* 28. *n.* 15 Fyn wratje Zee-egel.
ε) Echinus minor ex cinereo viridescens. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 94. *t.* 3. A. B.
*Phelf. Zee-eg. p.* 29. *n.* 28. Klein Vyfhoek.
*Seb. mus.* 3. *t.* 10. *f* 20.
*Argenv. conch.* 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* H.
*Gualt. test. t.* 108. *f.* A.
*Delic. nat. sel.* 1. *p.* 88. *t.* D. *f.* 4. 5.
*Habitat* - - - *ex cinereo colore in violaceum vergens, diametro transversa* $2\frac{1}{2}$ *digitorum* ε) *duorum, areis granulorum seriebus, majoribus quidem decem, minoribus* 6; *verrucarum ordinibus ex* 30 *circiter conflatis, areis minoribus & ambulacris magis convexis & prominentibus, ambulacris potius ex lutescente cinereis: poris distantibus duplicibus.*

excavatus. 23. E. hemisphæricus, areis granulatis, omnibus bifariam verrucosis, ambulacris excavatis bifariam porosis. *Klein. echinod. ed. Lesk. p.*95. *t.* 44. *f.* 3. 4.

*Scill.*

*Scill. de corp. mar. petrif. t.* 22. *f.* 2. D.
*Habitat in calcareum mutatus ex flavo cinereum* Veronæ ; *an mera varietas miliaris ?*

Globulus. 2. E. hemiſphærico ſubgloboſus , ambulacris denis , areis latere muricatis , medio poroſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 706
*Habitat in* Oceano indico ; *an idem cum granulato?*

ſphæroides. 3. E. hemiſphærico-gibboſus , ambulacris denis undique muricatis medio poroſis.
*Habitat in* Oceano indico.

Gratilla. 4. E. hemiſphærico-gibboſus , ambulacris denis triplicatis , areis decuſſatim muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 707.
*Habitat in* Oceano indico.

Lixula. 5. E. hemiſphæricus ambulacris denis : paribus approximatis , areis transverſe punctatis muricatis. *Muſ. Ludw. Ulr.* 707.
*Habitat in* Oceano indico.

ſaxatilis. 6. E. hemiſpherico depreſſus , ambulacrorum poris arcuatis : arcubus in baſi obliquis , propius a vertice magis erectis.
*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1102. *n.* 6. *Muſ. Lud. Ulr.* 708. Echinus hemiſphærico-depreſſus , ambulacris denis : paribus approximatis , areis longitudinaliter verrucoſis.
*Rumpf amb. p.* 31. *t.* 14. *f.* A. Echinus ſaxatilis
*Klein echinod. ed. Leſk. p.* 111. *t.* 5. & 30. A. B. Cidaris rupeſtris.
*Planc. conch. min. not. p.* 21. Secundum echinorum genus.
*Delic. nat. ſel.* 1. *t.* D. 111. *f.* 6.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 11.
*β) Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 10. Echinometra muſcoſa *Klein* amboinenſis.

*Klein echinod. ed. Lesk. t. 39. f. 4.*

α) *Pheif. Zee-eg. p. 29. n. 1.* Byna ronde Egelmoeder.

*Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. f. c.*

β) *Pheif. Zee-eg. p. 29.* Breed band.

*Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. f. b.*

*Habitat in* mari mediterraneo, β) *in* indico, *mediae magnitudinis, ſubelliptica, altitudine dimidii digiti, ex violaceo cinerea, vel alba, verrucis mediae magnitudinis violaceis, ſubrubris, aut flaveſcentibus, areis verrucarum maximarum ſerie duplici, minoribus interjectis, ambulacrorum poris duplicibus: paribus 5 in ſeriem diſpoſitis, ore amplo, ano ſcutis ovato-acutis cincto, ſpinis rigidis brunneis apice violaceis.*

feneſtratus. 24. E. orbicularis, baſi plana feneſtrata, areis decem verrucis raris magnisque inæqualibus, ore decagono. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 107. t. 4. A. B. t. 39. f. 3.*

*Rumpf amb. p. 36?* Echini ſecunda ſpecies.

*Walch diluv. 2. p. 117. t. E. I. a. 1.*

*Habitat - - - albus, granulis per omnes areas & ambulacra inaequalis, in majoribus areis verrucarum papillas aequantium ſeriebus 6, ambulacris latis: pororum paribus 3, verſus verticem 2, ſpinis ex violaceo nigris, ano pentagono.*

ſubangularis. 25. E. hemiſphærico orbicularis, areis decem: minoribus elevatis, verrucarum in ſingulis ſeriebus decem. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 106. t. 3. C. D.*

*Seb. muſ. 3. t. 11. f. 5?*

*Habitat - - - ex cinereo virideſcens, pauliſper in brunneum vergens, baſi pulvinata, arearum tuberculis 4 vicinis rhombum mentientibus, ambulacrorum poris per 4-5 paria arcuatis.*

ovarius. 26. E. ovatus, areis majoribus bifariam verrucosis.

*Lang. hist. lap. fig. Helv. p.* 124. Echinus ovarius minor.

*Plot Oxfordsh. p.* 108. §. 85. *t.* 5. *f.* 6.

*Laid. lithoph. p.* 46. *n.* 934-949. *t.* 9. *f.* 940.

*Bourg. petrif. p.* 76. *n.* 340. *t.* 52. *f.* 340. 345. 346.

*Davil. catal.* 3. *p.* 177. *n.* 213.

*Habitat in* Anglia, Normandia, Helvetia *in lapidem conversus.*

Diadema. 7. E. hemisphærico-depressus, ambulacris quinis longitudinaliter verrucosis, areis lanceolatis.

*Mus. Lud. Ulr.* 709.

*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 14. 100. *t.* 37. *f.* 1. 2. *t.* 51. *g.* 1. *g.* 2.

*Rumpf mus. p.* 35. *t.* 13. *n.* 5. *t.* 14. *f.* B.

*Petiv. amboin. t.* 8. *f.* 5.

α) *Phelf. Zee-egel. p.* 29. *n.* 27. Cidaris fasciis tuberculatis.

γ) *Seb. mus.* 3. *t.* 11. *f.* 10. Echinus ex viridi flavus.

δ) *Phelf. Zee-eg. p.* 29. *n.* 39. Steekelpen.

*Seb. mus.* 3. *t.* 13. *f.* 9. Echinometra setosa fimbriis.

ε) *Davil. catal. p.* 412. *n.* 933. 935. 938. Cidaris nigrescens, spinis longis, Cidaris variolata rufo-cinerea, & Cidaris variolata americana.

*Seb. mus.* 3. *t.* 13. *f.* 5. Echinometra nigra americana.

ζ) Cidaris variolata. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 46. *f.* 1.

η) Echinus spinis nigris albo annulatis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 101.

*Habitat gregarius in* maris indici *arenosis, orbicularis, vertice depresso, testa vivi caerulea, aliis ex caeruleo cinerea, ore amplo, ano circulari cri-*

*rio pentagono cincto, areis 5 majoribus bifariam verrucosis; verrucis apice perforatis, pororum in ambulacrorum basi paribus 3, versus apicem 1, spinis minoribus violaceis & ex caeruleo cinereis.*

calamarius. 27. E. sphæroideo depressus, ambulacris quinis margine porosis nigris, medio granulatis: punctorum promiculorum majorum serie duplici.
*Pall. spicil. zool. 10. p. 31. t. 2. f. 4-7. Leske apud Klein echinod. p. 115. t. 45. f. 1-4.*
*Habitat in* mari indico, *ex albo virescens, setis verrucis minoribus insidentibus viridibus, fragillimis, spinis equiseti culmum simulantibus albidis viridi-annulatis, apice griseis.*

araneiformis. 28. E. orbicularis griseus, aculeis dilute griseis purpureo nitentibus medio crassioribus.
*Seb. mus. 3. t. 13. f. 6.* Echinometra multipes f. spinosissima americana.
*Phelf. Zee-egel. p. 29. n. 38.* Spinnekopf.
*Habitat in* mari americano.

stellatus. 29. E. spinis infimis capillaribus.
*Phelf. Zee-egel. p. 29. n. 37.* Kleine Komeet.
*Seb. mus. 3. t. 13. f. 7.* Echinometra purpurea americana.
*Pontopp. norsk. Naturh. p. 320.* Erinaceus marinus.
*Habitat in* mari americano.

radiatus. 30. E. ambulacris quinque radiatis apice bifurcis.
*Leske apud Klein echinod. p. 116. t. 44. f. 1.*
*Phelf. Zee-egel. p. 29. n. 36.* Groote Komeet.
*Seb. mus. 3. t. 14. f. 1. 2.* Echinanthus major spinis orbus.
*Habitat - - - ambulacris singulis radiis binis albicantibus terminatis, foraminibusque dilute rubellis pertusis.*



cir-

circinatus. 31. E. areis decem granulatis bifariam verrucosis, majoribus excavatis, minoribus elevatis, basi subpulvinata. *Leske apud Klein echinod. p.* 119. *t.* 45. *f.* 10.

*Rumpf amb.* 59. *f.* C. *p.* 336. Echinites, cui testa remansit, &c.

*Breyn. echin. p.* 55. Echinometra circinata.

*Phelf. Zee-egel. p.* 29. *n.* 30. Kransje.

*Davil. catal.* 3. *p.* 177. *n.* 214? Echinites eminentiis variolatis.

*Scill. corp. mar. t.* 25. *f.* 1?

*Habitat - - - hactenus non nisi inter lapides inventus.*

Cidaris. 8. E. hemisphærico-depressus, ambulacris quinis repandis linearibus, areis alternatim bifariis. *Fn. suec.* 2118. *Mus. Lud. Ulr. p.* 710.

*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 125. *t.* 7. Cidaris papillata.

α) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 126. *t.* 7. A *t.* 39. *f.* 1. 2. *t.* 51. *f.* h. 1. 2. Cidaris papillata major.

*Imper. hist. nat. p.* 784. Estrice marino.

*Shaw. it.* II. *p.* 74. Grand heriſſon de mer, &c.

*Seb. mus.* 3. *p.* 30. *t.* 13. *f.* 11. 12. Echinometra spinis orba, &c.

*Delic. nat. sel. t.* D. *f.* 2. *p.* 87. Groſer turkiſcher Bund.

*Phelf. Zee-egel. p.* 29. *n.* 32. 34. *t.* 3. *f.* 10. Groote Tulband & Vootangel.

β) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 127. *t.* 7. B. & 39. *f.* 3. Cidaris papillata minor.

*Aldrov. exang. p.* 403? Echinus cum spina adjuncta & spinis spoliatus.

*Rumpf. amb. p.* 33. *t.* 12. *f.* 3. 4. & *mus. Richter p.* 119. Echinometra digitata secunda vel rotunda.

*Phelf. Zee-egel. p.* 29. *n.* 31. 33. Schubmond & kleine Tulband.

Ar-

*Argenv. conch. p.* 310. *t.* 25. E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *p.* 30.
*Lelic. nat. ſel. t.* D. III. *f.* 5. *p.* 97.
γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 129. *t.* 41. *f.* 4. & *t.* 7. D. E. Cidaris papillata ſpinis fuſiformibus.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 8. Echinometra ex Indiis.
*Scill. corp. mar. t.* 22. *f.* 1-3. Echinus maris e ſiculo mari.
*Davil. catal.* 1. *p.* 415. *n.* 943-945. Turban maure.
*Valent. muſ.* 2. *p.* 177 ? Echinus marinus.
*Bonann. muſ. p.* 92. *f.* 17. 18.
*Breyn. echin. p.* 55. *t.* I. *f.* 1.
*Gualt. teſt. t.* 108. *f.* D. E.
*Petiv. amb. t.* 7. *f.* 2.
δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 134. *t.* 46. *f.* 2. 3. Cidaris papillata ſpinis claviculatis.
*Imper. hiſt. nat. p.* 671.
*Lang. lap. fig. t.* 36. *fig. med.*
*Deluc Naturf.* 8. *p.* 278. *t.* 8.
*Andreae Brief. aus der Schweiz. p.* 40. 267. *t.* 5. *f.* e. f. *t.* 14. *f.* d. & 4.
ε) *Mull. zool. dan. prodr.* 2848. Echinus ſpinis obtuſis.
*Pontopp. norsk. Naturh.* 2. *c.* 7. *p.* 278. ſ.
*Strøem. ſondm. p.* 175.
ζ) *Rumſf. amb. p.* 34. Echini ſiamenſes.
*Habitat in* Oceano, *utplurimum ex livido cinerea, baſi plana, areis majoribus & granulatis, verrucarum papillis apice perforatis alternarum & grannlorum circulo, ſaepius duplici cinctarum, & ſulco circumeunte diſtinctarum ſericeus duabus, minorum loco faſcia eminente inter ambulacra, ore ſatis amplo.*

mammillatus. 9. E. hemiſphaerico-ovalis, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis verrucoſis: anguſtio-

ri-

ribus abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 711.
*Klein echinod. ed. Leſk. p.* 121. *t.* 6. *t.* 34. *& t.* 39. *f.* 1. Cidaris mammillata.
*Rumpf. amb. p.* 32. *t.* 13. *f.* 1. 2. Echinometra digitata prima oblonga.
*Phelſ. Zee-egel. p.* 30. *n.* 8. Groote Wydbeck.
*Breyn. echin. p.* 56. *t.* 1. *f.* 5.
*Gualt. teſt. t.* 108. B. C.
*Argenv. conch. p.* 310. *t.* 25. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 17.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 7. Kleine Wydbeck.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. Karmoiſine Egel-moeder.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 1. 2.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 6. Hollebandt.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 3.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 12. Roſgeele Egel.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 4.
*Delic. nat. ſel.* 1, *t.* D. *f.* 3. *p.* 87. *& t.* D. III. *f.* 7. 8.
*Davil. catal. p.* 414. *n.* 939-941.
*Habitat in* maribus *magis meridionalibus*, *depreſſus ex flavo cinereus in fuſcescentem colorem vergens*, *ſubtus magis albidus*; *arearum decem pluripillis omnibus non perforatis*, *circulis elevatis cinctis*, *in majoribus* 16-18, *quarum mediae maximae*, *in minoribus* 14 *magnis*, *ambulacris pororum ad baſin paribus* 4-5, *ore amplo*, *ano rotundo*, 10 *ſquamis cinctis*, *quarum* 5 *perforatae*, *ſpinarum colore vario.*

Lucunter. 10. E. hemiſphærico-ovatus, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis: anguſtioribus longitudinalibus.
*Klein echinod. ed. Leſk. p.* 109. *t.* 4. C. D. Cidaris Lucunter. *Seb.*

---

*An huius ſpecies Echinus totus niger, ovatus, ambulacris quinis, areis muricatis verrucoſis, teſte Molina hiſt. nat. Chil. p.* 176. *ad littus Chilenſe obvius?*

*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 6. 16. & *t.* 11. *f.* 11.
*Breyn. echin. p.* 56. *t.* 1. *f.* 6.
*Gualt. teſt. t.* 107. *f.* C.
*Delic. nat. ſel.* 1. *p.* 89. *t.* D. I. *f.* 8.
*Davil. catal. p.* 412. *n.* 934.
ε) Cidaris Lucunter ambitu ſuborbiculari. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 4. *f.* E. F.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 33. *n.* 3. Smalband.
*Habitat in* Oceano indico, *magnitudine & colore varians, ex flavo cinereus, caeruleſcens vel nigreſcens, baſi pulvinata, ore amplo, verrucarum maximarum in ſingulis areis ordine duplici, paulo minorum in majoribus areis ſextuplici, in minoribus quintuplici, pororum in ambulacris verſus utrumque finem paribus* 4-5, *in medio* 6.

atratus. 11. E. hemiſphærico-ovalis depreſſiuſculus: ſpinis truncatis breviſſimis obtuſiſſimis: marginalibus clavatis depreſſis.
*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 117. *t.* 47. *f.* 1. 2. & 1. f. *t.* 44. aa. *t.* 54. *f.* 5. Cidaris violacea.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 9. Violette Egel-moeder.
*Argenv. conchyl.* 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* F. G.
*Davil. catal.* 1. *p.* 413. *n.* 936.
*Habitat in* India, *ambitu ſuborbicularis, cinereus, in violaceum vergens, areis decem ſubtiliſſime granulatis, majorum verrucis majoribus ſerie interdum octuplici, in quincunce poſitis, minorum ſerie duplici, ambulacris fuſcis, excavatis, granulatis, latis: pororum ſeriebus* 4, *ſpinis violaceis, aliis clavatis, aliis apice angulatis, aliis cylindricis.*

coronalis. 32. E. hemiſphærico-orbicularis, areis decem: alternis anguſtioribus; papillis ſparſis, ambulacris planis, ante verticis aream per paria confluentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 136. *t.* 8. A. B.

*Phelſ.*

*Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 5. Gierſt-korlige Zee-egel, & kranſwyze Geweloſiek.
*Geſn. petrif. c.* 12. *p.* 34. Echinites eminentiis per quinque ordines triangulares, &c.
*Luid. lithoph. brit. n.* 979-981.
*Morton Northampt. p.* 234. *t.* 10. *f.* 10.
*Lang. lap. fig. p.* 122. *t.* 35.
*Bourg. petrif. t.* 51. *f.* 334. 335.
ε) Cidaris corollaris tenuis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 138. *t.* 8. C.
*Geſn. petrif. c.* 12. *p.* 34. Ombria.
*Boet de Boodt gemm. p.* 486. Brontia ſ. Ombria.
*Dav. cat.* 3. *p.* 178. Turban à couralle.
*Meccat. muſ. metall. p.* 247.
*Hook Works p.* 284. *t.* 2. *f.* 2. 3.
*Plot ſtaffordsh. p.* 178-198. *t.* 13. *f.* 21.
*Liſt. lap. oxhl. p.* 120. *tit. & f.* 19.
*Luid. lith. brit. p.* 46. *n. & f.* 942. 943.
*Valent. muſ.* 2. *t.* 3. *f.* 8.
*Lang. lap. fig. p.* 124. *t.* 35.
*Bourguet petrif. p.* 76. *t.* 52. *f.* 345. 346.
*Scheuchz. oryctogr. p.* 317. *f.* 134.
*phyſ. ſacr. t.* 56. *f.* 65.
*Baier oryctogr. noric. t.* 3. *f.* 36.
ζ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 140. *t.* 45. *f.* 2.
*Rumff. amb. p.* 337. *t.* 59. *f.* E.
*Phelſum Zee-eg. p.* 27. *n.* 1.
η) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 141. *t.* 8. D. E. Cidaris corollaris craſſa.
*Habitat - - - frequenter in cretam & ſilicem converſus; an vera diſtincta ſpecies protypus?*

aſterizans. 33. E. orbicularis depreſſus, tuberculis ſulco ad apicem uſque exaratis & granulorum circulo cinctis.
*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 141. *t.* 8. F. *& t.* 46. *f.* 5.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 35. Sterre-wrat Zee-egel.

Ha-

*Habitat* - - - *inter lapides creta repletos, testa in spatum conversa; vix distincta species prolypus.*

assulatus. 34. E. testa scutellata: scutellis per futuras transversas nexis. *Klein echinod. p.* 15. §. 26.
ε) Cidaris testulata. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 16. §. 27.
*Habitat* - - - *vix vere distincta species.*

sardicus. 35. E. orbicularis depressus tuberculatus, ambulacris denis impressis, areis multifariam verrucosis: futura media impressa. *Leske apud Klein echinod. p.* 147. *t.* 9. A. B. *t.* 54. *f.* 4. 6.
*Phelf. Zee-eg. p.* 28. *n.* 18. Sardische Zee-egel.
*Planc. comm. Bonon.* V. 1. *p.* 236. *t.* 1. *f.* 4. 5. Echinometra magna, malo marinus.
*Bonann. recr.* 2. *p.* 92. *n.* 19. *f.* 19.
*Scill. corp. mar. t.* 13. *f.* 1. & *t.* 36. *f.* B.
*Habitat in* mari tyrrheno & adriatico, *magnus, ex cinereo flavescente ruber, basi fere plana magis flavescente, arearum majorum verrucis in* 8-12 *series digestis: interstitiis minoribus & minimis tuberculis obsitis, minorum verrucis minoribus in* 4-6 *series dispositis, parvarum in ambulacris paribus* 5, *arcuato ordine sitis, ore parvo decies sinuato.*

flammeus. 36. E. hemisphæricus depressus, arearum medio superiora versus verrucis vacuo, minoribus elevationibus ambulacris angustis, utrinque verrucarum serie cinctis. *Leske apud Klein echinod. p.* 148. *t.* 10. A.
*Phelf. Zee-eg. p.* 28. *n.* 13. Gevlamde Zee-egel.
*Habitat* - - - *ex olivaceo viridis, tuberculis & ambulacris basique albidioribus; arearum majorum latissima parte verrucarum seriebus* 12, *areis minoribus* 3 *asperis: singulis verrucis tuberculorum minorum circulo cinctis; ambulacris vix* 2

*li-*

*lineas latis : pororum paribus ternis granulis interſtinctis, ore parvo, ano ſquamis pentagonis cincto.*

variegatus. 37. E. orbicularis ſubangulosus, areis mediis roſeis utrinque late viridibus, ambulacris ex viridi albicantibus, baſi albida. *Leske apud Klein echinod. p.* 149. *t.* 10. B. C.

*Pbelſ. Zee-eg. p.* 28. *n.* 12. Buntgeflamte Zeegegel.

*Seb. muſ.* 3. *p.* 20. *t.* 10. *f.* 13.

*Gualt. teſt. t.* 107. *f.* F.

*Habitat - - - rarior, arearum majorum parte latiſſima verrucarum : granulis circumdatarum vertice ſtigiis 3-4 diſſita, areis minoribus paulo elevatioribus : verrucarum ſeriebus* 3, *pororum in ambulacris paribus* 3, *ore ſubrotundo leviſſime ſinuoſo.*

puſtulosus. 38. E. arearum majorum medio ſutura interſtincto : verrucarum ſeriebus tranſverſis plurimis medium verſus numero increſcentibus, areis minoribus elevatioribus. *Leske apud Klein echinod. p.* 150. *t.* 11. A. B. C. D.

*Pbelſ. Zee-eg. p.* 28. *n.* 7-9. Digtpniſtige, ylpuiſtige, & bynanaakte Zee-egel.

*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 8-10. 15.

*Habitat - - - ſix polticem altus, diametri bipollicaris, ex bruneo cinereus, in rubrum vergens, areis minoribus dilutioribus, baſi magis adulta verrucis rubellis, areis decem majorum aſſeclis aſpero, ſutura utrinque granulis minimis cincta, extimo utriuque verrucarum ordine ſolitarias verruca, altero duabus compoſito, ut in medio ſeriarium numerum aſſequatur, areis minoribus verrucarum ordinibus 2, quibus linea ſerrata, granula minima interjacent, pororum in ambulacris paribus 4-5, in lineis obliquis excurrentium, ore late ſinuoſo.*

gra-

granulatus. 39. E. suborbicularis subangulosus, arearum medio nudo sutura utrinque serrata distincto, verrucarum in majoribus utrinque ordinibus septem in minoribus quatuor. *Leske apud Klein p.* 150. *t.* 11. E. F.
*Phelf. Zee-eg. p.* 27. *n.* 4. Zand-korlige Zee-egel.
*Habitat - - - 1 pollicis altus, diametri sesquipollicaris, basi puivinata cum arearum majorum margine ex viridi cinereus, arearum majorum medio areisque minoribus obscure viridibus, pororum in ambulacris paribus 5 in triangulo sitis, ano circulari, ad marginem squamis 10, rosae instar expansis cincto.*

teffellatus. 40. E. areis decem sutura media divisis assulatis, ambulacris decem biporosis, ore circulari. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 153. *t.* 11. G.
*Phelf. Zee-eg. p.* 27. *n.* 2. Leyendak.
*Beschr. d. Merkw. Bafels. p.* 259. *t.* 22. G ?
*Habitat - - - hactenus modo inter lapides repertus.*

botryoides. 41. E. areis sutura media longitudinali bipartitis, majoribus bifariam verrucosis, pororum in ambulacris serie duplici arcuata. *Leske apud Klein echin. p.* 154. *t.* 11. H.
*Phelf. Zee-eg. p.* 27. *n.* 3. Geribde Zee-egel.
*Aldrov. mus. metall. p.* 457. Echinites laevis valde durus & lucidus, figuram mespili aemulans.
*Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus.*

toreumaticus. 42. E. hemisphaericus, areis decem bifariam verrucosis: verrucis crenatis granulorum circulo cinctis, areis majoribus sulcis longitudinalibus quatuor, minoribus duobus exaratis. *Leske apud Klein echin. p.* 155. *t.* 10. D. E. *t.* 44. *f.* 2.
*Phelf. Zee-eg. p.* 28. *n.* 6. Gegraveerd Zee-egel.
*Habitat - - - cinereus levissime vel caerulescens vel virescens, basi & ambulacris flavescentibus, am-*

*ambulacris biporosis : poris in linea argute serrata positis, basi pulvinata, ore parvo, ano squamis 10 cincto.*

†† *figura ad clypei figuram accedente*, Clypei Kleinii.

finuatus. 43. E. convexus, ambulacris striatis areisque decem, verrucis granulorum circulo cinctis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 157. *t.* 12.
*Plot oxfordsh. p.* 91. 92. *t.* 2. *f.* 9. 10. Polar stones.
*List. lap. cochl. p.* 224. *tit. & fig.* 27.
*Luid. lithoph. brit. p.* 48. *n.* 971.
*Mort. Northampt. p.* 233. *n.* 1.
*Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus, arearum una sinu excavato divisa, ambulacris latis margine utroque punctatis, basi parum excavata, & sulcis 5 divergentibus exarata, ore parvo pentagono.*

semiglobosus. 44. E. hemisphæricus sulcatus, basi plana, verrucis seriatis.
*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 158. *t.* 43. *f.* 1. Clypeus hemisphæricus.
*Lang. lap. fig. p.* 119. *t.* 34.
*Vollm. Sil. subt.* 1. *p.* 179. *t.* 30. *f.* 5.
*Bourg. petrif. t.* 52. *f.* 342.
*Habitat - - - hactenus tantum inter fossilia deprehensus ; an propria species protypus ?*

quinquelabiatus. 44. E. annulis innumeris pictus : media fossula, stellulam convexam cingente. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 41. *f.* 3.
*Phelf. Zee-eg. p.* 30. *n.* 2. Vyflip.
*Walk monum. diluv.* 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 4.
*Verf. der baſel. Merkw.* 22. *t.* 22. *f.* 1.
*Habitat - - - adhuc modo inter fossilia obvius.*

co-

conoideus. 45. E. subconicus ambitu elliptico, areis & ambulacris decem, his transverse sulcatis, & margine porosis, illis sutura excavata recta divisis.
*Leske apud Klein echinod. p. 159. t. 43. f. 2.*
*Hacquet Naturf. 11. p. 105.*
*Aldrov. mus. metall. p. 456.*
*Davil. catal. 3. p. 182. n. 225.*
*Habitat - - - hactenus tantum inter fossilia occurrens, basi plana, arearum verrucis creberrimis, granulorum circulo cinctis, basi plana sulcata; ano circulari.*

* *ano infero, tentaculis oris nullis*, Brissi Mulleri.
† *basi circulari, in cujus peripheria amus*, Fibulæ Kleinii.
ᵀ *in conum elevati*, Conuli Kleinii.

albogalerus. 46. E. areis tuberculis albis minimis dense obsitis ambulacrisque denis, his biporosis, areis majoribus sutura serrata nexis & transversim lineatis, minoribus foramine urticis terminatis.
*Leske apud Klein echinod. p. 162. t. 13. A. B.*
*Phelf. Zee-egel. p. 31. n. 15.* Egelsteen tienband rondtop.
*Aldrov. mus. metall. p. 455. f. 4.*
*Besl. gazoph. contin. t. 19.*
*Plot oxfordsh. §. 35. t. 2. f. 13.*
*Morton Northampt. p. 235. n. 1.*
*Luid. lithoph. brit. p. 47. n. 958. 959.*
*Lachm. oryctogr. Hildes. p. 23.*
*Lang. lap. fig. p. 125. t. 36. f. 1.*
*Mell. ech. suagr. p. 7. f. 6.*
*Breyn. ech. p. 57. t. 2. f. 1. 2.*
*Bourg. petrif. p. 77. t. 53. f. 361.*
*Davil. ontal. 3. p. 179. n. 220.*
*Habitat - - - hactenus solum inter fossilia inventus, subovalis, ore orbiculari parvo, ano ovato,*

de-

depressus. 47. E. arcis decem: majoribus futura media divisis, ambulacris decem biporosis, vertice depresso, ano orbiculari. *Leske apud Klein echinod. p.* 164. *t.* 40. *f.* 5. 6.
*Phil. Zee-eg. p.* 31. *n.* 16. Egelsteen tienband plattop.
*Walch diluv. monum* 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 6. 7.
*Mell. ech. Wagr. p.* 7. *t.* I. *f.* 2.
*Kundm. rar. nat. & art.* 5. *f.* 12.
*Naturl. Basel. Merkw.* 22. *t.* 22. *f.* H.
*Habitat - - - hactenus non nisi fossilis, oris mediocris foraminibus* 10 *acutis, ano magno ovato.*

vulgaris. 48. E. orbicularis, ambulacris decem: binis sibi semper vicinis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 165. *t.* 13. *f.* c-k. *t.* 14. *f.* a-k. *t.* 40. *f.* 2. 3.
*Walter. lyst. miner. p.* 507. Echiniti fibulares.
*Phil. Zee eg. p.* 31. *n.* 1-11.
*Walch diluv. monum* 2. *p.* 176. 177. *& suppl. p.* 217. *t.* E. I. *f.* 1. 2. *t.* E. I. a. *f.* 2. *t.* IX. d. *f.* 2. *t.* IX. g. *f.* 1.
*Aldrov. mus. met. p.* 455. *f.* 3. 6.
*Bocc. obs. nat. p.* 219. *fig. ad fin. tab.*
*Olear. mus. Gottorp. t.* 21. *f.* 5. 6,
*Best. gaz. ph. contin. t.* 19. Scolopendrites, Ovum anguinum.
*Mus. Calceol. p.* 353. Bufonites.
*Worm. mus. p.* 107. Bufonius lapis.
*Mert. Northumpt. p.* 235. *n.* 2. *t.* X. *f.* 11.
*List. lap. orbil. p.* 219. *tit. & f.* 18.
*Luid. lith. brit. p.* 46. *n.* 944-950. 957 ?
*Rumf. amboin. t.* 1. *f.* 6-9.
*Mercat. metall. p.* 246. *f.* 1-4.
*Mell. ech. Wagr. p.* 7. *t.* 1. *f.* 3. 4.
*Myl. memor. Saxon. p.* 45-47. *f.* 2. 4. 5. 9. 10.
*Vallem. Siles. subterr. p.* 179. *t.* 30. *f.* 6. E.
*Helw. lithogr. angerb.* 71. *t.* 8. *f.* 13.
*Breyn. echin. p.* 57. *t.* 2. *f.* 3. 4.

*Bytem.*

*Bytem. biblioth. app. t.* 23. *f.* 270.
*Brom. mineral. p.* 51.
*Schreb. lithogr. Hal. p.* 103. 1. *a.*
*Leyel. oryctogr. Hal.* 33.
*Gesn. petr. p.* 24.
*Davil. catal.* 3. *p.* 180. *n.* 220.
*Habitat* - - - *hactenus folummodo, sed frequentissime, fossilis, innumera priscinae nunc melius conservatae, nunc magis deletae formae varietate.*

quadrifasciatus. 49. E. ambulacris quaternis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 47. *f.* 3-5.
*Pfeif. Zoo-eg. p.* 30. 31. Vierbandige Egel-ſteen.
*Gehler chur. foſſil. extern. p.* 13. *f.* 1.
*Walch diluv. monum. ſuppl. p.* 218. 223. *t.* IX. d. *f.* 3. & *t.* IX. g. *f.* 7. 9.
*Habitat* - - - *hactenus non niſi foſſilis, ambitu nunc orbiculari, nunc propius ad ovalem accedente.*

ſexfasciatus. 50. E. ambulacris ſenis. *Leske apud Klein echinod. p.* 172. *t.* 50. *f.* 1. 2.
*Klein act. nat. Cur. Gedan.* 2. *p.* 292. *t.* 5. *f.* 14.
15. Echinus Terdorphii.
*Pfeif. Zoo-eg. p.* 31. *n.* 14. Zesband.
*Gehl. chur. et. foſſ. ext. p.* 13. *f.* 2.
*Walch diluv. mon. um. ſuppl. t.* IX. g. *f.* 4-6.
*Habitat* - - - *adhuc tantum foſſilis.*

†† *baſi exacte circulari*, Diſcoidei Kleinii.

Subuculus. 51. E. ambulacris biporoſis areisque decem, ore anoque parvis orbicularibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 171.
*Gesn. petrif. p.* 35. *n.* 6.
*Davil. catal.* 3. *p.* 180.
*a) Pfeif. Zoo-egel. t.* 37. Roofe-top Egelmuts.
*Klein echinod. ed. Leske. t.* 14. *f.* 1. m.

β) *Phelf. Zee-eg. p.* 37. Kreeft vagie Egelnaapje. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 14. *f.* n. o.
*Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis, areis circulis minimis obſeſſis, 5 majoribus, 5 minoribus, ambulacrorum poris ſubtiliſſimis denſe ſibi adjacentibus.*

+++ *baſi ovali*, Echinonei Phelfumii & Leskii.

cyclo-ſtomus. 52. E. oblongus ſubdepreſſus, verticis poris quinque, ore medio rotundo, ano oblongo vicino.
*Leske apud Klein echinod. p.* 173. *t.* 37. *f.* 4. 5.
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 18. *t.* 91. *f.* 5. 6. *prodr.* 2851. Spatagus puſillus.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 32. *n.* 11. Rond-mond.
*Bucc. obſ. nat. p.* 219.
*Rumpf amb. p.* 6. *t.* 14. *f.* D.
*Breyn. echin. p.* 57. *t.* 2. *f.* 5. 6.
*Seb. muſ.* 3. *p.* 36. *t.* 15. *f.* 30-33-35-37.
*Delic. nat. ſel. p.* 90. *t.* D. I. *f.* 11.
*Baier oryctogr. nor. t.* 3. *f.* 35.
*Habitat - - - cinereus, ſubflaveſcens, baſi ſubvirgata, areis* 10, *linea media argute ſerrata diviſis tuberculis minimis circulo incluſis obſitis, ambulacris* 10 *biporoſis, ad os uſque protenſis.*

ſemilunaris. 53. E. ano oblongo longitudinali, ore tranſverſo ſemilunari.
*Muſ. Telfin. p.* 114. *t.* 6. *f.* 2. Echinus ovalis.
*Leske ap. Klein echinod. p.* 174. *t.* 49. *f.* 8. 9 Echinoneus minor, ore ſemilunari.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 32. *n.* 2. Spleet-mond.
*Seb. muſ.* 3. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 7.
*Habitat in* mari aſiatico, *dilute ex cinereo flaveſcens.*

ſcuti-formis. 54. E. ore pentagono, ambulacris decem ſtriatis, areis

areis majoribus affulatis : affulis pentagonis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 174.
*Scill. corp. mar. t.* 11. *f.* 1. 2.
*Habitat* - - - *an hujus tribus ?*

†††† *basi ex ovali acuta, ano ori opposito*, Cassides Kleinii, Echinocoryes Leskii.

† *majores*, Galeæ Kleinii.

scutatus. 55. E. convexus subtus planus, areis tuberculatis alternatim majoribus : majoribus sutura media ferrata divisis, ore transverso reniformi. *Leske ap. Klein echinod. p.* 175.
*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 175. Galea vertice scutato.
*Phelf. Zee-egel. p.* 37. *n.* 1. Ocean-Egel, Vyfblad.
*Luid. lith. brit. p.* 46. *n.* 951-953.
*Scheuchz. muf. diluv. p.* 88. *n.* 851-854.
*Breyn. ech. p.* 58. *t.* 3. *f.* 1. 2.
*Abildg. Stevenskl. p.* 22. *t.* 2. *f.* 1-5.
*Davil. cetal.* 3. *p.* 179. *n.* 219.
α) *Phelf. Zee-eg. p.* 36. *n.* 2. Gestreepte Zont-egel. *Walch diluv. monum.* 2. *p.* 179. *n.* 4. *t.* E. I. a. *f.* 4.
*Leske apud Klein echinod. t.* 42. *f.* 4.
β) *Phelf. Zee-egel. p.* 37. Getaufelde Ocean-Egel. *Walch diluv. monum.* 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 3. 4.
*Leske apud Klein echinod. t.* 42. *f.* 2. 3.
*Habitat* - - - *hactenus modo fossilis, arearum tuberculis granulis minimis interspersis, ore tuberculis paulo majoribus triangulum formantibus cincto, ano subovato, basi marginem versus convexiusculo, plaga media eminentiore, utrinque fasciis duabus subtilissime granulatis cincta.*

ovatus. 56. E. ovatus affulatus : affulis hexagonis, verti-

ce nudo, ano subovali. *Leske apud Klein echinod. p.* 178. *t.* 53. *f.* 3.
*Aldrov. mus. met. p.* 455. *f.* 10.
*Grew. mus. p.* 255 ?
*Hook Works t.* 2. *f.* 4 ?
ε) *Leske apud Klein echinod. t.* 42. *f.* 5.
*Walch diluv. monum.* 2. *p.* 179. *t.* E. I. a. *f.* 5.
*Aldrov. mus. met. p.* 455. *f.* 3.
*Bertem. bibliath. app. t.* 23. *f.* 270.
γ) *Leske apud Klein echinod. p.* 143. *ic. tit. & t.* 8. *f.* G. Bronties favagineus.
*Worm. mus. p.* 77.
*Encel. re metall. c.* 47. *p.* 232.
*Olig. Jacob. mus. p.* 35.
*Walch diluv. monum.* 2. *p.* 177. *t.* E. a. *f.* 3.
*Habitat - - - adhuc modo inter fossilia repertus*, 20 *agularum* (*variorum* 7 *aut* 5 *generum*) *seriebus*, 10 *majoribus*, 10 *minoribus*, *omnibus structura serrata connexis*, *& similarium duabus vicinis*, *areis* 10 *majoribus*, 10 *minoribus*, *in singulis his* 2 *punctis impressis*, *ore rotundo minori*, *ano subovali.*

pustulosus. 57. E. areis obsoletis non tuberculatis, ambulacrorum punctis duobus per paria dispositis eminentibus, vertice impresso. *Leske apud Klein echinod. p.* 180. *t.* 16. A. B.
*Plot. oxfordsh.* §. 36. *t.* 2. *f.* 14.
*Mort. northampt. p.* 335. *t.* 10. *f.* 12.
*List. lap. cochl. p.* 225. *t.* 7. *f. & tit.* 29-31.
*Luid. lith. brit. p.* 47. *n.* 954.
*Grew. mus. p.* 259.
*Hook Works p.* 284. *t.* 3. *f.* 7.
*Hellw. lith. angerb. p.* 70. *t.* 8. *f.* 12.
*Mell. ech. wagr. t.* 1. *f.* 7. 8.
*Kundm. rar. nat. & art. p.* 95. *t.* 5. *f.* 8. 9.
*Schreb. lithogr. hal. p.* 41. γ.
*Frisch mus. Hoffm. p.* 33.

Hae

*Habitat* - - - *hactenus modo fossilis, figura & ambitu, ore anoque scutato similis.*

quadriradiatus. 58. E. punctorum ordinibus quatuor geminatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 182. *t.* 54. *f.* 1. *Müll. de lap. fig. Lubec. p.* 28. *t.* 2. *f.* 7. Echinites Niendorpiensis.
*Habitat* - - - *adhuc tantummodo fossilis.*

\+ + *minores*, Galeolæ Kleinii.

minor. 59. E. ovatus, basi plana vel concava, ambulacris biporosis arcisque decem, ore transverso subrotundo, ano subovali. *Leske apud Klein echinod. p.* 183.

papillosus. α) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 16. C. D. *Phelsum Zee-eg. p.* 36. *n.* 5. Knveftagtige Zont-egel.
*Klein. mus. met. p.* 455.

undosus. β) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 17. a. b. *Phelsum Zee-eg. p.* 36. *n.* 6. Gevlamde Zont-egel.
*Breyn. echin. p.* 58. *t.* 3. *f.* 3. 4.

lævis. γ) E. *Klein. echinod. ed. Lesk. t.* 17. c. d.
*Bromel. minor. p.* 50.
*Volkm. Siles. subt. t.* 30. *f.* 7.
*Habitat* - - - *hactenus solum inter fossilia deprehensus.*

dubius. 60. E. ovatus, ambulacris denis simpliciter porosis, ani dimidia parte marginali. *Leske apud Klein echinod. p.* 184. *t.* 44. *f.* 5.
*Habitat* - - - *hactenus non nisi fossilis inventus, areis 5 majoribus circulis impressis insignitis.*

††††† *basi irregulari, flore quasi pentapetalo in superficie expanso*, Scuta Kleinii, Echinanthi Leskii.

ᒣ *angulares peripheria per sinus angulosa.*

rosaceus. 14. E. planiusculus ovato subrotundus, ambulacris quinis ovalibus: superficie punctata. *Mus. Lud. Ulr.* 713.

*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 185. *t.* 17. A. Echinanthus humilis.

*Phels. Zee-egel. p.* 38. *n.* 4. Groot Egel-roozen Stomp-blad.

*Sloan. jam. t.* 242. *f.* 6-11.

*Rumpf. amb.* 36. *t.* 14. C.

*Petiv. amb. t.* 1. *f.* 10.

*Seb. mus.* 3. *t.* 11. *f.* 2. 3.

*Delic. nat. sel.* 1. *p.* 91. *t.* D. I. *f.* 12.

*Davil. cat.* 1. *p.* 421.

β) *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 19. A. B.

*Phels. Zee-eg. p.* 38. *n.* 5. Kleine Egel-roozen Stomp-blad.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 11. 12.

*Gualt. test.* 1. *t.* CX. A.

γ) *Phels. Zee-eg. p.* 34. Eeglkoeken vyfhoek groote.

*Klein echinod. ed. Lesk. t.* 18. B.

*Boccon. obs. p.* 324. *t. f.* 1.

δ) *Phels. Zee-eg. p.* 38. *n.* 6. Egel-roozen Dikrand.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 13. 14. 23. 24.

ε) *Phels. Zee-eg. p.* 38. Egel-roozen Scherpblad.

*Klein echinod. ed. Lesk. t.* 40. & 41. *f.* 1.

*Habitat in* Oceano asiatico, (ε) *non nisi fossilis) ex bruneo flavescens, interdum sordide cinereus, tuberculis arenam granula aequantibus, multis in quincunce positis.*

altus. 61. E vertice elato orbiculari, ambulacris lutis api-

apice convergentibus granulatis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 189. *t.* 53. *f.* 4.
*Scill. corp. mar. t.* 9. *f.* 1. 2.
*Mercat. met. p.* 233. Cucurbites.
*Bmann. recr. t.* 39. *f.* 1.
*Dav. catal.* 3. *p.* 153. *n.* 227.
*Walch dil. monum. suppl. p.* 215. *t.* IX. d. *n.* 1.
*Habitat* - - - *hactenus non nisi fossilis, rosaceo altior, ut 2 pollices altitudine, diametro baseos longitudinali 6 aequet.*

11 *ovati, margine integro.*

ovifor-mis. 62. E. convexus subtus planus, ambulacris decem biporosis stellae in modum expansis, verticis poris quatuor. *Leske apud Klein echinod. p.* 191. *t.* 20. c. d.
*Rumpf amb. t.* 14. *n.* 3.
*a) Ubelsum Zee-eg. p.* 38. *n.* 1. Eyronde Egelroos. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 18. C. D. Scutum ovatum Chaumontianum.
*β) Pl. sf. Zee eg. p.* 38. *n.* 2. Hartagtige Egelroos. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 20. a. b. Scutum ovatum Lugdunense.
*Albrov. mus. met. p.* 498. *f.* 1. 2. Pentaphyllites.
*Mercat. mettal. p.* 23. Monotroites vel cryptopetrae species altera.
*Rumpf amb. t.* 59. *f.* D.
*Breyn. echin. p.* 59. *t.* 2. *f.* 45.
*Walch dil. monum. 2. p.* 181. *t.* E. III. *n.* 5.
*γ) Ubelsum Zee eg. p.* 37. *n.* 5. Rondhart.
*Seb. mus.* 3. *t.* 10. *f.* 23.
*Habitat* - - - *supra ex cinereo fuscescens, subtus ex cinereo albidus, granulatus, granulis circulo circumdatis, ore transverso subrenisormi flabiato, ano margini vicino, baseos linea media glabra, albidiore, ab altero testae fine ad alterum extensa.*

or-

orbiculatus. 63. E. granulatus, ambulacris biporosis: poris lineola transversa impressa conjunctis, spatiisque interporiis futura media ferrata bipartitis, reliqua superficie quinquepartita. *Leske apud Klein echinod. p.* 194. *t.* 41. *f.* 2.

*Mercat. met. p.* 232. Monostroites minor.

*Breach monum dil.* 2. *p.* 181. *t.* 41. *f.* 2.

*Naturl. hist. Merkw.* 22. *t.* 22. *f.* 3?

*Bourg. petrif. p.* 77. *t.* 53. *f.* 352.

*Habitat - - - hactenus non nisi fossilis; an vere distinctus ab aliis, praesertim a quinquelabiata species?*

†††††† *utrinque plani, ambulacris petalorum figuram aemulantibus, ore centrali plano dentato, verticis poris quatuor*, Placentae Kleinii, Echinodisci Leskii.

† *margine sinuoso.*

‡ *superficie perforata*, Mellitae Kleinii.

biforis. 64. E. basi sulcis quinque linearibusque flexuosis radiatis decem exarata, foraminibus oblongis 3d anum duobus. *Leske apud Klein echinod. p.* 169. *t.* 21. A. B.

*Delic. nat. sel.* 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 1. Echinodiscus.

*Phelsf. Zee-eg. p.* 35. *n.* 12. Onregelmatige Eyerkoek & *p.* 34. *n.* 3. Stomphart met twot buiten.

*Davil. catal.* 1. *p.* 423. *n.* 955.

*St. Muller Linneisch. Naturf.* 6. B. *t.* 8. *f.* 8.

*Habitat - - - supra convexiusculus ex dilutissime flavescente cinereus, subtus ochroleucus, nunc subrotundus, nunc obtuse trigonus, margine nunc si-*

---

*Cui tribui accensendi, quos echinanthos appellat Cl. v. Schlotheim; fossiles & Echinites oblongus quinqueradiatus?*

*sinuato, nunc potius repando, ore obtuse pentagono, ano nunc circulari, nunc transverse ovali, foraminibus ei appositis nunc brevioribus subovatis, nunc longioribus, angustioribus, linearibus, ambulacris petala ovata mentientibus, ex simplici punctorum interiori serie, & striarum obliquarum testam penetrantium ordine conflatis.*

pentaporus. 65. E. ambulacris apice emarginatis, ano ori proximo: foraminibus quinque. *Leske apud Klein echinod. p.* 197. *t.* 21. C. D.

*Phil. Zee-eg. p.* 35. *n.* 11. Vyfbuizige Egelkoek.

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. V.

*Hugh barb.* 280. *t.* 24. *f.* 3. 4.

*Broxm. observ. p.* 296.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 9. 10.

*Argenv. conch.* 2. *p.* 63. *t.* 7. *f.* C.

*Gualt. testac. t.* 110. *f.* E.

*Delic. nat. sel.* 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 16.

*Dav. catal.* 1. *p.* 423. *n.* 955.

*Habitat* - - - *obtuse pentagonus, supra ex albo cinereus levissime rubescens, subtus medium versus excavatus, albus, parum flavescens, venis caeruescentibus, [illegible] assulis prominentibus, ambulacris ovalibus, ore obtuse pentagono: labiis paratis prominentibus foramine pertusis, ano fere tetragono: foraminibus appositis linearibus & subovalibus, vertice stella pentagona picto.*

hexaporus. 66. E. orbicularis, ambulacris angustis, foraminibus ad anum sex angustis *Leske apud Klein echinod. p.* 199. *t.* 50. *f.* 3. 4.

*Phil. Zee-eg. p.* 33. *n.* 2. Doorgeboorde Egelschyt.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 7. 8.

*Delic. nat. sel.* 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 17.

*Davil. catal.* 1. *p.* 423. *n.* 955.

*Habitat in* Oceano indico, americano, septentrio-

trionali, *vix diversus a pentaporo, cinereus vertice umbilicato, basi parum excavata: lineolis picturam frondosam referentibus obscuriori.*

emarginatus. 67. E. subpentagonus, ambulacris ovatis, ano ovali ab ore magis remoto: foraminibus sex marginem attingentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 200. *t.* 50. *f.* 5. 6.

*Phels. Zee eg. p.* 34. *n.* 6. Loeswerk.

*Habitat ad* insulam Burboniæ, *ex bruno cinerascens, subcordato-ovalis, leviter pulvinata, sinuosa, diametro longitudinali 4 pollices & 8 lineas, transversa 4 pollices & 6 lineas aequante, vertice patulo, basi planiore, lineis flexuosis ramosis insculptis picta.*

auritus. 68. E. margine undato: inferiori rotundato; superiore subquadrato bis inciso, inter singula bina ambulacra poro hians. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.

*Phels. Zee-eg. p.* 34. *n.* 1. Geoorde Stomp-hart.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 1. 2.

*Habitat in* sinu persico, *ex cinereo flavus, margine superiori spadiceo, basi plana, punctata, radiatim striata, ano oblongo ori proximo.*

inauritus. 69. E. subcordatus assulatus: assulis hexagonis, ambulacris quinque ovalibus apice emarginatis: quinto longiore, singulis binis poro intersito. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.

*Phels. Zee-eg. p.* 34. *n.* 2. Ongeoorde Stomphart.

*Rumpf amboin. p* 37. *t.* 14. F.

β) *Phels. Zee eg. p.* 34. Schyfgescheurde Egelkoek zonda buizen.

*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 3. 4.

*Habitat in* Amboinae fluvio Wagnitoe, *5-6 pollices longus latusque, latiore fine bis incisus, tenuis, granulis spinis basin praebentibus dense obsitus.*

*tus, supra ex rufescente cinereus, subtus ex violaceo ruber.*

tetraporus. 70. E. orbicularis leviter sinuosus, quatuor foraminibus utrinque pertusus, ano circulari. *Leske apud Klein echinod. p. 204.*
*Phelf. Zee-eg. p. 34. n. 5.* Schyf gescheurde Egelkoock met buisen.
*Seb. mus. 3. t. 15. f. 5. 6.*
*Habitat - - - ex flavo dilute cinereus, vertice quinque foraminibus pertuso ambulacris apice obtusis, basi sulcis 10 flexuosis apice bifidis exarata, ore rotundo quinquedentato.*

†† *superficie integra*, Lagana Kleinii.

Laganum. 71. E. ambulacris ovalibus subtilissime radiatis apice fissis, vertice prominente, ano circulari margini vicino. *Leske apud Klein echinod. p. 204. t. 22. f. a. b. c.*
*Rumpf amb. p. 36. t. 14. f.* E. Zeereal.
*Bocc. sic. p. 296. f. 2.*
*Gualt. t. 8. CX. f. C. C.*
*Seb. mus. 3. t. 15. f. 25. 26.*
*Plot. oxfordsh. p. 92. §. 53. f. 12.*
*Habitat - - - granulatus, ochroleucus, ovatus, subpentagonus, basi radiis 5 excavatis in totidem areas aequales divisa, ore obtuse pentagono, ano vix linear latitudine a margine distante, vertice 5 foraminibus inter ambulacra pervio.*

subrotundus. 72. E. orbicularis, ambulacris radiatis. *Leske apud Klein echinod. p. 206. t. 47. f. 7.*
*Aldrov. mus. met. p. 458.*
*Scill. corp. mar. t. 8. f. 1-3.*
*Andreae Br. a. d. Schw. t. 5. f g.*
*Davil. catal. 3. p. 184. n. 229.*
*Valent. muj. t. 3. f. 7. b.*

*Ha-*

*Habitat - - - hactenus non nisi fossilis inventus.*

reticulatus. 15. E. ovatus, ambulacris quinis ovalibus, superficie reticulata.
*Pbelf. Zee-eg. p.* 34. Echinoglycus ovalis.
*Leske apud Klein. echinod. p.* 207. *t.* 45. *f.* 8. 9.
*Rumpf amboin. t.* 14. C.
*Gualt. teft. t.* CX. *f.* D.
*Seb. muf.* 3. *t.* 15. *f.* 23. 24. 35. 36. 38.
*β) Phelf. Zee eg. p.* 34. Echinoglycus pentagonus.
*Seb. muf.* 3. *t.* 15. *f.* *
*Habitat in* Oceano americano & indico.

orbicularis. 73. E. circularis, ambulacris ovalibus acutis, basi radiis decem impressis porosis ano inter eos & margineum medio cum ore circulari. *Leske ap. Klein echinod. p.* 208. *t.* 45. *f.* 6. 7.
*Rumpf amb. p.* 37. Zeeschelling.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. *δ.*
*Gualt. teft. t.* CX. *f.* B.
*Breyn. ech. t.* 7. *f.* 1. 2.
*Bocc. obf. p.* 269. *f.* 2. 3.
*Lang. lap. fig. p.* 121. *t.* 35. *f. ult.*
*Habitat in* mari indico.

corollatus. 74. E. orbicularis ambulacris ovalibus obtusis brevibus.
*Lesk. ap. Klein echinod. p.* 209. *t.* 40. *f.* 4. Echinodiscus rosaceus.
*Phelf. Zee-eg. p.* 34. *n.* 8. Roose topje.
*Walch dil. monum.* 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 8.
*Habitat - - - hactenus tantummodo fossilis reperitus.*

11 *margine dentato*, Rotulæ Kleinii.

decadactylos. 75. E. testa foraminibus quatuor oblongis pervia, marginis dentibus decem. *Leske apud Klein echinod.*

*nod. p.* 209. *t.* 22. A. B.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. β.
*Gualt. test. t.* 110. *f.* H.
*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 17. 18.
*Davil. cat.* 1. *p.* 425. *n.* 960.
*Habitat* - - - *granulis asper, supra ex viridulo caerulescente & cinereo varius, ambulacris suturisque pallide carneis, bas. ex flavescente carnea: fuscis 10 impressis flexuosis apice bifidis, ex viridescente cinereis, ambulacris ex lanceolato ovalibus, integris, biporosis, per strias obliquas nexis, marginis dentibus alternatim brevioribus, ore rotundo, ano ovato.*

octodactylos. 76. E. anterius orbicularis, foraminibus duobus pervius, posterius octodentatus, ambulacris lanceolatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 211. *t.* 22. *f.* C. D.
*Phels. Zee-eg. p.* 33. *n.* 6. Agtvingerige Egelschyv.
*Breyn. echin. p.* 64. *t.* 7. *f.* 5. 6.
*Gualt. test. t.* 110. *f.* F.
ε) *Phels. Zee-eg. p.* 33. Echinotrochus decemdentatus.
*Seb. mus.* 3. *t.* 15. *f.* 15. 16.
*Habitat* - - - *rarior, ex cinereo albicans, assulatus, assulis convexis, concoides, vertice umbilicato, ambulacris emarginatis.*

Orbiculus. 17. E. anterius orbicularis integer, posterius inaequaliter dentatus, ambulacris lanceolatis apice fissis hinc flexis.
*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. Echinus planus suborbicularis; ambulacris quinis ovalibus, ano subremoto.
*Leske ap. Klein echin. p.* 212. *t.* 22. E. F. Echinodiscus dentatus.
*Rumpf amb. t.* 14. *f.* I. Zonne-strualde Pannekoek.
*Breyn. echin. t.* 7. *f.* 3. 4.

*Bocc.*

*Bocc. obſ. p.* 273. *f.* 15.
*Valent. muſ.* 3. *p.* 177. *f.* 2.
*Argenv. conch.* 2. *t.* 7. *f.* D.
*Davil. catal.* 1. *p.* 425. *n.* 959.
β) *Leske apud Klein ech inod. t.* 49. *f.* 6. 7.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 15. *f.* 19. 20.
*Habitat in* mari indico, *non perforatus, ex aſſe-lis planis hexagonis compactus, baſi plana ſinuis impreſſis diſtincta, ore rotundo, ano ovali.*

†††††† *ambulacris* 10 *e vertice radiis recti biporoſis ſtellatis, ore anoque in media baſeos parte vicinis,* Echinocyami Pheiſumii & Leskii.

Nucleus. 77. E. ſuperficie globoſa, ambitu orbiculari, baſi anguſtata medio plana, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-5. *Leske ap. Klein echinod. p.* 213. *t.* 48. 2a-2e.
*Habitat - - - ex flaveſcente cinereus, vertice poris pervio, ore circulari, anum oblongiuſculum ſuperante.*

centralis. 78. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſuborbiculari, baſi pulvinata, lateribus tenuiſſime ſulcatis, ambulacris vix pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 6-10. *Leske ap. Klein echinod. p.* 213.
*Habitat - - - ano minimo orbiculari; an vix diſtinctus a nucleo?*

Ervum. 79. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſubovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 213.
*Habitat - - - nucleo paulo major, ore anoque aequalibus.*

craniolaris. 80. E. superficie anterius globosa, posterius subquinquangulari pulvinata declivi, ambitu elliptico, basi subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelf. Zee-eg. p.* 132. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 16-20. *Leske apud Klein echinod. p.* 214. *t.* 48. 3a-3e.
*Pall. Spicil. zool.* 9. *t.* 1. *f.* 24. Echinus minutus subglobosus ex orientali India.
*Habitat in* India, *albus, granulis circulo insculpto cinctis, obsessus, verticis poris* 4.

turcicus. 81. E. superficie basique pulvinatis, ambitu elliptico, lateribus vix sulcatis, ambulacris subpulvinatis, vertice depressiore centrali. *Phelf. Zee-eg. p.* 35. 132. *t.* 1. *f.* 21-25. *Leske ap. Klein. echinod. p.* 214.
*Habitat* - - - *an vere distinctus a craniolari?*

Vicia. 82. E. superficie globosa, ambitu obtuse ovali, basi subangustata, lateribus sulcatis, ambulacris planiusculis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. p.* 133. *t.* 1. *f.* 26-30. *Leske ap. Klein echinod. p.* 215.
*Habitat in* mari adriatico; *an vere diversus a craniolari?*

Ovulum. 83. E. superficie pulvinata, ambitu obtuse ovali, basi globosa, lateribus vix sulcatis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. t.* 1. *f.* 31-35.
*Habitat* - - - *an revera distincta a craniolari species?*

Lathyrus. 84. E. superficie basique pulvinatis ambitu ovali, lateribus vix sulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelf. Zee-eg. p.* 133. *t.* 2. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 215. *t.* 48. 1*a*-1*c*.
*Habitat* - - - *obscurus ex flavescente cinereus, me-*

*mediae inter nucleum & craniolarem magnitudinis.*

equinus. 85. E. superficie basique pulvinatis ambitu elliptico, lateribus lævibus, ambulacris subpulvinatis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. p. 134. t. 2. f. 6-10. Leske apud Klein echinod. p. 215.*
*Habitat* - - - -

minutus. 86. E. superficie pulvinata fere plana, ambitu ovato subquinquangulari, basi anguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. p. 134. t. 2. f. 11-15. Leske apud Klein echinod. p. 215.*
*Pall. ſpic. zool. 9. p. 34. t. 1. f. 25.*
*Aldrov. teſt. p. 412.*
*Habitat frequens, vere praeſertim*, in littoris Belgici *arena, ore orbiculari.*

Faba. 87. E. ſuperficie basique pulvinatis, ambitu obtuſe ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris planis, vertice prominulo centrali. *Phelf. Zee-eg. t. 2. f. 16-20. Leske ap. Klein echinod. p. 216. t. 37. f. 6.*
*Delic. nat. ſel. 1. p. 90. t. D. I. f. 10.*
*Habitat* - - - *piſi magnitudine, ochroleucus, granulatus.*

inæqualis. 88. E. ſuperficie anterius gibba, poſterius plana declivi, ambitu oblongo-ovali ſubquinquangulari, basi globoſa ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. t. 2. f. 21-25. Leske apud Klein echinod. p. 216.*
*Habitat* - - - *dorſo inaequali.*

raninus. 89. E. ſuperficie globoſa poſterius magis declivi, ambitu acute ovali, basi globoſa, lateribus ſulca-

catis, ambulacris subpulvinatis, vertice centrali. *Phelf. Zee-eg. t. 2. f. 26-30. Leske apud Klein echinod. p. 216.*
*Habitat - - - - nonne varietas minuti?*

bufonius. 90. E. superficie globosa, ambitu ovato-cordato subtrigono, basi pulvinata, lateribus subsulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelf. Zee-eg. p. 136. t. 2. f. 31-36. Leske apud Klein echinod. p. 217.*
*Habitat - - - - nonne varietas minuti?*

*** *ano laterali, oris tentaculis penicillatis,* Spatangi Mulleri.

† *ambitu per anfractus circulari, ore centrali, ano quadrato in superficie,* Arachnoides Kleinii.

Placenta. 76. E. subconicus, areis decem: alternis angustioribus, ambulacris quinque laxis planis apice dehiscentibus.
*Syst. nat. XII. 2. p. 1105. n. 16. Mus. Lud. Ulr. 714. Echinus planus orbicularis, ambulacris quinis bipartitis, ano marginali.*
*Leske ap. Klein echinod. p. 217. t. 20. A. B. Echinarachnius.*
*Petiv. amboin. t. 11. f. 5.*
*Rumpf amb. t. 14. f. G.*
*Breyn. echin. p. 64. t. 7. f. 7. 8.*
*Gualt. teslac. t. 210. f. G.*
*Seb. mus. 3. t. 15. f. 21. 22.*
*Davil. catal. I p. 424. n. 958.*
*Habitat in Oceano meridionali, parum convexus, conideus, ambitu subangulato, basi plana, areis lineu verticali obtuse dentata bipartitis.*

cor-

† *cordati*, Spatangi Leskii.
⊢ *vertice fulcato*, Spatangi Kleinii.

Cor anguinum. 91. E. supra convexus, ambulacris impressis quadrifariam porosis areisque quinque.

α) Cor anguinum anglicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 221. *t.* 23. C.
*Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 3. Pokhart.
*Mort. northampt. p.* 235.
*Luid. litth. brit. p.* 47. *n.* & *f.* 964-967.
*Hook works p.* 285. *t.* 3. *f.* 8.
*Breyn. echin. p.* 62. *t.* 5. *f.* 5. 6.
*Kirt. oryctol. gosl. p.* 226. *t.* I. *f.* 7.
*Davil. catal.* 3. *p.* 181. *n.* 222.
β) *Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 12. Gcknotte Egelhart.
*Walch monum. dil.* 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 5. 6.
γ) *Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 14. Rondagtige Egelhart.
*Walch monum. dil.* 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 1.
δ) *Phelf. Zee-eg. p.* 40. Pluimhart.
ε) Cor anguinum, fulcis crispis. *Leske apud Klein echinod. p.* 224. *t.* 45. *f.* 12.
*Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 15. Kruisbald.
*Davil. catal.* 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 2.
ζ) Cor anguinum norwegicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 225. *t.* 23. A. B. E. F.
*Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 7. Bandhart.
*Boccon. obs. p.* 219. & 304. *figg. med.*
*Plot oxfordsh. p.* 92. §. 13. & 102. *t.* 2. *f.* 11. & *t.* 7. *f.* 9.
*List. lap. cochl. p.* 224. *tit.* & *f.* 28. 29.
*Luid. litth. brit. p.* 47. *n.* 968. 969.
*Melle lap. fig. Lubec. t.* 2. *f.* 4.
*Bytem. biblioth. app. p.* 37. *t.* 9. *f.* 33. & *p.* 51. *t.* 23. *f.* 271.
*Baier oryctogr. Noric. p.* 35. *t.* 3. *f.* 41. 42.
*Walch diluv. monum. suppl. p.* 224. *t.* 9. h. *f.* 13.
*Davil. catal.* 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 3.

Mer-

*Mercat. metall. p.* 282? Pentexoche minor f. mesopileus lapis.

*Habitat* - - - *hactenus non nisi fossilis inventus; an forte protypus hujus purpureus? an earum, quas Kleinius t.* 23. *f.* E. F. *expressit Spatagus?*

lacunosus. 13. E. ovatus gibbus, ambulacris quinis depressis. *Mus. Lud. Ulr.* 713.

*Klein echinod. ed. Lesk. p.* 221. *t.* 23. * A. B. *t.* 24. a. b. *t.* 27. A. Spatangus lacunosus.

*Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 8. Groote Holblad.

*Rumpf amb. p.* 36. *t.* 14. *f.* 2.

*Gualt. teftac. t.* 109. *f.* C.

*Delic. nat. fel.* 1. *p.* 96. *t.* D. III. *f.* 3.

*Davil. cat. t.* 1. *p.* 418. *n.* 947. & 3. *p.* 181. *n.* 222.

*Aldrov. teftac. p.* 404. *f.* 1. 2.

*muf. met. p.* 490. *f.* 2. 3.

*Imper. hift. nat. p.* 781.

*Bocc. obf. p.* 296. *f.* 1.

*Bonann recr.* 2. *p.* 92. *n.* 16. *f.* 16.

*Scill. cor. p. mar. t.* 7. *f.* 1. *t.* 10. *f.* 4. *t.* 25. *f.* 2.

*Hook. works p.* 285. *t.* 3. *f.* 9.

*Allion. oryct. p.* 17. *n.* 1.

*Kundm. rar. nat. & art. p.* 95. *t.* 5. *f.* 7.

β) *Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 9. Kleinii Holblad.

γ) *Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 13. Egwyzige Steekeltonne.

δ) *Leske apud Klein. echinod. p.* 230. *t.* 24. *f.* c. d. e. *t.* 38. *f.* 5. Spatagus lacunosus.

*Phelf. Zee-eg. p.* 40. *n.* 10. Groote Hertogsmuts.

*Hook works p.* 285. *t.* 3. *f.* 10.

*Liſt. anim. angl. app. p.* 28. *f.* 3.

*Breyn. echin. p.* 61. *t.* 5. *f.* 1. 2.

*Seb. muf.* 3. *t.* 10. *f.* 21. a. b.

*Argenv. conch. p.* 311. *t.* 25. *f.* 1. *t.* 29. *f.* 22?

*Delic. nat. fel.* 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 14. & *p.* 95. *t.* D. II. *f.* 6. 7.

*Davil. catal.* 1. *p.* 418. *n.* 947. 2.

*) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 11. Kleine Hertogs muts.

*Habitat in* mari indico, americano, atlantico, adriatico, belgico.

+ ⌊ *vertice non ſulcato*, Spatangoidæ Kleinii.

radiatus. 92. E. ambulacris quatuor, ſtriis impreſſis utroque latere porofis, verticis poris quatuor, areis decem futura media ferrata futurisque tranſverſis arcuatis divifis. *Leske apud Klein echinod. p.* 234. *t.* 25.

*Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 1. Straalblad.

*Walch diluv. mon. p.* 182. *t.* E. IV. *n.* 1. 2.

*Habitat* - - - *hactenus non niſi foſſilis obvius, baſi plana, ore ſubreniformi, ſicilla pororum ſubpentagona circundato, ano ſubrotundo: margine 5 angulis prominente, ambulacris ex ſerie pororum per paria confertim poſitorum, in vertice ſingulis convergentibus conflatis.*

purpureus. 93. E. ambulacris quaternis pentaloideis lanceolatis, tuberculis majoribus in zigzac poſitis, ſpinis acicularibus incurvis albis. *Leske ap. Klein echinod p.* 235 *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 45. *f.* 5. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 17. *n.* 4. *t.* 6. *prodr.* 2850. *var. p.* 11.

*Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 2. Dikblad.

*Rondel. piſc.* 1. *p.* 580. *Geſn. aquat. p.* 426. *Aldrov. teſt. p.* 403. Echinus Spatagus &c Briſſus.

*Argenv. conch. p.* 311. *t.* 25. *f.* 3. Pas de poulain.

*Daoil. catal.* 1. *p.* 418. *n.* 947. 1. Coeur marin.

*Hill anim. t.* 11. High backed Sea-egg.

*Aldr. muſ. met. p.* 475. Scolopendrites.

*Scilla corp. mar t.* 11. *f.* 1.

*Allion oryctogr. p.* 18. *n.* 2.

*Habitat rarior in* mari norwegico, *ſupra conce-*

*xus,*

*xus, ad latera declivis, anterius bicollis, posterius truncatus, subtus planus, ab ore ad anum convexiusculus purpureus, subtilissime granulatus, setis subtilissimis subclavatis, spinisque spatulatis, tuberculis albis insidentibus asper, taenia prope anum reniformi, e granis minimis albis multifariam constata, tuberculis albis copiosissimis cincta.*

pusillus. 94. E. ovalis, ambulacris quinis, ano remoto.
*Mull. prodr. zool. dan.* 3. *p.* 17. *t.* 91. *f.* 1-4. 2839. Spatagus flavescens.
*Habitat in* mari Norwegico, *minutus, a lacunoso distinctissimus; an hujus familiae?*

complanatus. 95. E. utrinque subplanus, areis ambulacrisque decem, duobus in lacuna dorsi positis. *Leske apud Klein echinod. p.* 238, *t.* 51, *f.* 1. 2.
*Lang. lap. fig. p.* 119. & 121. *t.* 35. *f.* 1. 2.
*Scheuchz. lith. helv. p.* 61. *f.* 84.
*mus. diluv. n.* 811. 813. 815.
*oryct. i. p.* 318. *f.* 135.
*Breyn. echin. p.* 63. *t.* 6. *f.* 1. 2.
*Bourg. petr. p.* 76. *t.* 51. *f.* 330. 333. 343.
*Davil. catal.* 3. *p.* 181. *n.* 222.
*Habitat* - - - *hactenus modo fossilis repertus, subrotundus.*

subglobosus. 96. E. utrinque convexus subglobosus affulatus, ambulacris denis striato-biporosis, ano ovato.
*Leske apud Klein echinod. p.* 240. *t.* 54 *f.* 2. 3.
*Mort. northampt. p.* 233. *n.* 2. 3. *t.* 10. *f.* 8. 9.
*List. lap. cochl. p.* 323. *tit.* & *f.* 26.
*Luid lith. brit. p.* 49. *n.* 983-994.
*Lang. lap. fiff. p.* 121. *t.* 35. *f.* 1. 2?
*Scheuchz. mus. diluv. p.* 85. *n.* 800. 814.
*oryctol. p.* 317. 318.
*Breyn. echin. p.* 61. *t.* 5. *f.* 3. 4.
*Busal. nat. Merkw. p.* 2598. *t.* 22. *f.* k.

*Walch diluv. monum. 2. p. 182. t. E. IV. f. 3. 4.*
*Habitat - - - hactenus tantum inter fassilia obvius, granulatus, verticis poris quatuor, areis sutura ferrata longitudinali divisis, lineisque transversis arcuatis exarutis; assulis heptagonis, ore subreniformi, tuberculis stellatim dispositis cincto.*

Ananchytis. 97. E. oblongo-cordatus subconicus, basi planiore, ambulacris areisque decem, ore subrotundo margine elevato cincto, ano ovali inferius emarginato. *Leske apud Klein echinod. p. 243. t. 53. f. 1. 2.*
*Mercat. met. p. 316. & app. p. 89.* Ananchitis s. Synochitis.
*Habitat - - - hactenus modo fossilis, rarior, arearum majorum assulis heptagonis, minorum hexagonis & pentagonis, ano fascia elevata circumdato.*

bicordatus. 98. E. vertice duplici. *Leske apud Klein echinod. p. 244. t. 47. f. 6.*
*Andreae Br. a. d. Schw. p. 16. t. 2. f. C.*
*Habitat, rarior - - - hactenus modo inter fossilia repertus.*

carinatus. 99. E. dorsi medio carinato. *Leske apud Klein echinod. p. 245. t. 51. f. 2. 3.*
*Baier orict. nor. t. 3. f. 43.*
*Valent. muf. 2. t. 3. f. 7. n. 1.*
*Habitat - - - hactenus modo fossilis, bicordato affinis, at posterius angustior, ore reniformi, ano absoleto.*

††† *ovati.*

† *ambulacris sulcatis*, Brissi Kleinii.

Spatagus. 12. E. ovatus gibbus, ambulacris quaternis depressis. *Fn. succ. 2117. Muf. Lud. Ulr. 712.*

Leske

*Leske apud Klein echinod. p.* 246. Spatangus Briſſus.
*Müll. zool. dan. prodr.* 2849. Spatagus flaveſcens.
*Bocc. obſ. p.* 296.
*Ginann. adv.* 2. *p.* 41. *t.* 29. *f.* 174.

maculoſus. α) E. *Lesk. ap. Klein echinod. p.* 247. *t.* 24. A. B. *t.* 26. A.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 4. Egelnoot ſmalle buyk.
*Imperat. hiſt. nat. p.* 780.
*Scill. corp. mar. t.* 4. *f.* 2. 3.
*Rumpf. amb. p.* 36. *t.* 14. *n.* 1.
*Gualt. teſt. t.* 109. *f.* A.
*Davil. catal.* 1. *p.* 419. *n.* 949.

major. ε) *Phelſum* Zee-eg. *p.* 39. *n.* 5. Egelnoot breede buyk.

nodoſus. γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 3. Geknotte Egelnoot.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 19.

orthopetalus. δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 6. Egelnoot regtblad.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 10. *f.* 22.

unicolor. ε) *Leske apud Klein echinod. p.* 240. *t.* 26. B. C. Spatangus Briſſus unicolor.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 7. Effene Egelnoot.
*Sloan. jam.* 2. *p.* 268. *t.* 242. *f.* 3-5.

ovatus. ζ) *Leske apud Klein echinod. t.* 38. *f.* 4.
*Delic. nat. ſel.* 1. *p.* 91. *t.* D. I. *f.* 13.

carinatus. η) *Leske apud Klein echinod. p.* 249. *t.* 43. *f.* 4. 5. Briſſus late carinatus.
*Phelſ. Zee-eg. p.* 39. Breed gekielde Egelnoot.
*Davil. catal.* 1. *p.* 429. *n.* 420. *n.* 931.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 14. *f.* 3. 4.
*Gualt. teſtac. t.* 108. *f.* G. G.

grandis. θ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 8. Groote Egelnoot.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 14. *f.* 5. 6.
*Gualt. ind. teſt. t.* 109. *f.* B. B.
*Habitat in* Oceano *omni*, *recens ſulphureus*, *colore ſenſim evaneſcente.*

⊢⊢ *ambulacris non ſulcatis*, Briſſoidæ Kleinii.

briſ-

brissoi-des. 100. E. oblongus, ambulacris quatuor biporosis ex ovato lanceolatis per sulcos transversos connexis: tuberculis majoribus arcuatim interfitis.
*Leske ap. Klein echinod.* 257. *t.* 27. B.
*Phelsf. Zee-eg. p.* 38. *n.* 1. Slingerblad Egeley.
*Aldrov. musf. met. p.* 455. *f.* 11.
*Scilla corp. mar. t.* 10. *f.* 1.
*Gesn. petrif. p.* 35. *n.* 11.
*Breyn. ech. t.* 4. *f.* 3 ?
*Mercat. metall. p.* 374 ?
*Walch diluv. monum.* II. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 5! & 2.
*Dav. catal.* 3. *p.* 181. *n.* 224.
β) *Phelsf. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Gebogen blad Egeley.
*Habitat - - - saepius fossilis, assulatus, granulis asper, ore reniformi, pororum stella pentagona cincto.*

teres. 101. E. convexus, ambulacris quatuor biporosis petaloideis non connexis. *Leske apud Klein echinod. p.* 252. *t.* 49. *f.* 12. 13.
*Phelsf. Zee-eg. p.* 39. *n.* 3. Peeiswyze Egeley.
*Seb. musf.* 3. *t.* 15. *f.* 27. 28.
*Habitat - - - brissoidae affinis, at ore latiore, linea carinata utrinque poris pertusa a vertice descendente distinctus.*

Oliva. 102. E. supra convexus punctatus olivaceus, fascia duplici nuda ab ore ad anum extensa. *Leske apud Klein echinod. p.* 252. *t.* 14. *f.* f. g.
*Phelsf. Zee-eg. p.* 39. *n.* 1. Klein Egeelnoot.
*Seb. musf.* 3. *t.* 15. *f.* 31. 32 ?
*Habitat - - - - radiis supra* 4 *stellatis.*

Amygdala. 103. E. figura amygdalae. *Klein echinod. ed. Leske. p.* 255. *t.* 24. *f.* h. i.
*Habitat - - -*

ova-

ovalis. 104. E. assulatus, ovalis, ambulacris areisque decem, his sutura media serrata divisis. *Leske apud Klein echinod. p.* 253. *t.* 41. *f.* 5.
*Phels. Zee-eg. p.* 32. *n.* 3. Egelschuitje twee top.
*d'Annon. act. Helv.* 4. *p.* 275. *t.* 14. *f.* 1. 3.
*Walch diluv. monum.* 2. *p.* 182. *t.* E. III. *f.* 6.
*Beckri. nov. act. Goett.* 3. *p.* 115.
*Habitat - - - hactenus modo inter fossilia repertus; an hujus familiae?*

pyriformis. 105. E. ovatus, altero fine gibbus, basi planus, ambulacris quinis subpetaloideis, obsolete porosis. *Leske apud Klein echinod. p.* 255. *t.* 44. *f.* 7. *t.* 51. *f.* 5. 6.
*Walch Naturf.* 9. *p.* 268.
*Habitat - - - hactenus non nisi fossilis, ore anoque rotundis, illo subpentagono quinquelabiato; ad quam familiam referendus?*

Lapiscaneri. 106. E. obtuse ovatus, convexus, vertice excentrico poris quatuor pertuso, ambulacris quinis biporosis ovato-lanceolatis apice fissis. *Leske apud Klein echinod. p.* 256. *t.* 49. *f.* 10. 11.
*Habitat - - - fossilis hactenus modo repertus, oris situ & structura pyriformi similis, ano supra marginem testae latiorem posito, rotundo, ore fini angustiori propiore basi plana, levissime excavata, medio nuda, ceterum tuberculis circulo cinctis in series digestis aspera; cui familiae adscribendus?*

patillaris. 107. E. maxime depressus, ambulacris stellam imitantibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 256. *t.* 53. *f.* 5-7.
*Habitat - - - hactenus modo fossilis obvius, ambitu ovato, dorso levissime convexo, basi leniter excavata, lateribus granulatis, ore orbiculari.*

III.

## III. TESTACEA.

Animalia *Mollusca simplicia, domo saepius calcarea propria, obtecta.*

300. CHITON. *Animal* Doris.
*Testae* plures, secundum longitudinem sibi appositae dorso incumbentes.

hispidus. 1. Ch. testa sexvalvi striata. *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 493. *t.* 9. *f.* 18.
*Habitat in* America, *mediae magnitudinis, ex atro cinereus: maculis punctisque albis, subtilissime striatus: striis subtilissime granulatis.*

tuberculatus. 2. Ch. testa septemvalvi, corpore tuberculato.
*Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 96. Chiton oscabrion.
*Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 494. *t.* 9. *f.* 19. Chiton cylindricus.
*Sloan. jam.* 2. *p.* 233? Patella oblonga articulata.
*Habitat in* America, *oblongo-ovalis, angustus, supra tuberculis in quincuncem positis inaequalis, ad latera cinereus albo mistus: fasciis undulatis fuscis dorso virescente: fascia lata nigerrima.*

aculeatus. 3. Ch. testa octovalvi striata, corpore subaculeato. *Amoen. acad.* 8. *t.* 3. *f.* 1. *Murr. testac. p.* 40. *t.* 2. *f.* 1. *Schroet. Conchyl. p.* 495.
*Rumpf. mus. t.* 10. *f.* 4. Limax marina.
*Edw. glean. t.* 286. *f.* B.
*Seb. mus.* 2. *t.* 61, *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1692.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1691?

Ha-

*Animal nonnullas* chitonis *species inhabitans, edule,*

*Habitat in* Asia, *facie tuberculati, ovalis, supra aculeis angustis subulatis rubris subarcuatis inaequalibus hispidus, testis conchiformibus, ultima reliquis minore.*

fascicularis. 4. Ch. testa octovalvi, corpore ad valvulas utrinque fasciculato. *Schroeter Conch.* 3. *p.* 496. *Mull. zool. dan. prodr.* 3017. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 95. *f.* 801 ? 10. *t.* 173. *f.* 1688. *Chiton. t.* 1. *f.* 2. a ? b ?
*Habitat in* Barbaria, *cinereus, laevis, testis leviter carinatis, juxta quarum latera animali, incluso fasciculi pilorum totidem albidi.*

squamosus. 5. Ch. testa octovalvi semistriata, corpore squamuloso. *Mus. Lud. Ulr.* 465. * *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 497. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 788-791. *Chit. t.* 1. *f.* 1.
*Petiv. gazoph. t.* 1. *f.* 4. Oscabrion.
*Seb. mus.* 2. *t.* 61. *f.* 3.
*Spengler Besch. berl. Naturf.* 1. *p.* 292. *t.* 7. *f.* L. M.
*v. Born mus. caes. Vind. testac. t.* 1. *f.* 1. 2.
ε) Chiton scaber variegatus. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 792. 793. *Chit. t.* 1. *f.* 3. a. b.
ϛ) Chiton laevis variegatus. *Chemn. Chiton. t.* 1. *f.* 4.
ϑ) Oscabrion gallicum. *Argenv. conch. t.* 25. *f.* M.
ι) Chiton squamosus, testa septemvalvi. *Schroeter in Litter.* 4. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 2.
ϰ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1689.
ϱ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1690.
*Habitat in* America, *aliquando sat magnus, valvis rarissime 7, in 2 partes divisis, quarum altera granulata, altera subtilissime striata, carinatus, utraque testa extrema lunulata, virescens,* σ) *thalassinus, fasciis alternis nigris & flavis vel albicantibus pictus.*

pun-

punctatus. 6. Ch. testa octovalvi lævi, corpore punctis excavatis.

*Amoen. acad.* 3. *p.* 256. Chiton corpore punctato testis octo.

*Mull. zool. dan. prodr.* 3021. Chiton testa octovalvi lævi carinata.

*Eph. nat. cur.* 1727. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 1. 2. Calva serpentis diadema.

*Osb. it.* 62.

*Seb. muſ.* 3. *t.* 1. *f.* 13.

*Habitat in* Aſia, Europa, America.

ruber. 7. Ch. testa octovalvi arcuato ſubſtriata, corpore rubro. *Fn. ſuec.* 2119. *Mull. zool. dan. prodr.* 3018. *Act. Nidroſ.* 3. *p.* 364. *t.* 6. *f.* 14. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 813. *Chit. t.* 2. *f.* 8.

ε) Chiton marmoreus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 420. *n.* 420.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 812.

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *patellae more affixa, ovalis, oblongiuſculus dorſo carinatus; ad pollicem uſque longus, ſpadiceus: ſtria dorſi obſcuriore albo limbata, animalis margine fuſco, aut flavus maculis punctisque rubris,* ε) *ex alba rubroque varius.*

albus. 8. Ch. testa octovalvi lævi dorſata, corpore albo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 422. *n.* 421.

*Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1107. *n.* 8. *Mull. zool. dan. prodr.* 3019. *act. Nidroſ.* 2. *p.* 54. Chiton testa octovalvi lævi, valvula prima poſtice emarginata.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 817. *Chiton. t.* 2 *f.* 9.

*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *ovalis, laevis.*

cinereus. 9. Ch. testa octovalvi lævi carinata, corpore rubicundo: limbo ſubciliato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 422.

*Syſt.*

*Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1107. *n.* 9. *Mull. zool. dan. prodr.* 3020. Chiton testa octovalvi ovata.
*v. Born mus. Caes. Vind testac. t.* 1. *f.* 3.
*Chem. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 818.
*Habitat in* Oceano norwegico, *inter radices ulvarum*, 2 *lineas longus*, *depressus*, *anterius angustior*, *sulcis* 2 *dorsi longitudinalibus*, *carinam mediam cingentibus*, *vivus*, *tum quoad testam tum quoad incolam rubicundus*, *mortuus & arefactus cinereus.*

bicolor. 10. Ch. testa octovalvi crassa dorsata extus thalassina intus nivea margine nigra.
*Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 794.
*Habitat* - - - *fut magnus*, *valvis medio repandis*, *anteriori radiatim striata.*

cerasinus. 11. Ch. testa octovalvi cerasina lævi: marginis dentibus niveis.
*Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 796.
*Habitat* - - - *incola siccatus niger.*

magellanicus. 12. Ch. tella octovalvi crassa ex fusco atra supra convexa: fascia dorsi nigricante media, striis lateralibus flavicantibus.
*Seb. mus.* 3. *t.* 1. *f.* 14. 15.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 95. *f.* 797.
*Habitat in* freto magellanico, *magnus*, *testa intus medio atra*, *ceterum laete viridi*, *margine omni fusco.*

fuscus. 13. Ch. testa octovalvi fusca glaberrima, intus marginisque dentibus nivea, dorsi maculis trigonis nigris: utrinque fasciis obscure flavicantibus.
*Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 95. *f.* 709. 800.
*Habitat in* India, *magellanico angustior*, *dentibus mar-*

*marginis pluribus, & utrinque valvae extremas majoribus, dorso magis elevato & carinato.*

maculatus. 14. Ch. testa octovalvi glaberrima intus thalassina margine, squamis ex cinereo albis vestita, valvis mediis anterius, nonnullis utrinque fusco maculatis.

*Chemn. Conchyl. 8. t. 95. f. 802.*

*Habitat - - - rarior.*

marmoratus. 15. Ch. testa octovalvi glaberrima albo & nigricante varia, valvis mediis intus virentibus.

*Chemn. Conchyl. 8. t. 95. f. 803-805.*
*Chiton. t. 1. f. 5.*
*Knorr Vergn. 4. t. 17. f. 3. 4.*
*β)* Chiton marmoratus, testa septemvalvi. *Schroeter n. Litterat. 4. p. 40. t. 1. f. 3.*

*Habitat in* Oceano americano, *nunc magis, nunc minus angustus & convexus, fasciis, striis, venis, maculis nigricantibus & albis alternis, limbo tumido squamoso: areis albidis, chalybeis & nigricantibus alternis.*

granulatus. 16. Ch. piceus supra planus, punctis elevatis numerosis in series digestis, limbo lato coriaceo spinoso: areis nigis albisque alternis.

*Chemn. Conchyl. 8. t. 96. f. 806.*

*Habitat in* Oceano americano *valvis 8, rarius 7.*

piceus. 17. Ch. testa octovalvi supra glabra picea nigro albidoque varia.

*Chemn. Conchyl. 8. t. 96. f. 807-810.*
*Chemn. Chit. t. 2. f. 6. & 6. a. b. c.*

*Habitat in* mari americano & rubro, *granulato affinis, intus medio niger, ad latera virescens, maculis dorsi nigris & maculis fasciis venisque albidis aut virescentibus alternis, valvis rarius 7 aut 6.*

in-

indus. 18. Ch. testa octovalvi ex cinereo albida, limbo squamoso, valvis mediis subtilissime punctatis.
*Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 811.
*Habitat in* mari americano.

minimus. 19. Ch. testa octovalvi, glabra nigra hinc inde farinosa.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 814.
*Habitat in* mari norwegico, *prope* Bergam *repertus*, *minutus*.

Cimex. 20. Ch. testa octovalvi, carinata diaphana fasciata, valva utraque extrema tenuissime punctata.
*Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 815.
*Habitat in* mari norwegico, *parvus*, *intus ex cinereo albidus*, *fasciis nigricantibus & dilutioribus alternis*.

Asellus. 21. Ch. testa octovalvi nigerrima supra convexa, dorsi macula in singulis valvis flavicante.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 816.
*Habitat in* mari norwegico, *Mytilo Mediolo affixus*.

Gigas. 22. Ch. testa octovalvi crassa convexa alba, valva prima crenata, postrema dentata, mediis emarginatis.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 819.
*Chiton. t.* 2. *f.* 10.
*Habitat ad* caput bonæ spei, 4 *pollices & ultra longus*, *limbo tumido*, *coriaceo*, *ex atro fusco*.

thalassinus. 23. Ch. testa sexvalvi glabra ovali thalassina, supra linea media dilutiori, limbo tenui hyalino.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 509. *n.* 18.
*n. Litterat.* 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 1.
*Habitat* - - - *parum convexus*.

is-

islandicus. 24. Ch. testa octovalvi subcylindrica tenuissime punctata nigra : limbo cinereo.
*Schroet. Eint. in Conch. 3. p. 509. n. 19.*
*Habitat - - - veneri islandicae adhaerens, minimus, utrinque angustus.*

crinitus. 25. Ch. testa septemvalvi pilis brevibus dense obsita.
*Brit. zool. 4. p. 60. t. 36. f. 1.*
*Habitat in* mari scotico *prope* Aberdeen, $\frac{5}{8}$ *pollicis longus.*

marginatus. 26. Ch. testa octovalvi : margine serrato reflexo laevi.
*Brit. zool. 4. p. 61. t. 36. f. 2.*
*Habitat in* mari britanico *prope* Scarborough.

laevis. 27. Ch. testa octovalvi glaberrima : fascia dorsi longitudinali elevata.
*Brit. zool. 4. p. 61. t. 36. f. 8.*
*Habitat in* mari scotico *prope* Loch Broom.

amiculatus. 28. Ch. testa octovalvi reniformi fragilissima, corio extus scabro obducta. *Pall. nov. act. Petr. 2. f. 241. t. 7. f. 26-30.*
*Habitat ad* Kuriles *insulas, ad 6 pollices usque longus, valvis imbricatis.*

301. LEPAS. *Animal* Triton.
*Testa* basi affixa multivalvis : valvis inaequalibus erectis.

Balanus. 1. L. testa conica sulcata, operculis acuminatis.
*Fn. succ. 2122. * Mus. Lud. Ulr. 466. n. 2. **
*It. wgoth. 170. Mull. zool. dan. prodr. 3022.*
*O. Fabr. Fn. groenl. p. 423. n. 423.*
*Leeuwenh. ap. 82. p. 472. t. 405.*

El-

*Ellis art. angl.* 1758. *v.* 2. *t.* 34. *f.* 17.
*Lift. conch. t.* 443. *f.* 286.
*v. Born muf. caef. Vind. teft. t.* 1. *f.* 4.
*Chemn. conch.* 8. *t.* 97. *f.* 820.
ε) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 826.
γ) *Bonann. muf. Kirch.* 1. *f.* 35.
*Habitat copioſiſſima ad littora* Oceani europæi, & maris mediterranei, *cancris aliisque teſtaceis adhaerens, utplurimum alba, ſatis magna, areis extrinſecus* 6, *quarum* 3 *elevatae, ſtriatae,* 3 *excavatae magis glabrae, operculis rugis tranſverſis ſubtiliter crenatis,* 2 *minoribus,* 2 *majoribus acuminatis.*

balanoides. 2. L. teſta conica truncata lævi, operculis obtuſis.
*Fn. ſuec.* 2123. * *Mull. zool. dan. prodr.* 3023.
*O. Fabr. Fa. groenl. p.* 424. *n.* 424.
*Penn. muſ.* 82. *n.* 802. Balanus parvus vulgaris.
*Lift. Conchyl. t* 444. *f.* 287.
*hiſt. anim. t.* 5. *f.* 41.
*Leeuwenh. arc.* 474. *t.* 465. *f.* 1. E. & *f.* 7.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 94. 95.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* C.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 821-825.
ε) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 833.
*Habitat in* Oceani ſeptentrionalis, americani, indici *rupibus, non ſupra refluxum altius, ſub fluxu adhibens, ſub aeſtu clauſus, tentaculis ciliatis exſertis animalcula obvia captura, mytilos edules ſaepe arcte operiens, balano minor, albida, cinerea aut variegata, nunc depreſſo convexa, nunc ſubcylindrica elongata, animali flavicante granulato.*

Tintinnabulum. 3. L. teſta conica obtuſa rugoſa fixa. *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 3.
*Lang. teſtac.* 4. Balanus tintinnabuliformis lævis.
*Lift. conchyl. t.* 443. *f.* 285.

*Rumpf.*

*Rumpf. muſ. t.* 41. *f.* A. B.
*Gualt. teſt. t.* 106. *f.* E. H. I.
*Argenv. conchyl. t.* 26. *f.* A. B.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 97.
*Ellis act. angl.* 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 8.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 2. *f.* 6. & 5. *t.* 30. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 828-831.
ε) Tulipa alba. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 832.
*Habitat in* Oceano americano & indico ε) *in* ſeptentrionali, *balano affinis, rubro alboque varia, aut caeruleſcens, intus alba, nunc cylindrica, nunc paulo craſſior, & pauliſper incurva, areis elevatis perpendiculariter, depreſſis tranſverſe ſtriatis, operculis fere aequalibus.*

Diadema. 4. L. teſta ſubrotunda, ſexlobata ſulcata.
*Walch Naturf.* 8. *t.* 4. *f.* A. B. C. Balanus polythalamius.
*Liſter Conch. t.* 445. *f.* 288.
*Gualt. teſtac. t.* 106. *f.* Q.
*Boccon. recher.* 294.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 98.
*Schroeter Journ.* 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.
*Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t.* 1. *f.* 5. 6. & *p.* 7. *f.* a.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 99. *f.* 843. 844.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *ſordide alba,* $\frac{13}{4}$ *pollicis circiter alta, ſurſum anguſtior, apertura ſuperiori infundibuliformi, dimidiam reliquae teſtae diametrum aequante, areis exterius* 12 *triangulis, quarum* 6 *excavatae ſtriis ſubtilibus tranſverſis exaratae, ſex alterae elevatae* 4-5-6 *prominentiis arcte ſibi accumbentibus, & ſtriis tranſverſis crenatis exaratis conſtant.*

balaenaris. 5. L. teſta ſubconica, lobis ſex elevatis rugoſis quadripartitis, operculo membranaceo bidentato. *Mull.*

*Mull. zool. dan. prodr.* 3024. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 425. *n.* 425.
*Rumpf muſ. t.* 14. *f.* H.
*Petiv. amb. t.* 1. *f.* 11.
*Walch Naturg.* 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 99. *f.* 845. 846.
*Habitat in* Balæna boope, *pectoris ſulcis pinnisque adhaerens, candore ſuo balaenam prodens & ad fugam exhortans*, 15 *circiter lineas alta, diametro baſeos* 19 *lineis aequali, craſſa lamelloſa, ſurſum lentiſſime anguſtata, ſupra truncata, obtuſiſſima: apertura membrana luteſcente laxa clauſa, areis* 12 *triangularibus, quarum* 6 *elevatae fere aequales, tranſverſim rugoſo-granulatae, & ſulcis* 3 *longitudinalibus quadripartitis exaratae, ſex humiliores, ſtriis tranſverſis ſubtiliſſimis pictae; an forſan eadem cum diademate?*

teſtudinaria. 6. L. teſta plano-convexa, radiis ſex excavatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 4. *
*Rumpf muſ. t.* 40. *f.* K. Verruca teſtudinaria.
*Bonan. muſ. Kirch.* 1. *f.* 34. 36. 37.
*Gualt. teſt. t.* 106. *f.* M. N. O. P.
*Petiv. gazoph. t.* 9. *f.* 9.
*Planc. Conch. t.* 5. *f.* 2. 2.
*Klein t.* 12. *f.* 99.
*Ellis act. angl.* 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 12. 13.
*Ginan. adr.* 41. *t.* 30. *f.* 175.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 30. *f.* 3. 4.
*Bock Naturf.* 12. *t.* 4. *f.* 9. A. B.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 99. *f.* 847. 848.
*Schroeter Journ.* 4. *p.* 355. 5. *p.* 518. 6. *p.* 305.
*Habitat in* pelago, *ſaepe teſtudinibus adhaerens, globo in medio diſciſſo ſatis ſimilis, alba, ſatis laevis, apertura inferiore hexagona, diametro ſuperiorem ſuperante, operculis* 4 *trigonis membranae inſertis.*

galeata. 7. L. testa galeata, apertura laterali. *Mantiss. pl. 2. p. 544.*
*Pall. elench. zooph. p. 198.* Lepas Calceolus.
*Schroet. Einl. in die Conch. 3. p. 318. n. 7. t. 9. f. 20. a. b.*
*Habitat in* Gorgonia verrucosa & Ventilabro, *cymbiformis, laevis, apertura rhombea.*

palmipes. 8. L. testa erecta conica, valvulis basis palmatis. *Mant. pl. 2. p. 544.*
*Habitat in* Oceano, *alba, depressiuscula, pisi majoris magnitudine, laevis, verrucis 4-6, basi ad medium usque divisis: digitis 5-6, operculo quadrivalvi obliquo.*

Tulipa. 9. L. testa subcubica laevi, operculis acutis transversim striatis. *Mull. zool. dan. 3026.*
*Olaff. isl. Ecf. 901. B. a. t. 11. f. 13.*
*Ascan. ic. rar. natur. t. 10.*
*Habitat in* Oceano septentrionali.

Mitella. 10. L. testa compresso erecta difformiter striata. *Mus. Lud. Ulr. 467. n. 5.**
*Lang. test. 4.* Balanus tulipaeformis striatus.
*Gesn. aq. 121.* Balanus Rondeletii.
*Pet. gaz. t. 6. f. 10.* Balanus chinensis striatus.
*Rumpf mus. t. 47. f. M.*
*Ellis act. angl. 1758. vol. 2. t. 23. f. 4.*
*Klein ostr. t. 12. f. 100.*
*Seb. mus. 2. t. 61. f. 8. 3. t. 16. f. 3.*
*Chemn. Conch. 8. t. 100. f. 849. 850.*
*Habitat in* Oceano indico, *coronae gemmatae similis, alba, epidermide sordide lutea tecta, multis valvis utplurimum triangularibus inaequalibus acu-*

---

*An ad hoc genus referendae testae, quas Bonanni mus. Kirch. 1. f. 14. mire depingendas curavit?*

*acutis conſtans, pedunculo communi nigro, coriaceo ſquamoſo intus cavo inſidentibus.*

Scalpellum. 11. L. teſta compreſſa tredecimvalvi læviuſcula, pedunculo ſquamoſo inſidente. *Fn. ſuec.* 2121. *
*Gualt. teſt.* 106. *f.* C.
*Ellis act. angl.* 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 4.
*Liſt. Conch. t.* 439. *f.* 281?
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* F? G?
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 91?
*Mull. zool. dan.* 3. *p.* 23. *t.* 94. *f.* 1. 2.
*Chem. Conch.* 8. *p.* 294. *Vign.* 7. *f.* a. A.
*Habitat in* Oceano norwegico, *parva, anatifera minor, valvis ſquamae aemulis, utrinque ſenis, valva longa curvata reliquas complectente, pedunculo breviſſimo, rugoſo annulato.*

anſerifera. 12. L. teſta compreſſa quinquevalvi, ſtriata, pedunculo inſidente.
*Liſt. Conch. t.* 440. *f.* 283.
*exerc. anat. t.* 19. *f.* 4. 5.
*Gualt. teſt.* 106. *f.* 2. 3.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 93.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 100. *f.* 856.
*Habitat in* mari americano & atlantico, *anatifera aequalis, etiam foſſilis, pedunculo ſuberoſo, valva prima curvata laevi dorſo carinata, reliquarum ſtriis magis evidentibus & diſtantibus, utraque majore pedunculum verſus magis turgida, fine cuneato divergente, utraque minore angu ſtiore magis acuminata ab anatifera diſcernenda.*

anatifera. 13. L. teſta compreſſa quinquevalvi lævi pedunculo inſidente. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2120. *Muſ. Lud. Ulr.* 468. *n.* 6. *
*Fn. ſuec.* 1. *n.* 1350. Lepas teſta compreſſa baſi membranacea cylindrica.

*Aldrov. orn. c.* 20. *f.* 548. Concha anatifera.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 2. Tellina pedata.
*Imper. hiſt. nat.* 904. Concha pedata.
*Bauh. pin.* 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes 1. 2. 3.
*Stalp. obſ.* 2. *p.* 458. *t.* 15. *Oſb. it.* 82. Lepas anatifera cum Tritone.
*Barth. cent.* 6. *p.* 271.
*Worm. muſ.* 256.
*Marcgr. braſ.* 188.
*Grew. muſ.* 148.
*Hufn. inſ.* 3. *t.* 6.
*Sibb. muſ.* 170. *n.* 2.
*Liſt. Conch. t.* 439. *f.* 282.
*Gualt. teſtac. t.* 106. *f.* A. D.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* E.
*zoomorph. t.* 7. *f.* I. K.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 89. 90. 92.
*Planc. Conch. t.* 5. *f.* 4.
*Column. phytob.* 110. *t.* 30.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 16. *f.* 1. *a.* 2.
*Needham micr. t.* 7. *f.* 1. 2. & *t.* 6.
*Ellis act. angl.* 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 6.
*Knorr. Vergn.* 2. *t.* 30. *f.* 4. 5.
*Murr. fund. teſtac. t.* 2. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 100. *f.* 853-855.
*de la Faill. act. pariſ. peregr. vol.* 9. *p.* 331. Macreuſe.

β) Concha anatifera ſubrotunda Bartholini. *Liſter Conch. t.* 439. *f.* 280.

γ) Tellina cancellifera ſtriis minimis argutiſſime ſignata cinerea. *Gualt. teſtac. t.* 106. *f.* B.

*Habitat in* Pelago *fere omni, utplurimum lactea, rarius margaritacea, interdum radio aut radiis binis nigro punctatis notata, pedunculo coriaceo nigro, rarius rubro, valvis tenuiſſime ſtriatis, majore utraque trigona, roſtro convergente, duabus*

*bus aliis latioribus at duplo minoribus, quinta reliquas complectente anguſta, curvata, dorſo rotundata.*

aurita. 14. L. teſta membranacea ventricoſa tubo inſidente, ore octovalvi dentato: tubulo gemino aurita.
*Ellis act. angl.* 1758. *t.* 34. *f.* 1. Lepas nuda comoſa aurita.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 16. *f.* 5.
*Edw. glean. t.* 286. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 100. *f.* 857. 858.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *pedunculo longo.*

Pſittacus. 15. L. teſta poſterius eduncа ſexvalvi rugoſo. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
*Habitat ad* littus Chilenſe, *vix pollicem longitudine ſuperans, ſcopulis adhaerens, valvis 2 majoribus pſittaci roſtrum aemulantibus, carne alba, tenera, ſapidiſſima.*

minor. 16. L. teſta rubicunda ſexvalvi inæquivalvi, operculo acuminato.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 827.
*Habitat in* India, *lineis tranſverſis albido-punctatis arcuatis picta.*

Verruca. 17. L. teſta hemiſphærica ſerrata ſexvalvi, valvis quatuor exterioribus operculoque plicatis. *Spengler Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 101. *t.* 5. *f.* 1-3. *Miull. zool. dan. prodr.* 3025. Lepas (Stroemia) teſta conico convexa ſerrata ſtriata, operculo elevatili.
*Schroeter Journ.* 5. *p.* 522. Lepas dentata ſ. ſerrata.
*Stroem. act. Havn.* 10. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 1-9.
*Habitat in* mari Islandiam alluente, *oſtreae iſlandicae aliisque affixa, parva.*

an-

angustata. 18. L. testa elongata lævi sexvalvi, apertura angusta, operculo minimo. *Bonann. recr. & mus. Kirch.* 1. *f.* 15.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 835.
*Habitat varior - - - valvis in puncto conjunctionis sulco exaratis, interdum rubro alboque striatis.*

porosa. 19. L. testa granulato striata conica tubulosa, operculo obtuso. *Schroet. Journ.* 4. *t.* 2. *f.* 6. a. b.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 836.
β) Balanus major latus. *Klein ostr. t.* 12. *f.* 96.
*List. Conch. t.* 242. *f.* 284.
*Habitat varior in* India, *recens exterius viridis, postea supra nigra, infra alba.*

elongata. 20. L. testa cylindrica nivea pellucida sexvalvi supra fissa, operculo obtuso sulcato transversim striato.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 838.
*Schr. der berl. Naturf.* 5. *t.* 5. *f.* 2.
*Schroeter Journ.* 4. *t.* 2. *f.* 2.
*Habitat rarissima in* Islandia, *5 lineas vix lata, & 3 pollices & ultra longa, infra hinc inde transverse annulata & nodosa.*

patellaris. 21. L. testa sexvalvi, exterius violacea albo mista subtiliter longitudinaliter striata, intus falcata, valvis margine denticulatis.
*Spengler Schr. berl. Naturf.* 5. *t.* 5. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 839.
*Habitat rarissima in* Coromandel, *valvarum dentibus se invicem excipientibus.*

spinosa. 22. L. testa conica, areis duodecim triangularibus: sex depressioribus minoribus albidis transversim striatis, sex purpureis longitudinaliter striatis, spinisque tubulosis recurvis, armatis.

*Chemn.*

*Chemn. Schr. berl. Naturf.* 5. *t.* 5. *f.* 3. 4.
*Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 840. & *t.* 99. *f.* 841.
*Schroet. n. Litterat.* 1. *t.* 2. *f.* 10.
*Habitat in* India, *operculis quadrivalvibus acuminatis, undulato-ſtriatis.*

violacea. 23. L. teſta craſſa glabra ſexvalvi alba, radiis violaceis.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 99. *f.* 842.
*Habitat in* India, *intus leviter ſulcata.*

Pollicipes. 24. L. teſta compreſſo erecta multivalvi lævi, pedunculo coriaceo brevi duro ſquamoſo inſidente.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* D.
*zoomorph. t.* 7. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 13. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 100. *f.* 851. 852.
*Habitat in* mari mediterraneo, *valvis* 4 *majoribus, roſtri avium inſtar verſus invicem inclinatis, & pluribus quam* 20 *minoribus.*

cylindrica. 25. L. cylindrica ſubcurva, orificio ampliſſimo obliquo, operculis cornutis.
*Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 3. 4. Balanus maxillaris.
*Ellis act. angl. vol.* 50. *f.* 15. Lepas ſetiſis capenſis ore obliquo cum operculis cornatis.
*Habitat ad* Africæ *littora ſub* zona torrida.

criſpata. 26. L. teſta ovali truncato conica, areis ſex cæruleſcentibus albo obumbratis, ſex aliis elevatis rubellis ſpinoſis perpendiculariter ſtriatis.
*Schroet. kiml. in Conch.* 3. *p.* 534. *n.* 22. *t.* 9. *f.* 21.,
*Habitat* - - - *aſſeri affixa, a teredine perforato pollicem fere alta, operculis obtuſis.*

carioſa. 27. L. teſta ſolida alba depreſſa ſulcato carioſa intus inæquali lævi.
*Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 24. A. B.
*Habitat ad* inſulas Kuriles.

Stroe-

Stroemia. 28. L conico-convexa, valvis quatuor ſerratoſtriatis operculo bivalvi. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 21. *t.* 94. *f.* 1-4. *prodr. n.* 3025.
*Habitat in* mari ſeptentrionali.

302. PHOLAS. *Animal* Aſcidia.
*Teſta* bivalvis divaricata cum minoribus acceſſoriis diſformibus.
*Cardo* recurvatus cartilagine connexus.

Dactylus. 1. Ph. teſta oblonga hinc reticulato-ſtriata. *Fn. ſuec.* 2124. *Mull. zool. dan. prodr.* 3031.
*Rondel. teſtac.* 23. *f.* 2.
*Bell. aq.* 414.
*Liſt. hiſt. Conch. t.* 433. *f.* 276.
*exerc. anat. t.* 19. *f.* 1. 2.
*an. angl. app. t.* 2. *f.* 3.
*Bonnann. recr. ment.* 2. *f.* 25. 26.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 23. 24.
*Gualt. teſtac.* 105. *f.* A. B. C. D.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* H. I.
*zoomorph. t.* 7. *f.* Q. R.
*Ginann. adr.* 44. *t.* 32. *f.* 184.
*Sem. muſ.* 3. *t.* 16. *f.* 6. a. b. c. d.
*Reaum act. Pariſ.* 1712. *p.* 163.
*Planc. Conch.* 33. *n.* 3.
*Murray fund. teſt. t.* 2. *f.* 3.
*v. Born muſ. cæſ. Vind. teſt. t.* 1. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 101. *f.* 859.

*Ha-*

---

Pholades *intrant & inhabitant rupes marinas calcareas, imo arenareas, intra quas latent phoſphoreæ.* Reaum. *act. pariſ.* 1712. *p.* 126. *His natura in tenebris, remoto lumine, alio fulgore claruit, & quanto magis humorem habeant, ludere in ovi manducatium, lucere in manibus, atque etiam in ſolo & veſte decidentibus guttis.*

Plin. IX. 61. *An, quam Liſter hiſt. conch. t.* 437. *f.* 2. *depingendam curavit, diſtincta ſpecies?*

*Habitat intra* Europæ ſcopulos, *faxa, ut perhibent, perterebrans, noctu lucens, ad* 5 *pollices longa, tota alba, interdum ochroleuca, tenuis, fragilis, antrorſum elongata cuneata, poſterius magis convexa, margine inflexa & repanda, ſtriis ſubſpinoſis antrorſum ſenſim minoribus, tamdem evaneſcentibus, cardine cochlear forma ſua mentiente, teſtis acceſſoriis* 4.

coſtata. 2. Ph. teſta ovata, coſtis elevatis ſtriata.
*Liſt. Conch. t.* 434. *f.* 277.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 351.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 105.
*Gualt. teſt. t.* 105. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 25. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 101. *f.* 863.
*Habitat in* mari americano, *alba*, 6 *fere pollices longa, coſtis obliquis ſquamis elevatis aut ſpinis obtuſis armatis.*

ſtriata. 3. Ph. teſta ovata multifariam ſtriata.
*Gualt. teſt.* 105. *f.* F.
*Chemn. Conch* 8. *t.* 102. *f.* 864-866.
*Habitat in* Europa *auſtrali & India, ad* Barbariæ *quoque littora, ſtriis hinc inde decuſſatis, area margini propinqua glaberrima.*

candida. 4. Ph. teſta oblonga undique ſtriis decuſſatis muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 469. *n.*7. * *Mull. zool. dan. prodr.* 3033.
*Bonann. muſ. Kircher.* 2. *t.* 24.
*Liſt. an. angl.* 193. *t.* 5. *f.* 39.
*app. t.* 2. *f.* 4. 6.
*Conch. t.* 435. *f.* 278.
*Gualt. teſtac. t.* 105. *f.* E.
*Habitat in* mari europæo & americano, *tenuiſſima, intus argentea magis glabra, utroque fine retundato, cardinis dente fiſſo.*

pu-

pusilla. 5. Ph. testa oblonga rotundata arcuato-striata.
*Rumpf mus. t. 46. f. H.*
*Petiv. amboin. t. 19. f. 8.*
*Adans. hist. Senag. t. 19. f. 1. 2?*
*Brown jam. 417. t. 40. f. 11.*
*Martin. Beschr. berl. Natur. 2. t. 12. f. 6-9.*
*Spengl. Beschr. berl. Naturf. 4. t. 5. f. 1-5.*
*Chem. Conch. 8. t. 102. f. 867-871. a. b.*
*Habitat in* America & India (*in hac utplurimum major*) *mediae magnitudinis, alba, fusceſcens, navium lignum perterebrans, antrorſum roſtro inſtar hians, ſub vertice globoſa, nodoſo reticulata.*

crispata. 6. Ph. testa ovali hinc obtusiore crispato striata, cardinis dente curvo. *Mus. Lud. Ulr. 469. n. 8.* * *Müll. zool. dan. prodr. 2032.*
*Fn. suec. 2125.* * Mya crispata.
*List. hist. anim. angl. t. 5. f. 38.*
*app. t. 2. f. 7.*
*hist. Conch. t. 436. f. 279.*
*exerc. anat. t. 19. f. 3.*
*Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 872-874.*
*Habitat in* Oceano septentrionali, *ultra pollicem longa, testis primariis ſulco medio transverſo rugoſo bipartitis, testa tertia parva.*

orientalis. 7. Ph. testa oblonga margine recto: altera parte glaberrima, altera reticulato-striata.
*List. hist. Conch. t. 431. f. 274.*
*Chemn. Conch. 8. t. 101. f. 860.*
*Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15.*
*Habitat in* sinu Siamensi & Tranquebariæ, *satis magna, testis tenuibus, margine tantum antico hiantibus, striis reticulatis intus quoque conſpicuis, testa satis magna & altera dente armato minore cardinem tegente.*

cam-

campechiensis. 8. Ph. testa angusta alba, tenuiter striata.
*List. Conch. t.* 432. *f.* 275.
*Habitat in* sinu Campechiensi; *an distincta species?*

cordata. 9. Ph. testa brevi turgida posterius striis elevatis transversis subtilibus exarata: hiatu cordato.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 544. *n.* 4. *t.* 9. *f.* 22-24.
*Habitat* - - - *corallio affixa, tenuissima, fragilis, sordide alba, testa anterius praeter rugas aliquot arcuatas laevi, rostri testarum anterioris hiatu testa minori ovali, convexa, dente munita occluso.*

chiloensis. 10. Ph. testa oblonga depressiuscula · striis longitudinalibus distantibus. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 179.
*Habitat in scopulis* archipelagi Chiloensis, *ad* 5 *pollices longa, appendicibus minutis aucta.*

Teredula. 11. Ph. testa oblonga alba: futura granulata fusca longitudinali.
*Pall. nov. act. Petrop.* 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 26. A. D.
*Habitat ad* Belgii *littora, ligni incorrupti fertulariis obducto, frusta tenuia perterebrans.*

hians. 12. Ph. testa bivalvi alba transverse arcuatim striata supra connivente, medio convexa, subtus cuneiformi: apertura ovali potentissima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 364. *t.* 172. *f.* 1678-1681.
*Spengl. nov. act. soc. dan.* 2. *f.* 8-11.
*Habitat ad insulas* Americae *mediae oppositas, lapides calcareos & corallia perterebrans.*

303. MYA. *Animal* Aſcidia.
*Teſta* bivalvis hians utplurimum altera extremitate.
*Cardo* dente (plerisque uno) ſolido craſſo patulo vacuo (*nec inſerto teſtæ oppoſitæ*).

truncata. 1. M. teſta ovata poſterius truncata, cardinis dente antrorſum porrecto obtuſiſſimo. *Fn. ſuec.* 2126. *Mull. zool. dan. prodr.* 2959.
*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 404. *n.* 406. Mya teſta ſubovata convexa antice truncata, cardinis dente ſolitario antrorſum porrecto obtuſiſſimo.
*It. wgoth.* 199. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 3. Concha lævis altera tantum parte clauſilis.
*Liſt. Conch. t.* 428. *f.* 269.
*an. angl. t.* 5. *f.* 36.
*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* D.
*Olaff. isl. Reſ. p.* 69. 716. 1009. *t.* 11. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
β) *Liſt. Conch. t.* 429. *f.* 270.
*Habitat in* Oceano europæo, *ad* 2½ *pollices longa, ſordide alba, epidermide ex luteo fuſca veſtita, craſſa, convexa edulis, roſmari, lugopodis, cancris, anatis ſpectabilis cibus, ſtriis tranſverſis irregularibus in rugas abeuntibus exarata, intus glaberrima.*

arenaria. 2. M. teſta ovata poſterius rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali. *Fn. ſuec.* 2127. *Mull. zool. dan. prodr.* 2960.
*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 405. *n.* 407. Mya ovata com-

Myæ *ſæpius tenebrant fundum, & in eumdem ſe defodiunt vel totæ vel pro parte.*

compreſſa antice rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali poſtico.

*It. wgoth.* 187. Concha ſubarenacea marina.
*Buſt. opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 69. *t.* 7. *f.* 1-3. Mya arenaria.
*Liſt. hiſt. Conch. p.* 418. *f.* 262.
*Argenv. zoom. t.* 5. *f.* 10.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 106.
*Born. muſ. caeſ. Vindob. teſt. p.* 19. *t.* 7. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 6. *p.* 3. *Vign. & t.* 1. *f.* 3. 4.
ε) *Liſt. Conch. t.* 419. *f.* 263.
*Habitat* in Oceano Europæ *ſeptentrionalis ſub arena, quam excavat, foraminibus* 2 *dignoſcenda, flavescens, ex fuſco rubella, aut ſordide alba,* 2½ *pollices longa, cardinis dente ſinistro & magis elato, quam in mya truncata, ſtriis transverſis in rugas abeuntibus.*

pictorum. 3. M. teſta ovata, cardinis dente primario crenulato: laterali longitudinali, alterius duplicato. *Fn. ſuec.* 2129.
*Liſt. Conch. t.* 146. *f.* 1. *t.* 147. *f.* 2. 3.
*anim. angl. t.* 2. *f.* 30.
*app. t.* 1. *f.* 4.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 40. 41.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 39. 40.
*Valent. muſ. t.* 14. *f.* 15.
*Gualt. teſt. t.* 7. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 27. *f.* 10.
*zoomorph. t.* 8. *f.* 11.
*Murr. fund. teſtac. t.* 2. *f.* 6.
*Schroet. Fluſsconch. t.* 2. *f.* 2. *t.* 3. *f.* 2-5. *t.* 4. *f.* 6.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
*Beſch. berl. Nat.* 1. *p.* 344.
ε) Mya maroccana. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 23. 24.
γ) *Liſt. Conch. t.* 148.

δ) *Argenv. Conch. t.* 29. *f.* 18.
ε) *Schroet. Flusconch. t.* 3. *f.* 3.
ζ) *Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 1.
*Habitat* β) *in* Barbariæ, ζ) *in* Tranquebariæ, *in* Europæ aquis dulcibus, 1¼ *pollicis longa*, 3½ *lata*, *epidermide fuscescente aut nigricante vestita*, *sub hac flavicans aut virescens*: *radiis viridibus*, *intus laevis margaritacea*, *non hians*, *tenuis*.

Margaritifera. 4. M. testa ovata anterius coarctata, cardine primario conico, natibus decorticatis. *Fn. suec.* 2130. *
*Mull. zool. dan. prodr.* 2961. Mya testa ovali oblonga, apertura sinuata, natibus decorticatis.
*List. Conch. t.* 149. *f.* 4.
*anim angl. app.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
*Gualt. testac. t.* 102. *f.* C.
*Klein ostr. t.* 10. *f.* 47.
*Mylius saxon. subt.* 2. *p.* 20.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 25. *f.* 2.
*Schroet. Flusconch. t.* 4. *f.* 1.
*Mayer Abh. der boehm. Ges.* 4.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 1. *f.* 5.
*Habitat in totius* orbis arctici *ad* Bohemiam & Franconiam *usque cataractis*, *in* Barbariæ *quaque lacubus*, *matricem perlarum exhibens & margaritas*, *in animalis corpore ipso natas*, *spurias*, *ex perforatione testae genitas*, *ad* 5½ *pollices lata*, & 2½ *pollices longa*, *valida*, *transverse rugosa*, *extus atra*, *vermibus saepe corrosa*, *cardinis dente laterali nullo*, *primario in alterius testae dentem latum fissumque recepto*.

Perna. 5. M. testa oblonga dilatata, basi angustiore compressa. *Mus. Lud. Ulr.* 470. *n.* 10?
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* N?
*Knorr. Vergn.* 4. *t.* 15. *f.* 2. 4. 5.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 83. *f.* 738. 739. & *t.* 84. *f.* 748.

*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 608. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 4.

*Habitat in* freto magellanico & Barbariæ *littore*, *pernae figura*, *laevis caerulea & alba*, *altero latere hians*, *cardinis loco fovea profunda transversa*, *in cujus medio dens acutus in utraque valva*; *an hujus generis?*

Vulsella. 6. M. testa linguiformi, cardine terminali depresso semiorbiculato. *Mus. Lud. Ulr.* 471. *n.* 11. * *Mus. Theffin. t.* 6. *f.* 3.

*List. Conch. t.* 1053. *f.* 10.

*Klein. mus. t.* 46. *f.* A.

*Valent. mus. t.* 16. *f.* 28.

*Gualt. test. t.* 90. *f.* H.

*Knorr Vergn.* 5. *t.* 2. *f.* 1-3.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 8-11.

*Herbst. Natursy.* 17. *p.* 126. *t.* 3. *f.* 1-4.

*Habitat in* mari americano, indico, *rubro*, *rarius*, *4 pollicis* 2-5 *pollices longa*, *formae pro aetate variabilis*, *valvis satis planis*, *subtiliter transversim striatis*, *extrinsecus flavescentibus nigricante & flavicante radiatis*, *lamellis*, *dente longo lato*, *in medio & profundius adhuc ad latera canaliculato*; *an hujus generis?*

arctica. 7. M. testa striata: valvis carinis duabus spinulosis, cardine edentula. *Mull. zool. dan. prodr.* 2962.

*O. Fabr. Fn. groenl. p.* 407. *n.* 408. Mya testa striata, valvulis carinis duabus spinulosis sæpe obsoletis, cardine obsolete dentato.

*Habitat libera in* Oceano septentrionali *inter algas*, *mytilos & alia marina*, *fabae magnitudine*, *1½-7 lineas longa*, *pallide flava*, *intus lactea*, *forma arcae*, *anterius impressa sinuosula*, *parte anteriore obtusissima*, *posteriore breviore acutius-*

*tiuſcula ; pars anterior a natibus excurrit angulis 2 remotis antrorſum ſubaculeatis.*

edentula. 8. M. teſta ſtriata ovali æquivalvi ample hiante, cardine edentulo.
*Pall. it. 2. p. 700.*
*Habitat rarior in arena littorea* maris caſpii, *pollicaris, tenuis, ſubantiquata, alba, ſtriis in utraque valva circiter 33, in breviore fine diſtantibus, in productiore confertis, cardinis labio craſſiuſculo inflexo.*

radiata. 9. M. teſta æquivalvi pellucida tenuiſſime transverſim ſtriata viridi flavicante livido-radiata; valvis altero latere latiſſimis, altero angustiſſimis.
*Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 7.*
*β) List. Conch. t. 152. f. 7.* Muſculus latior ſubfuſcus, cæruleis lineis radiatus.
*Habitat in Malabaricæ fluviis, m. piſcorum tenuior, fragilior, latior & magis complanata, intus margaritacea, cardinis dente primario crenato.*

oblonga. 10. M. ovato oblonga, valva altera dente valido lato, valvæ alterius foveæ inſerto, denteque minore inter duos minores alterius valvæ poſito.
*Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 12.*
*Habitat - - - 1½ pollicem longa, 3 pollices lata, mactra lutraria magis ventricoſa, arenariæ valde affinis ; an mera varietas ?*

anatina. 11. M. teſta globoſa nivea pellucida, cardinis dente primario prominente rotundato.
*Adanſ. Seneg. t. 19. f. 2.* Tugon.
*Chemn. Conch. 6. t. 2. f. 13.*
*Habitat rarius in* Guinea, *frequentius in littore* africano, *præſertim ad oſtium* Nigri, *ſolenis anatino valde affinis, teſtarum ſtriis decuſſatis, valva utraque altero latere repanda.*

nicobarica. 12. M. testa æquivalvi nivea ovato-oblonga decussatim striata, cardinis dente solitario lato perpendiculari cochleariformi.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 17. 18.
*Habitat ad insulas* Nicobaricas, *valvis altero latere convexis, latis margine rotundatis, altero magis angulosis, angustis, planis, hiantibus.*

australis. 13. M. testa ovata compressa clausa, cardinis dentibus duobus lateralibus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 19. 20.
*Habitat in* nova Seelandia, *sordide ochroleuca; an hujus generis?*

gaditana. 14. M. testa rotundata, planiuscula, transversim striata ochroleuca, intus alba.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 22.
*Habitat ad littus* Gaditanum.

corrugata. 15. M. testa rhombea viridi, natibus rugosis.
*Mull. hist. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 214. *n.*384.
*Besch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 7. 8.
*Schroet Flusconch. t.* 9. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3 *f.* 22. a. b.
*Habitat in fluviis littoris* Coromandel, *epidermide remota margaritacea, tenera, pellucida, ab utraque cardinis parte striis rugosis notata, intus striis radiatis subtilissimis picta,* 11-16 *lineas longa.*

rugosa. 32. M. testa ovali rugosa extrinsecus virescente intus margaritacea: cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali, alterius duplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.*346. *t.*170. *f.*1649.
*Habitat in* Coromandel *fluviis.*

nodosa. 23. M. testa ovali tenera virescente: natibus nodulosis. *Chemn. Conch.*10. *p.*347. *t.*170. *f.*1650.
*Habitat* - - - -

norwegica. 24. M. testa ovali longitudinaliter dense striata, altero fine rotundata, altero truncata, natibus decorticatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 345. *t.* 170. *f.* 1647. 1648.

spuria. 16. M. testa rhombea viridi, natibus glabris. *Schroet. Einl. in Conch.* 2. 617. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 5. *Habitat in* Tranquebariae *fluviis, corrugatae simillis, at duplo fere major, & praeter vulvae regionem tota glabra.*

glycymeris. 17. M. testa utrinque hiante crassissima lamellata oblongo ovata transverse striato rugosa, cardinis dente primario crassissimo.
*List. Conch. t.* 414. *f.* 258.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 59 ?
*mus. Kirch.* 2. *f.* 59 ?
*Klein ostrac. t.* 11. *f.* 72.
*Gualt. test. t.* 90. *f.* A.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 1. *f.* 8.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 25.
*Habitat in* Oceano europaeo, mari *praesertim* hispanico & mediterraneo, *ad* 5 *pollices longa & 10 pollices lata, cinerea vel ochroleuca, intus cretacea, cardinis dente adhuc minore serieque plicarum, inter myas & solenes ambigua.*

syrmatophora. 18. M. testa ovata depressa, cardinis margine ad dentem primarium mucrone subulato, altero dilatato. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 1. 2.
*Habitat in* Guineae *fluviis, dentibus marginalibus utrinque parallele duplicatis.*

nitida. 19. M. testa ovali alba laevi, cardinis utriusque dente obtuso. *Mull. zool. dan. prodr.* 2963.
*Habitat in* Norwegia.

membranacea. 20. M. testa ovata membranacea candida, margi-

gine ad proboſcidem protracto reflexo. *Mull. zool. dan. prodr.* 2964.
*Olaff. isl. reſ.* 901. *t.* 11. *f.* 10.
*Habitat* - - - -

byſſifera. 21. M. teſta rudi oblonga ſtriata convexa, cardine edentulo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.*408. *n.*409. *It. Wgoth.* 198. *t.* 5. *f.* 2.
*Habitat in rupium marinarum* Groenlandiæ *fiſſuris, libera byſſo ſe affigens*, 3-17½ *lineas longa.*

304. SOLEN. *Animal* Aſcidia.
*Teſta* bivalvis oblonga, utroque latere hians.
*Cardo* Dens ſubulatus reflexus ſæpe duplex, non inſertus teſtæ oppoſitæ, margo lateralis magis obſoletus.

Vagina. 1. S. teſta lineari recta: fine altero marginato, cardinibus unidentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 472. *n.* 12. *
*Liſt. Conch. t.* 409. *f.* 255. *t.* 418. *f.* 256. *t.* 412. *f.* 1 *t.* 1056. *f.* 5.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 57.
*muſ. Kircher.* 2. *f.* 56.
*Rumpf muſ. t.* 45. *f.* M.
*Gualt. teſt. t.* 95. *f.* C. D. E.
*Argenv. Conch. t.* 24. *f.* K. M. M.
*zoom. t.* 6. *f.* G. H.
*Klein. oſtr. t.* 11. *f.* 65.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 120.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 52. b.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 28. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *p.* 36. *vign.* 2. *f.* G. H. *t.* 4. *f.* 26-28. *& lit.* a-c.
β) *Liſt. conch. t.* 412. *f.* 6.

*Habitat frequens in* mari europæo, americano, indico, 6-7 *pollices latus*, 1 *longus*, *virescens*, *sub epidermide trianguio rubello altero transverse striato*, *altero fasciis arcuatis picto*, *valvis canalem referentibus.*

Siliqua. 2. S. testa lineari recta, cardine altero bidentato.
*Fn. suec.* 2131. *Mus. Lud. Ulr.* 473. *n.* 13. *
*List. Conch. t.* 413?
*an. angl. t.* 5. *f.* 37.
*Rond. test.* 93.
*Bell. aq. t.* 414. *f.* 2.
*Planc. Conch. t.* 3. *f.* 6.
*Ginan. adr.* 2. *p.* 37. *t.* 27. *f.* 170.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 4. *f.* 29. & d.
ε) Solen indicus lunulis roseis pictus. *Schroeter Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
*Habitat frequens in* Oceano europæo, *ad* 8 *pollices latus*, 1¼ *pollicis longus.*

Ensis. 3. S. testa lineari subarcuata, cardine altero bidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 473. *n.* 14. *
*List. Conch. t.* 411. *f.* 257.
*an. angl. app. t.* 2. *f.* 9.
*Argenv. conch. t.* 24. *f.* L.
*Chemn. conch.* 6. *t.* 4. *f.* 30. & e.
*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 626. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 7.
*Habitat in* Mari mediterraneo, anglico, belgico, *rarior*, *utroque fine rotundatus*, *praecedentibus speciebus utplurimum minor*, *dentibus duobus alterius valvae foveae triangulari alterius insertis.*

Legumen. 4. S. testa lineari-ovali recta, cardinibus mediis bidentatis: alterius bifido.
*Adanf. seneg. t.* 19. *f.* 3. Molen.
*List. Conch. t.* 420. *f.* 264.
*Planc. Conch. t.* 3. *f.* 5.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* A.
*Klein oſtr. t.* 11. *f.* 66.
*v. Born. muſ. caeſ. Vind. teſt. t.* 2. *f.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 5. *f.* 32-34.
*Habitat rariſſimus in* mari mediterraneo, & atlantico, *praecedentibus brevior, utrinque rotundatus, epidermide flavicante, triangulo ſub hac arcuato ſtriato caeruleſcente, cardine in teſtae medio poſito.*

Cultellus. 5. S. teſta ovali-oblonga ſubarcuata. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 15. *
*Leſſer teſtaceoth. f.* 126.
*Rumph muſ. t.* 45. *f.* F.
*Gualt. teſt. t.* 90. *f.* E.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 5. *f.* 36. 37.
*Habitat in* Amboinae & Tranquebariae *arena littorea, tenuis, fragilis,* 8 *circiter lineas longa,* & 3 *ultra* 2-*pollices lata, ſub epidermide flavicante ſordide alba: maculis ſpadiceis & violaceis varia, utroque fine rotundata, altera valva unidentata, altera bidentata.*

radiatus. 6. S. teſta ovali recta laevi: coſta tranſverſali adnata deprenſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 16. *
*Liſt. Conch. t.* 422. *f.* 266.
*Rumph muſ. t.* 45. *f.* E.
*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* B.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* P.
*Knorr delic. t.* B. III. *f.* 9.
*Vergn.* 1. *t.* 6. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 5. *f.* 38-40.
*Habitat in* Oceano indico, *violaceus, radiis* 4, *rarius* 2 *albis, tenuis, fragilis, coſta nivea, ſatis valida, totam fere teſtam percurrente, cardine utrinque calloſo & in utraque teſta bidentato.*

ſtri-

ſtrigi-latus. 7. S. teſta ovali oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 17. *

*Rondel. teſt.* 14. Concha nigra.
*Liſt. Conch. t.* 416. *f.* 260.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 77.
*muſ. Kircher* 2. *f.* 76.
*Rumpf muſ. t.* 45. *f.* N.
*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* C.
*Knorr. Verg.* 6. *t.* 5. *f.* 4.
*Adanſ. ſeneg.* 1. *t.* 19. *f.* 2.
*Murr. fund. teſt. t.* 2. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 41. 42.
*β) Liſt. Conch. t.* 421. *f.* 265.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 353.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 107.
*Klein oſtr. t.* 11. *f.* 68.
*Adanſ. ſeneg.* 1. *t.* 19. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 43. 44.
*Habitat in* mari mediterraneo, atlantico, indico, *roſeus radiis* 2 *albis, aut β) albus, ſatis robuſtus ventricoſus, cardinis margine prominente, dente tenero retroflexo.*

anati-nus. 8. S. teſta ovata membranacea piloſa, cardinis coſta falcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 18. *

*Rumpf muſ. t.* 75. *f.* O. Roſtrum anatis.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* R.
*v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. p.* 23. *vign. f. ſuper. & inf.*
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 46-48.
*Habitat rarior in* Oceani indici *fundo arenoſo, pellucidus, albus, chartae inſtar tenuis, altero fine rotundato clauſo, altero roſtri aemulo hiante, utriuſque valvae dente cardinali figura auriſcalpii.*

Macha. 9. S. teſta ovali oblonga anterius truncata, cardine altero bidentato.

*Mo-*

*Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 178.
*Habitat in* mari pacifico, Chili *alluente, in fundo arenoſo ſe abſcondens margaritifer*, 6-7 *pollices longus, fuſcus, caeruleo varius.*

bullatus. 10. S. teſta ſubrotunda inflata ſubſtriata, anterius crenato-hiante.
*Liſt. Conch. t.* 342. *f.* 179.
*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* N?
*Gualt. teſt. t.* 85. *f.* H.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 3?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 49. 50.
*Habitat in* mari indico (?) & americano, *ſatis tenuis, ſubpellucidus, longitudinaliter ſtriatus, albus, purpureo maculatus aut nebuloſus, cardinis dente unico, marginalibus remotis compreſſis foveae oppoſitae inſertis.*

minutus. 11. S. teſta ovali, valvularum angulis utrisque ſerratis.
*Liſt. Conch. t.* 426. *f.* 267?
*Spengl. catal. raiſ. t.* 6. *f.* 6-8.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 51. 52.
*Habitat in* Oceano Europae ſeptentrionali *inter zoophyta, feminis cucumeris magnitudine, longitudinaliter ſtriatus apice truncatus, carinis a cardine apicem verſus divergentibus, acutis, ſerratis.*

virens. 12. S. teſta ovato oblonga, umbonibus tumidis.
*Habitat in* Java, *teſta fragiliſſima, diaphana, alba, extus virente, inaequivalvi, forma myae pictorum, apice & baſi vix clauſa: utraque valva calloſa, cardine alterius dentibus* 2 *approximatis ſine oppoſitis.*

diphos. 13. S. teſta ovali recta laevi, nymphis prominentibus. *Mant.* 2. *p.* 544.

*Va-*

*Valent. muſ. t.* 13. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 7. *f.* 53. 54.
*Habitat in* Oceano indico, *radiato affinis, epidermide virente, violaceus, radiis pluribus, & magis evidentibus,* 2½ *pollices longus,* 5 *pollices latus, alterius valvae cardine unidentato, alterius bidentato.*

minimus. 14. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus lateralibus bidentatis: alterius bifido.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 5. *f.* 31. a. b.
*Habitat in* ſinu tranquebarico, *legumini proximus, at longe minor, ſub epidermide flavicante totus niveus, coſta interiori totam teſtam percurrente.*

maximus. 15. S teſta lineari-ovali recta arcuato-ſtriata, cardinibus lateralibus bidentatis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 5. *f.* 35.
*Habitat rariſſimus ad littora* Nicobariae, *teſta tenui, pellucida, ſub epidermide flavicante alba,* 4 *pollices lata,* 1 *pollicem &* 5 *lineas longa, utrinque hiante, cardinis dentibus ſeſe non excipientibus.*

coarctatus. 16. S. teſta tranſverſe rugoſa, medio coarctata, utrinque rotundata, cardine medio in alterutra valva nunc unidentato nunc bidentato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 6. *f.* 45.
*Schroeter Flufconch. t.* 9. *f.* 17.
*Habitat ad inſulas* Nicobaricas, *teſta ſordide alba, utrinque hiante,* ¼ *pollicis longa,* 2¼ *lata.*

roſeus. 17. S. teſta roſea æquivalvi, cardinis dente ſubbifido foveæ alterius valvæ inferto.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 7. *f.* 55.
*Habitat in* mari rubro, *tellinae radiatae affinis, at teſta utrinque hiante.*

ſane

sanguinolentus. 18. S. testa ovali glaberrima ; cardine calloso bidentato.
*List. Conch. t. 397. f. 236.*
*Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 4.*
*Chemn. Conch. t. 7. f. 56.*
*Habitat ad Jamaicam , natibus extrinsecus & intus roseis.*

striatus. 19. S. testa æquivalvi transversim striata , cardinis dente unico.
*Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 57. 58.*
*Habitat ad insulas Nicobaricas , mediae magnitudinis , tenuis , roseus : radiis albis.*

vespertinus. 20. S. testa ovali oblonga spadiceo-radiata , cardinis dentibus valvae dente solitario duplici alterius inserto.
*Ad rip. Senegal. t. 17. f. 20. Gatan.*
*List. Conch. t. 417. f. 261.*
*Argenv. Conch. t. 22. f. I.*
*v. Born mus. caes. Vind. test. t. 2. f. 6. 7.*
*Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 59. 60. a. b.*
*Habitat in mari mediterraneo & atlantico , tellinae gari similis , at testa utrinque hiante , neque ad alterum latus flexa , intus caerulea albaque varia , nunc laevi , nunc striis transversis aspera.*

occidens. 21. S. testa transverse striata ad nates glabra albo rubelloque radiata , cardine utroque bidentato : fovcola intermedia.
*Chemn. Conch. 6. t. 7 f. 61.*
*Habitat varietates - - - testa hinc inde albis rubelloque maculis varia , intus alba , 3 lineas ultra 2 pollices longa , & ultra 1 pollices lata , utrinque hiante , cardine laterali.*

crispus. 22. S. testa partim laevi , partim striis undatim crispis aspera, cardinis dente longissimo angusto.

*List.*

*List. an. angl. t.* 5. *f.* 38.
*Habitat frequens in* fluvio Teers Angliæ, *anatini affinis; an distincta satis hujus generis species?*

Spengleri. 23. S. testæ natibus bipartitis, cardinis dente primario rotundo, accessoriis longis angustis: altero curvato.
*Spengl. catal. rais. t.* 1. *f.* 8. 9.
*Habitat - - - testa vix pollicem longa,* $2\frac{1}{2}$ *pollices lata, utrinque rotundata.*

305. TELLINA. *Animal* Tethys.
*Testa* bivalvis, anterius hinc ad alterum latus flexa.
*Cardinis* dentes (*utplurimum*) tres: laterales plani alterius testæ.

* *ovatae crassiusculae.*

gargadia. 1. T. testa subrotunda compressa anterius rugosa, rima dentata. *Mus. Lud. Ulr.* 476. *n.* 19. *
*Rumpf mus. t.* 43. *f.* N. Remies gargadica.
*Klein ostr. t.* 10. *f.* 55.
*Lesser testaceoth. f.* 119.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 8. *f.* 63. 64. a. b.
*Habitat rarissima in* Oceano indico, *testa alba, apice & intus flavicante, cardinis dente medio fisso.*

Lingua felis. 2. T. testa subovata scabra: squamulis lunatis quincuncialibus. *Mus. Lud. Ulr.* 476. *n.* 20. *
*Rumpf mus. t.* 45. *f.* G.

*Gualt.*

---

* Tellinarum *testæ anterius inflexæ, ut altera testa plicam convexam, altera vero cavam ostendat, in subbivalvis autem plica vix manifesta, sed striæ in eodem loco divergentes genus produnt.*

*Gualt. teſt. t.* 76. *f.* B.
*Klein oſtrac. t.* 11. *f.* 62.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 2. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 8. *f.* 65.
*Habitat* varior *in* Oceano indico, *teſta duplo fere latiori, quam longa, vertice radiisque dilute roſeis picta.*

virgata. 3. T. teſta ovali ſtriis tranſverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus prominulis. *Muſ. Lud. Ulr.* 477. *n.* 21. *
*Rumpf muſ. t.* 45. *f.* H. Tellina virgata.
*Argenv. Conch. t.* 25. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 21. *f.* 4. & 4. *t.* 25. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 8. *f.* 66-72.
*β) Gualt. teſt. t.* 89. *f.* E.
*γ) Gualt. teſt. t.* 86. *f.* G.
*Habitat in* Oceano indico & atlantico, *teſta ad* 1¾ *pollices longa*, 2½ *lata, alba vel flavicante, radiis utplurimum roſeis picta, cardinis dente medio fiſſo, lateralibus triangularibus, altero ante vulvam, altero pone anum poſito.*

angulata. 4. T. teſta ſubovata ſtriis transverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus nullis.
*Lifter Conch. t.* 388. *f.* 235. *t.* 406. *f.* 252.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 74. 75.
*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 643. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 8.
*Habitat in* Oceano indico, *ultra ſesquipollicem longa*, 2 *pollices lata, virgatae affinis, at minus oblonga, teſta alba, angulo anteriori magis extrorſum poſito, ano ovali, nec ſolis marginibus inflexis diſtincta.*

Gari. 5. T. teſta ovalis ſtriis tranſverſis recurvatis, dentibus lateralibus obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 478. *n.* 22. *
*Rumpf muſ. t.* 45. *f.* D. Tellina gari.

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 12. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 92. 93.
*Scroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 644. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 9.
ε) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 94.
*Habitat in* Oceano indico, *virgatae facie, & testo minore magis angusta, anterius inflexa rugosissima, rugis transversis in medio testae per strias perpendiculares decussatis, nymphis exterius praeminentibus, nunc cinerea radiis fuscis, nunc alba radiis caeruleis, nunc caerulescens albo-maculata radiis rubris, nunc albo rubella radiis rubris,* ε) *ex cinereo alba, radiis rubro variis, & ex cinereo albidis.*

fragilis. 6. T. testa ovata alba gibba: striis transversis recurvatis, natibus flavescentibus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 84.
*Habitat in* Oceano europaeo, mari caspio, *testa magnitudine extimi pollicis, satu tenui, striis transversis per alias decussatis, cardinis in altera valva dente unico fisso, in altera duobus, in utraque lateralibus nullis.*

rugosa. 7. T. testa ovata: rugis transversis undulatis, cardinis dentibus lateralibus duobus, primario in sinistra valva unico fisso, in altero duobus.
*v. Born mus. caes. Vind. test. t.* 2. *f.* 3. 4.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 8. *f.* 62.
*Habitat minus frequens in* mari indico & americano, *testa paulisper latiori quam longa intus glabra, alba, aut flavicante, angulatae affinis.*

inflata. 8. T. testa rotundata crassa tota nivea gibba: striis longitudinalibus subtilissimis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 76.
*Habitat rarior* - - -

multan-gula. 9. T. testa ovata subventricosa inaequivalvi decus-

cuſſatim ſtriata anterius ſinuata, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario fiſſo, in altera duobus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 77.
*Habitat ad* Tranquebariæ *littus, teſta ſatis magna ex cinerajcente alba: rima ampla.*

papyracea. 10. T. teſta tenui ovata ventricoſa tranſverſim ſtriata, anterius plicato-rugoſa, cardinis dentibus lateralibus nullis, primariis duobus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 78.
*Habitat rarior ad* Guineam, *teſta 3 lineas longa, & 6 ultra pollicem lata, fragili, medio excavata, intus laevi, alba.*

gibboſa. 11. T. teſta ſubtrigona ventricoſa ſubtiliter tranſverſim ſtriata, cardinis dente laterali valido.
*Guath. teſt. t.* 77. *f.* Q.
*Habitat - - - teſta ex viridi albicante utrinque inflexa: altero latere breviori, cardinis dente primario unico.*

inæquilatera. 12. T. teſta aequivalvi ſubrotunda alba, ſtriis verſus marginem nonnulis transveſſis.
*Guatt. teſt. t.* 88. *f.* C.
*Habitat - - -*

Knorrii. 13. T. teſta ſplendide rubra margine violacea.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 21. *f.* 5.
*Habitat - - - teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ultra* 2 *pollices lata.*

candidiſſima. 14. T. teſta alba.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 38. *f.* 4.
*Habitat - - - teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *pollicis lata; an diſtincta ſpecies?*

Bor-

Bornii. 15. T. testa transversim striata, altero latere flexa rubescente: radiis rubris.
*v. Born mus. caes. Vind. test. t. 2. f. 5.*
*Habitat - - - testa ¼ pollicis longa, & 2 lata.*

pusilla. 16. T. testa ovata ventricosa, tenui transverse striata, cardine in altera valva edentulo, in altera dente primario duplici.
*Schroet. Flusconch. p. 194. t. 4. f. 7. a. b.*
*Habitat in* Europæ *fluviis, testa minima sordide alba, intus nivea, tenera.*

** *ovatae compressae.*

albida. 17. T. testa ovali lævi, nymphis prominentibus.
*Mus. Lud. Ulr. 479. n. 23.* *
*Habitat in* Oceano europæo, *testa ovi magnitudine, ex rubescente alba, obsolete transversim striata, intus candida, nymphis albis, cardine utrinque subtura distincto, striis minimis transversis rubris notata: dentibus in utraque valva 3.*

foliacea. 18. T. testa ovali, pube scabra, rima ferrata.
*Mus. Lud. Ulr. 479. n. 24.* *
*Rumpf mus. t. 45. f. K.*
*Argenv. Conch. t. 22. f. E.*
*Klein ostr t. 11. f. 64.*
*Knorr Vergn. 5. t. 29 f. 2.*
*Chemn. Conch. 6. t. 10. f. 95.*
*Habitat rariſſima in* Oceano indico, *testa tenera, pellucida, aurea 1½ pollicem longa, 3 pollices lata, cardinis dente primario fisso, laterali elongato.*

planata. 19. T. testa ovata compressa transversim subtriata lævi: marginibus acutis, pube subtomentosa. *Mus. Lud. Ulr. 480. n. 25.* *
*Gualt. test. t. 89. f. G?*
*Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 28?*
*Chemn. Conch. 6. t. 11. f. 100?*

Ha-

*Habitat in* Oceano europæo, mari mediterraneo, *testa maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexa, quam in congeneribus: margine acutissimo.*

lævigata. 20. T. testa ovata lævigata: dentibus lateralibus marginatis, pube striato-scabra, nymphis inflexis. *Mus. Lud. Ulr.* 480. *n.* 26. *
*Rumpf mus. t.* 45. *f.* 1 ? Tellina lævis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 111.
*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 649. *t.* 7. *f.* 10.
β) *Lift Conch. t.* 387. *f.* 234 ?
*Habitat in* Oceano europæo & indico, *testa alba: radiis rubellis, intus rubella, flavicante aut alba.*

radiata. 21. T. testa oblonga longitudinaliter subtilissime subtriata nitida, futura anali canaliculata.
*Mus. Lud. Ulr.* 481. *n.* 27. * *Fn. suec.* 3132. *
*Mull. zool dan. prodr.* 2968.
*Lift. Conch. t.* 393. *f.* 240.
*Gualt. test. t.* 89. *f.* I.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* A.
*Klein ostr. t.* 11. *f.* 60.
*Knorr delic. t.* B. III. *f.* 8.
*Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 1. 4. *t.* 2. *f.* 4. & 4. *t.* 2. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 22.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 102.
α) Tellina inæquilatera maxima rugosa candida intus argentea. *Gualt. test. t.* 88. *f.* P ?
β) Tellina inæquilatera aliquantulum rugosa prope marginem fusca, in medio fascia subalbida cincta, ad cardinem purpurascens. *Gualt. test. t.* 89. *f.* A ?
γ) Tellina flava. *Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 2.
ε) *v. Born mus. caes. Vind. test. t.* 2. *f.* 10 ?
*Habitat in* Oceano europæo & americano *frequens, testa utplurimum alba, radiis rubris picta.*

ro-

roſtrata. 22 T. teſta oblonga anterius angulato roſtrata: angulis fuſcescentibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 28. *
*Liſt. Conch. t.* 382. *f.* 225. *t.* 395. *f.* 242 ?
*Kempf. muſ. t.* 45. *f.* 1.
*Gualt. teſt. t.* 86. *f.* D 1 *t.* 88. *f.* T.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* O.
*Lucin oſtr. t.* 11. *f.* 63.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 3. 5.
*v. Born muſ. caeſ Vind. t.* 2. *f.* 12.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 96. & *t.* 11. *f.* 104.
*Habitat rarior in* Oceano indico, *teſta nunc alba, radiis interdum roſeis picta, nunc rubra, radiis interdum albis, nunc flava.*

inæquivalvis. 23. T. teſta oblongo-roſtrata, valva altera plana. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 3.
*Brunniche Bejeb. beri. Naturf.* 3. *p.* 313. *t.* 7. *f.* 25-28.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 106. a. b. c. d.
*Habitat in* mari mediterraneo & norwegico, *teſta tactu, laevi, pellucida, pollicis transverſi longitudine, futura cardinali recta in roſtrum oblongum patulum excurrente, valvula altera leviter convexa, cardinis dentibus 2 primariis, lateralibus nullis.*

trifaſciata. 24. T. teſta ovata laeviuſcula ſanguineo-triradiata, pube rugoſa. *Fn. ſuec.* 2133. *Muſ. zool. dan. prodr.* 2969.
*Liſt. an. angl. app.* 32. *f.* 8.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 114. a. b.
*β) Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 115. 116.
*Habitat minus frequens in* Oceano europaeo, *teſta unguis magnitudine, alba aut pallida: radiis 3 ſanguineis (β. violaceis, interdum 6) a cardine ortis, anterius magis obtuſa, vulva ovata.*

incarnata. 25. T. teſta ovata anterius productiore compreſſo planiuſcula, natibus ſubmucronatis. *Fn. ſuec.* 2134. * *Liſt.*

*Liſt. an. angl.* 32. *t.* 1. *f.* 8.
*Gualt. teſt. t.* 88. *f.* M.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 2. *f.* 13.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 110.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 117.
γ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 251.
δ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 250.
*Habitat in* Oceano europæo, mari mediterraneo; *teſta extimi pollicis magnitudine, planatae ſimillima, ſed roſea, radio uno alterove pallido,* β) *margine albo, vertice roſeo;* γ) *tota rubra, natibus acutiuſculis;* δ) *intus rubra.*

donacina. 26. T. teſta ovata compreſſo-planiuſcula læviuſcula, anterius obtuſiſſima.
*Gualt. teſt. t.* 88. *f.* N?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 119?
*Habitat in* mari mediterraneo, *incarnatae ſimillima, ſed teſta minore purpuraſcente: radiis plurimis rubris, regione vulvae obtuſiſſima, &, ut in donace, truncata.*

truncata. 27. T. teſta ovali compreſſa ſubſtriata: parte antica truncata ſuturaque diſtincta.
*Habitat in* Java, *incarnatae ſimilis, at teſta violacea, magis fragili, anterius fere truncata, cardinis dentibus omnibus emarginatis.*

trilatera. 28. T. teſta plana anterius truncata flava: vertice albo, cardinis dente primario & laterali ſolitariis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 85.
*Habitat* - - - *teſta triangulo inaequilatero ſimili, 1 pollicem & 7 lineas longa, 2 pollices 2 lineas lata.*

oblonga. 29. T. teſta oblonga fragili flavicante, cardi-

nis dente primario in altera valva solitario, in altera duplici.

*Chem. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 87.

*Habitat in* Oceano europæo, *mediae magnitudinis, testa altero latere rotundata.*

Spengleri. 30. T. testa alba transversim striata utrinque bifariam uncinata: valva altera extrorsum, altera introrsum arcuatim flexa.

*Spengl. Besch. Berl. Naturf.* 1. *p.* 387. *t.* 9. *f.* 1-3.

*Catal. rais. t.* 4. *f.* 3-5.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 88-90.

ε) *List. Conch. t.* 398. *f.* 237.

*Habitat ad insulas* Nicobaricas, *testa crassa* 11 *lineas longa, & 2 pollices cum* 8 *lineis lata alba, vertice roseo;* β) *uncinis caret.*

ferrensis. 31. T. testa oblongo-ovata compressa albo rubeloque radiata subtiliter transversim striata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

*List. Conch. t.* 394. *f.* 241.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 91.

*Habitat in* Oceano septentrionali, *testa pollicem longa, & 2 lata.*

operculata. 32. T. testa purpurea albido fasciata decussatim striata altero fine productiore, valva altera convexa, altera plana.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 97.

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 12. *f.* 1?

ε) Tellina operculata ochroleuca. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 98.

*Habitat in* India? *rarior, testa* 1¾ *pollicis longa,* 2¾ *pollicis lata, dentibus cardinis lateralibus nullis, primario alterius valvae solitario, alterius duplici, striis transversis subtilioribus; striis transversis crassioribus, cardinis dente lateralis, primario fisso, sinistrae valvae solitario, dex-

*dextrae duplici ; an ad inaequivalvem forſan referenda ?*

hyalina. 33. T. teſta ovali inæquivalvi plana pellucida ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 99.

*β)* Tellina excavata Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 6. *n.* 14.

*Habitat ad* Guineæ *littora*, *β) in* India, *teſta niveа, tenui, 6 lineas ultra pollicem longa, 9 lineas ultra 2 pollices lata, margine acutiſſimo, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario, in dextra duplici.*

vitrea. 34. T. teſta flavicante tenuiſſima perpendiculariter ſtriata anterius roſtrata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 101.

*Habitat in* mari ſeptentrionali & balthico, *teſta fragillima poſterius rotundata, cardinis dente in valva ſiniſtra primario ſolitario, in dextra 2 minimis.*

lanceolata. 35. T. teſta ovali tenuiſſima pellucida albida tranſverſim ſtriata anterius acuminata, cardinis dentibus lateralibus in altera valva nullis.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 102.

*Habitat rariſſima in* India, *teſta* 10 *lineas longa, pollicem cum* 8 *lineis lata, rubello obumbrata ; cardinis dente primario ſimplici ſubfiſſo.*

apelina. 36. T. teſta ovali pellucida lucis reflexione & refractione variante cotta in utraque valva alba a cardine ad marginem exteriorem procedente.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 107.

*β)* Tellina papyracea alba Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 8. *n.* 18.

*Habitat in* ſinu Nicobarico, *teſta tenui.*

coccinea. 37. T. teſta ovali pellucida coccinea ſubtiliter tranſverſim ſtriata.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 109.
*Habitat in* mari mediterraneo, *callo prope cardinem teſtae, inſtar ſolenis inſtructa.*

calcarea. 38. T. teſta ovali tenui alba, cardinis dente primario in altera valva fiſſo, alterius foveæ inſerto.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 136.
*Habitat frequentiſſima in* mari Islandiam *circumfluente, teſta tenui.*

virginica. 39. T. teſta ſubtiliter tranſverſim ſtriata anterius roſtrata.
*Liſt. Conch. t.* 159. *f.* 15.
*Habitat in* Virginiæ *fluviis, teſta minima rotundata.*

alata. 40. T. teſta viridi ſubtriquetra: margine dilatato.
*Liſt. Conch. t.* 160. *f.* 16.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 36.
*Habitat - - - - teſta 2 fere pollices lata, 1½ longa; an hujus tribus & generis?*

pectinata. 41. T. rotundata plana tenui ſubfuſca longitudinaliter ſtriata.
*Liſt. Conch. t.* 300. *f.* 137.
*Habitat - - - -*

anguſta. 42. T. teſta planiuſcula rubra albo-radiata altero fine acuminata, altero rotundata.
*Liſt. Conch. t.* 383. *f.* 26.
*Habitat - - - teſta mediae magnitudinis latitudine longitudinem duplo ſuperante.*

va-

variegata. 43. T. testa ovali utroque fine rotundata variegata, radio ad verticem albido.
*List. Conch. t.* 384. *f.* 27.
β) Tellina lata albida ex rubro radiata. *List. Chonch. t.* 385. *f.* 232.
γ) Tellina parva albida, ex purpura maculata sive radiata. *List. Conch. t.* 389. *f.* 228.
*Habitat* - - - -

madagascariensis. 44. T. testa ovali altero fine subacuminata - - -
*List. Conch. t.* 386. *f.* 233.
*Habitat in* Madagascar, *testa* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa*, $3\frac{1}{2}$ *lata.*

purpurascens. 45. T. testa utrinque purpurascente.
*List. Conch. t.* 391. *f.* 230.
β) *Gualt. test. t.* 77. *f.* L ?
γ) *Gualt. test. t.* 77. *f.* M ?
*Habitat* - - - *testa sesquipollicem longa, at paulo latiori.*

aspera. 46. T. testa altero fine acuminata intus lutescente, exterius radiata & striis transversis aspera.
*Habitat* - - - *testa* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa*, 3 *pollices lata.*

triangularis. 47. T. testa subcuneata albida transverse striata.
*List. Chonch. t.* 401. *f.* 244.
β) Tellina triangularis admodum crassa fere levior. *List. Conch. t.* 401. *f.* 245.
*Habitat* - - - *testa ultra pollicem longa*, $1\frac{1}{2}$ *lata.*

lata. 48. T. testa alba inæquilatera, altero fine subacuminata.
*List. Conch. t.* 407. *f.* 253.
*Habitat in* Oceano Norwegico, *testa* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa*, $1\frac{1}{4}$ *lata.*

ja-

jamaicenſis. 49. T. teſta craſſa roſtro extus purpuraſcente.
*Liſt. Conch. t. 408. f. 254.*
*Habitat in* Jamaica, *teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.*

rhomboides. 50. T. teſta exterius alba, ſtriis tranſverſis aſpera intus cæruleſcente.
*Liſt. an. Angl. p. 171. t. 4. f. 20.*
β) *Bonann. recr. 2. f. 48.*
*muſ. Kirch. 2. f. 47.*
*Habitat ad fluviam* Angliæ Tees, *teſta 2 pollices lata, & ultra pollicem longa.*

vinacea. 51. T. teſta ſpadiceo-vinacea: radio albo.
*Bonann. recr. 2. f. 42.*
*muſ. Kirch. 2. f. 41.*
*Habitat in* mari britannico & balthico, *teſta pollicem longa, & ultra 1½ lata.*

zonata. 52. T. teſta roſea: faſcia candida.
*Bonann. recr. 2. f. 44.*
*muſ. Kirch. 2. f. 43.*
*Habitat in* littore latino, *teſta interdum laſtea, umbonis macula balauſtina, vix propria ſpecies.*

albicans. 53. T. teſta albida: faſcia candida, intus flava.
*Gualt. teſt. t. 77. f. H.*
β) *Gualt. teſt. t. 77. f. M?*
*Habitat - - - β) cardine purpuraſcente.*

rufeſcens. 54. T. teſta rufeſcente luteo maculata, decuſſatim ſtriata.
*Gualt. teſt. t. 85. f. C.*
*Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa, 1¼ lata.*

depreſſa. 55. T. teſta inæquilatera depreſſa minutiſſime ſtriata.
*Gualt. teſt. t. 88. f. H. I. L.*

*Ha-*

*Habitat - - - testa nunc candida, nunc purpurascente, nunc subrosea.*

fasciata. 56. T. testa inæquilatera subtilissime transversim striata, candido & subalbido alternatim fasciata.
*Gualt. test. t.* 89. *f.* B.
*Habitat - - - testa ultra pollicem longa, & 1½ fere lata, altero fine subacuminata.*

striata. 57. T. testa inæquilatera utrinque rotundata ex roseo alba pellucida.
*Gualt. test. t.* 89. *f.* C.
*Habitat - - - testa 2 pollices lata, 1¼ longa.*

rosea. 58. T. testa rosea: costis tenuibus a cardine ad marginem decurrentibus.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 9. *f.* 3.
*Habitat - - - testa pollicem longa, 1½ lata.*

punicea. 59. T. testa ovali plana æquilatera punicea densissime transversim striata.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 2. *f.* 8.
*Habitat - - - testa pollicem longa, pollicem & 8 lineas lata.*

complanata. 60. T. testa obovata complanata obsolete striata rubella: margine aucto, rima hiante subtomentosa. *v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 2. *f.* 9.
*Habitat - - - testa 1¾ pollicis longa, 2¼ lata.*

Fabula. 61. T. testa ovata compressa inflexa anterius subrostrata: valva altera lævi, altera oblique substriata: striis reflexis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 9.
*Habitat in mari norwegico, mediterraneo, americano, testa alba, magnitudine seminis lupini albi.*

Adan-

Adansoni. 62. T. testa albida: cardine violaceo.
*Adans. Seneg. t. 19. f. 9.* Poron.
*Habitat frequens in antris scopulorum aqua marina repletis ad littus* Africæ *occidentalis, diametri 2 linearum.*

cancellata. 63. T. testa tenui sordide alba: sulcis numerosis tenuissimis longitudinalibus rugas transversas decussantibus.
*Adans. Seneg. t. 17. f. 10.* Pirel.
*Habitat in* mari Atlantico, *testa opaca, pollicem lata pauloque breviori.*

strigosa. 64. T. testa albicante fasciata, glabra ad marginem rugosa, cardinis dentibus in valva dextra duobus, in sinistra tribus.
*Adans. Seneg. t. 17. f. 19.* Vagal.
*Habitat ad littus* Africæ occidentale, *testa duplo saepissime latiori, quam longa, fasciis juniorum flavicantibus, adultiorum ex griseo violaceis.*

**** suborbiculatae.*

balaustina. 65. T. testa dilatato-orbiculata: valvula altera dentibus lateralibus.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa albida: radiis obsoletis rufis, magnitudine seminis lupini albi.*

Remies. 66. T. testa suborbiculata compressa rugosa.
*Mus. Lud. Ulr. 482. n. 29.* *
*Rumph mus. t. 43. f. 1.* Remies.
*List. Conch. t. 266. f. 102.*
*Murr. fund. testac. t. 2. f. 8.*
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 2. f. 11.*
*Chemn. Conch. 6. t. 12. f. 112. 113.*
*Habitat in* Oceano indico & americano, *testa interdum 3 pollices longa & 3½ lata alba, in americanis flavedine intermixta, rugis minus evidentibus.*

reticulata. 67. T. testa lentiformi compressa reticulata.
*Habitat in* India, *testa alba, intus flavicante 2 pollices longa, & 1¼ pollicis lata, striis transversis crispis, & subtilissimis elevatis longitudinalibus exarata; ano cordato impresso, brevissimo; cardinis dentibus primariis 2 subtilibus, lateralibus utrinque unico.*

scobinata. 68. T. testa lenticulari scabra: squamis lunatis quincuncialibus. *Mus. Lud. Ulr.* 428. *n.* 30. *
*Rumph. mus. t.* 43. *f.* E.
*Gualt. test. t.* 76. *f.* E.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 37. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 122-124.
*Habitat varior in* Oceano indico, *testa alba, maculis ferrugineis varia, 2½ pollices longa, 2¼ lata: ani fossula oblonga, labiis non canaliculatis.*

lactea. 69. T. testa lentiformi gibba alba pellucida lævi.
*Gualt. test. t.* 71. *f.* D.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 125.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa semine lupini albi paulo majore, obsolete transversim striata; cardine edentulo.*

carnaria. 70. T. testa suborbiculata lævi utrinque incarnata oblique striata: striis hinc reflexis.
*List. Conch. t.* 339. *f.* 176.
*an. angl. t.* 4. *f.* 25.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 2. *f.* 14.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 126.
ε) *Gualt. test. t.* 77. *f.* I.
*Habitat copiosissima in* Angliæ sinubus, & insularum Oceani americani littore, *seminis lupini albi magnitudine.*

bimaculata. 71. T. testa triangulo subrotunda latiore lævi albida: intus maculis duobus sanguineis subrotundis. *Fn. suec.* 2135.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 127.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 132. a. b.

*Habitat rarior in* Oceano europæo & americano, *testa vix exigui pollicis magnitudine, extus alba, varius flavicante, praeter strias aliquot obsoletas laevi, flexura parum manifesta.*

balthica. 72. T. testa subrotunda lævi extrinsecus incarnata. *Fn. suec.* 2136. * *it. oel.* 43. *Mull. zool. dan. prodr.* 2970.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 128.

*Habitat in* mari balthico, *testa fabam minorem vix unquam superante, tenuissima, pellucida, fragili, intus alba, a triangulo rotundata.*

pisiformis. 73. T. testa subgloboſa lævi intus incarnata obliquе subtiliata: striis anterius angulo acuto reflexis. *Fn. suec.* 2137.

*Habitat ad* Oceani europæi ostia fluviorum, *testa pisi magnitudine, alba, fundo purpureo, varia, tota alba; striis oculo nudo vix conspicuis, cardinis dente primario simplici, lateralibus prominulis.*

divaricata. 74. T. testa subgloboſa alba bifariam obliquе striata.

*List. Conch. t.* 301. *f.* 142.

*Bonann. recr.* 3. *f.* 349.

*mus. Kirch.* 2. *f.* 104.

*Klein ostr. t.* 9. *f.* 28.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 129. 130.

*Habitat in* mari mediterraneo & americano, *testa pisi magnitudine ad pollicis longitudinem subcompressa, varius caerulescente aut cinerea, intus alba, striis tenuissimis undulatis divergentibus exarata; margine crenato, flexura nulla, cardinis dente primario duplici, lateralibus nullis; an hujus generis?* Logie.

di-

digitaria. 75. T. testa subglosa pallida, cincta striis obliquis uniformibus.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 120. 121.

*Habitat in* mari mediterraneo, americano & *rarissime* indico, *testa pisi magnitudine, in indica minore, intus usquerimum glabra, nonnunquam ex rufo aurantia, maculis interdum undulatis rufis pictis, striis eleganter obliquis ad marginem exteriorem [illegible], instar striarum in apice digitorum, [illegible], unde apparet spiraliter striata.*

cornea. 76. T. testa globosa glabra cornei coloris: sulco transversali. *Fn. suec.* 2138.

*Mull. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 202. *n.* 387. *zool. dan. prodr.* 2965. Tellina (rivalis) testa globosa gibba glabra, umbone obtuso.

*List. Conch. t.* 159. *f.* 14.

*anim angl. t.* 2. *f.* 31. *app.* 22. *t.* 1. *f.* 5.

*Gualt. test. t.* 7. *f.* B. C. C. C.

*Argenv. Conch. t.* 27. *f.* 9.

*zoomorph. t.* 8. *f.* 10.

*Schroet. Flusconch. t.* 4. *f.* 3-5.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 133. a. b.

*Habitat vulgaris in* Europæ amnibus & fossis, *testa pellucida nitida, oculis armatis, subtilissime transverse striata, intus alba subcaerulescente, extus alba, pallida, ex caeruleo cinerea, caerulea albo mista, arcubus transversis nigris, uno evidentiori, pisi saepius magnitudine, non raro quadruplo majore, cardinis dentibus lateralibus elongatis obsoletis utrinque cum fossulis excipientibus, mediis vix ullis.*

lacustris. 77. T. testa rhombea planiuscula glabra, umbone acuto. *Mull. zool. dan. prodr.* 2966. *verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 204. *n.* 388.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 135.

*Habitat in* Europæ lacubus & paludibus, *vivipara*,

*ra, testa ad 6 lineas longa 4 lata, subfusca, valvarum dorso cinereo, margine albido, intus alba, juniore tota alba diaphana, tenuiore & fragiliore, quam corneae, cardinis dentibus mediis nullis, lateralibus obsoletis 6.*

amnica. 78. T. testa subcordiformi transversim sulcata, umbone obtuso. *Mull. zool. dan. prodr. 2967. verm. terr. & fluv. 2. p. 205. n. 389.*
*Chemn. Conch. 6. t. 13. f. 134.*
*Habitat in* Europae amnibus *& fossis, testa cornea minus globosa, 1-5 lineas diametro aequante, intus glabra subcaerulea, exterius alba, fusca, aut lutea, costa interdum nigricante simplici aut duplici, junioribus tota candida pellucida, cardinis dentibus mediis in utraque valva 2, lateralibus utrinque 1.*

fluminalis. 79. T. testa triangulari gibba transversim striata. *Mull. verm. terr. & fluv. 2. p. 205. n. 390.*
*Habitat in* Asiae fluvio Euphrat, *testa crassa, dura, opaca, cardinem versus antrorsum latiori, exterius viridi, striis imbricatis aperturae parallelis, exarata, intus cyanea, cardinis dentibus mediis sex, lateralibus utrinque elongatis & cum sulcis excipientibus crenulatis.*

fluminea. 80. T. testa triangulari gibba transversim costata. *Mull. verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 391.*
*Habitat in* Sinae arena fluviatili, *testa 6-8 lineas longa & lata, opaca, antrorsum & retrorsum fere aequali, exterius viridi, intus semicircum nigro notata, albida, cardine testam fluminalem referente.*

fluviatilis. 81. T. testa triangulari transversim rugosa. *Mull. verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 392.*
*Habitat in fluvio, emporium* Sinense Canton *praeter la-*

*labente, cum fluminali & fluminea ad Venerem accedens, cardine his etiam similis, at testa latiore & tenuiore, 8 lineas longa, 9 lata, ex fusco virente variolosa distincta.*

iberica. 82. T. testa globosa lævi nitida, margine dentata.
*Bonann. recr. 2. f. 33.*
*mus. Kirck. 2. f. 32.*
*Habitat copiosa in* littore Iberico, *testa parva, pulla, interdum ex luteo fusca, atro intermista.*

adriatica. 83. T. testa subglobosa extrinsecus alba intus margaritacea margine denticulata.
*Bonann. recr. 2. f. 34.*
*mus. Kirck. 2. f. 33.*
*Habitat in* Adriatici littoris *arena, testa parva.*

sinuosa. 84. T. testa subglobosa æquivalvi æquilatera: striis transversis rarioribus.
*Gualt. test. t. 77. f. D. E.*
*Habitat - - - - testa mediae magnitudinis albida, aut rubella.*

purpurata. 86. T. testa æquilatera lævi tota lucidissime purpurea.
*Gualt. test. t. 77. f. L.*
*Habitat - - - - testa pollicem longa, sesquipollicem lata.*

candida. 87. T. testa suborbiculata subtiliter transversim striata candida.
*Gualt. test. t. 77. f. O.*

---

*e*)

Tellinarum *species multae imperfectius jam ab auctoribus descriptae, difficillime definiendae; multae certe videntur meræ varietates; an hujus generis est concha ab* Argenvillio *zoomorph. t. 8. f. 9. delineata? an distincta species atra, quam Ill.* Pallas *in mari glaciali reperit?*

β) *Gualt. teſt. t. 77. f.* P.
*Habitat* - - - - *teſta* β) *minore laevi.*

gallica. 88. T. teſta trigona pectinata.
*Argenv. Conch. t. 27. f. 11.*
*Habitat frequens in* Galliæ *fluvio* Marne, *mediae magnitudinis, cardinis dente ſolitario.*

ſenegalenſis. 89. T. teſta trigono-globoſa, craſſa, dura, laevi, ſulcis tranſverſis exarata.
*Adanſ. Seneg. t. 17. f. 14.* Toſar.
*Habitat in* Africa, *teſta alba, incarnata, aut ſplendorum colore tincta, interdum rubella albo variegata.*

anguloſa. 90. T. teſta ovali planiuſcula tranſverſim ſtriata, antrorſum inflexo-angulata; cardinis dente primario bifido; lateralibus remotis.
*Chemn. Conch. 10. p. 349. t. 170. f. 1654. 1655.*
*Habitat ad* inſulas Americæ *mediae obverſas.*

polygona. 91. T. teſta alba tranſverſim ſtriata orbiculari antrorſum angulato: cardinis dentibus lateralibus nullis; primario exporrecto duplicato, alterius duobus. *Chemn. Conch. 10. p. 348. t. 170. f. 1651-1653.*
*Habitat in* Oceano indico.

306.

306. CARDIUM. *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis subæquilatera æquivalvis (*plerumque*) convexa, longitudinaliter costata striata aut sulcata, margine dentata.

*Cardo* dentibus mediis binis alternatis: altero utplurimum incurvo; lateralibus remotis insertis.

costatum. 1. C. testa gibba æquivalvi: costis elevatis carinatis concavis membranaceis. *Mus. Lud. Ulr.* 483. *n.* 31. *

*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* A. Concha exotica.
*Adans. Seneg. t.* 18. *f.* 2. Kaman.
*Column. purp.* 26. *t.* 27.
*Major testac. t.* 10.
*Rumpf. mus. t.* 48. *f.* 6.
*List. Conch.* 1. *t.* 327. *f.* 164.
*Gualt. test. t.* 72. *f.* D.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 28. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 15. *f.* 151.
*Habitat in* Oceano africano, *testa* (*integra rarissima*) *ad* 3 *pollices longa*, $3\frac{3}{4}$ *lata*, & *ultra* 3 *pollices alta*, *alba*: *sulcis latis fuscis.*

Car-

Cardium [illegible] *lateralibus remotis instruuntur*, *scrobiculo oppo-* [illegible] *adhuc ignotæ*, [illegible] Valentyn *Abr. t.* 16. *f.* 27. *ab* Ar- [illegible] *t.* 6. *f.* V. *dapi-* [illegible] *tentaculis cincta conspi-* [illegible] *tertia sui* [illegible] *flavo fuscoque undulata* [illegible]

Antiquata *testa nobis*, *quæ longitudinaliter sulcata*, *sed transversis ap-* [illegible] *longitudinalis* [illegible] *ad marginem*, *transversalis a natibus ad na-* [illegible] *margini parallelo.*

Cardissa. 2. C. testa cordata : valvis compressis dentatocarinatis, natibus approximatis. *Mus. Lud. Ulr.* 484. *n.* 32. *

*Rumpf mus. t.* 42. *f.* E. Cardissa.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* I. Cor veneris.
*zoomorph. t.* 12. *f.* K.
*Column. aq.* 16.
*List. Conch. t.* 318. *f.* 155. *t.* 319. *f.* 156.
*Bonanu. recr.* 2. *f.* 49.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 48.
*Gualt. test. t.* 84. *f.* B. C. D.
*Klein. ostrac. t.* 10. *f.* 39.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 18. *f.* 3. & 4. 6. *t.* 11. *f.* 1.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 2. *f.* 15-18.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 14. *f.* 143-146.
β) *List. Conch. t.* 320. *f.* 157.
*Habitat rarior in* Oceano indico, *testa ad* 2½ *pollices longa, & ultra* 2 *pollices lata, cordi humano simillima, costis obliquis, vulvaque cordata conspicua, sanguineis guttis interdum varia, nunc utrinque plana, nunc altero latere concava.*

roseum. 3. C. testa cordata anterius lineis, posterius striis paulo latioribus conjunctione cordis figuram illius æmulantibus exarata, hinc convexa, illinc concava.

*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* D.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 14. *f.* 147.
*Habitat ad insulas* Nicobaricas, *cardissae affinis, testa ex albido & roseo varia : vulva cordata.*

retusum. 4. C. testa cordata : valvis striatis crenulatis subcarinatis ; sano lunato cordiformi intruso.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 3. *f.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 14. *f.* 139-142.
*Habitat in* India, Arabia, Aegypto, *inter hemicardium & fragum medium, testa interdum spithama 2 pollices longa, & 2 fere pollices lata, crassa*

*ſa lacteo, anterius convexa, poſterius anguſtata, plana, quaſi truncata: margine plicato-dentato.*

Hemicardium. 5. C. teſta cordata ſubquadrilatera: valvulis carinatis, natibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 33. *

*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* H.
*Petiv. aq. amb. t.* 17. *f.* 4.
*Gualt. teſt. t.* 83. *f.* C.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 159-161.
*Habitat rariſſimum in* Oceano indico, *cardiſſae affine, teſta extrinſecus ochroleuca, intus nivea, coſtarum pauciſtribus glabris, reliquis nudulaſis: ſulcis intermediis rugoſis excavato-punctatis.*

Lithocardium. 50. C. teſta cordata ſubtrilatera, valvis transverſe ſulcatis: anterius longitudinaliter ſtriata. *Mant.* 2. *p.* 544.
*Habitat - - - hactenus modo foſſile inventum, hemicardio affine, valvis anterius carinatis: carinis crenulatis, natibus approximatis, vulva ovata, monte veneris planiuſculo longitudinaliter crenulato ſtriato cum carinula altiore.*

lineatum. 51. C. teſta cordata carinata, anterius oblique truncata, tenui, glaberrima nivea, aureo ſtriata, margine denticulata. *Kaemm. lab. Rudolſt. p.* 210. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.
*Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.*

medium. 6. C. teſta ſubcordata ſubangulata: valvis angulatis ſulcatis lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 485. *n.* 34.
*Liſt. Conch. t.* 316. *f.* 153.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 94.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 91.
*Gualt. teſtac. t.* 83. *f.* B.

*Knorr Vergn.* 1. *t.* 29. *f.* 5. 6. *t.* 20. *f.* 5.
*Spengler ſelt. Conch. t.* 1. *f.* k.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 162-164.
ε) Cardium donaciforme. *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 11.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 165 ?
*Habitat in* Oceano americano, *teſta teſtae hemicardii ſatis ſimili, at maculis ſpadiceis aut fuſcis varia, coſtis pluribus cum intermediis ſulcis laevibus; valvis altero latere quaſi truncatis medio tamen prominentibus, cardinis dente primario unico.*

aculeatum. 7. C. teſta ſubcordata: ſulcis convexis linea exaratis: exterius aculeato ciliatis.
*Muſ. Lud. Ulr.* 485. *n.* 35. * Cardium muricatum.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* B. Cor bovis.
*Liſt. Conch. t.* 321. *f.* 158.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 96. 97.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 95. 97. 98.
*Gualt. teſt. t.* 72. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 4.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 1.
*Murr. fund. teſtac. t.* 2. *f.* 9.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 15. *f.* 155-157.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 5.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 8.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 3. *f.* 5.
ι) *Bonann. recr.* 2. *Fn.* 93. *muſ. Kirch.* 2. *f.* 94.
*Habitat in* Mari mediterraneo, *echinato proximum affine, teſta tamen longe majore, magis convexa, altero latere quaſi truncata, marginem verſus tamen elevata, ex fuſco flava: fuſciis interdum obſcurioribus picta, cardinis dentibus in utraque valva 2, lateralibus in altera valva 2, in altera 3.*

echi-

echinatum. 8. C. testa subcordata sulcata: costis carinatis aculeatis. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 46. *t.* 13. *f.* 1. 2. *t.* 14. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 28. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 1122. *n.* 79. *Fn. suec.* 2139. * *Mus. Lud. Ulr.* 486. *n.* 36. * *Mull. zool. dan. prodr.* 2971. *Brit. zool.* 4. *n.* 38. *Fabr. Fn. groenl. p.* 409. *n.* 410. Cardium testa subcordata: sulcis exaratis linea ciliari, aculeis inflexis plurimis. *Rondel. test.* 22. *Worm. mus. p.* 253. *Aldrov. test. l.* 3. *c.* 45. Concha echinata. *Gesn. musch. p.* 43. Concha echinata prima. *List. Conch. t.* 324. *f.* 161. *an. angl. t.* 5. *f.* 33. *Bonann. recr.* 2. *f.* 90. *mus. Kirch.* 2. *f.* 88. *Gualt. test. t.* 72. *f.* B. *Klein ostr. t.* 10. *f.* 40. *Seb. mus.* 3. *t.* 86. *f.* 3. *Costa brit. Conch. p.* 167. *t.* 14. *f.* 2. *Murr. testac. t.* 2. *f.* 19. *Lesk. Naturg.* 1. *t.* 10. *f.* 8. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 15. *f.* 158. *a) Seb. mus.* 3. *t.* 86. *f.* 13. *b) Bonann. recr.* 2. *f.* 72. *mus. Kirch.* 2. *f.* 71. *Habitat in* Oceano septentrionali, *testa spadicea: fasciis* 5 *albis, intus alba, sulcis profundis* 20, *versus cardinem rugosis, costarum aculeis a medio versus marginem increscentibus versus cardinem nullis.*

ciliare. 9. C. testa subcordata: sulcis elevatis triquetris; extimis aculeato ciliatis. *List. Conch. t.* 325. *f.* 162. *Gualt. test. t.* 72. *f.* C. *Knorr. Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 5. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 171. 172.

*Habitat ad littus* Africæ occidentale, *coſtato affine, teſta teſtis echinati & aculeati minore, tenuiore, fragiliore & magis pellucida, nivea, ſulcis tranſverſe rugoſis, coſtis trigonis aculeatis.*

ciliatum. 10. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis ſubtriquetris ciliatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 410. *n.*411. *Habitat ſat copioſum in fundo* maris ſeptentrionalis *arenoſo vel argilloſo, echinato affine, teſta craſſa obliquata, convexa,* 19 *lineas lata,* 18 *longa, ſub epidermide cinerea vel griſea albida, intus alba glabra, ſulcis* 32-38, *undulatim ſtriatis, coſtis ad carinas ciliatis, mediis convexiuſculis lateralibus triquetris.*

tuberculatum. 11. C. teſta ſubcordata: ſulcis obtuſis nodoſis tranſverſim ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.*486. *n.*37.
*Liſt. Conch. t.* 329. *f.* 166.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 100.
*Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 11.
*Gualt. teſt. t.* 71. *f.* M.
*Argenv. zoom. t.* 6. *f.* C. D.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 39. a?
*Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 7.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 30. *f.* 2. & 6. *t.* 8. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 23. 24.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 173.
α) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 2.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 6.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 14.
ε) *Knorr Vergn* 2. *t.* 29. *f.* 4.
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 5.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta varie picta; utplurimum fuſca faſciis obſcurioribus, aut alba: faſciis fuſcis, valde convexa tranſverſe rugoſa: coſtis* 20-23 *convexis interdum planiuſculis, hinc inde nodoſis, altero latere majoribus.*

Iſo-

Isocardia. 12. C. testa cordata: sulcis squamis fornicatis imbricatis. *Mus. Lud. Ulr.* 487. *n.* 38. *
*List. Conch. t.* 323. *f.* 160.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 95.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 93.
*Rumpf mus. t.* 48. *f.* 9.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* M.
*Olear. gott. t.* 29. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 56,
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. p.* 39. *vign.*
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 174-176.
*Habitat in* mari americano, *testa* 2½ *pollices longa*, 2½ *lata, ex cinereo alba, hinc inde rubro maculata aut nebulosa, intus alba, medio purpurea, cardinis dente primario in altera valva unico.*

Fragum. 13. C. testa subcordata subangulata: sulcis notatis lunulis elevatis *Mus. Lud. Ulr.* 488. *n.* 39.
*Rumpf mus. t.* 44. *f.* G. Fragum album.
*List. Conch. t.* 315. *f.* 152.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 374.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 110.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 21.
*Gualt. test. t.* 83. *f.* E.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 3. *f.* 3. 4.
*Schroet. Journ. Naturg.* 3. *t.* 2. *f.* 6.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 166. 167.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
γ) *Gualt. test. t.* 71. *f.* N.
*Habitat in* India, *medio affine, at testa magis trigona, alba, squamis sulphureis, intus nivea, costis planiusculis; an mera unedinis varietas?*

unedo. 14. C. testa subcordata: sulcis lunatis coloratis.
*Mus. Lud. Ulr.* 488. *n.* 40.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* N. Fragum.
*List. Conch. t.* 315. *f.* 151.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 375.

*mus.*

*muſ. Kirch.* 2. *f.* 109.
*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* F.
*Petiv. amb. aq. t.* 17. *f.* 4.
*Valent. abh. t.* 16. *f.* 23.
*Gualt. teſt. t.* 83. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 12.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 25.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 168. 169.
ε) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 3?
*Habitat rarior in* India, *frago valde affine, at teſta duplo majore, ſulcorum ſquamis rubris rariori-bus, vulvaeque labio altero alteri incumbente di-ſtinctum.*

muricatum. 15. C. teſta ſubcordata ſulcata lateribus muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 41. *
*Liſt. Conch. t.* 322. *f.* 159. & *t.* 326. *f.* 163.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 177. 178.
*Habitat in* Oceano americano, *praeſertim ad ſi-num* Campechienſem, *teſta margine ſerrata, cinerea, alba aut flavicante ſpadiceo mixta aut maculata, cardine intus virgis* 2 *rubris.*

magnum. 16. C. teſta oblonga: ſulcis angulatis latere ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 42. *.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 19. *f.* 191.
ε) *Liſt. Conch. t.* 331. *f.* 168.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 92.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 90.
ν. *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 3. *f.* 6. 7.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 179.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* H.
ν. *Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 3. *f.* 10.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 17. *f.* 180.
δ) Basket Cockle. *Martyn univ. conchol.* 2. *t.* 80.
*Habitat in* India, β) *in* Jamaica & *inſulis* Antillis, te-

*testa margine ferrata, sulcis 19, 27, 30 transverse rugosis aspera, flavescente, intus alba, β) ochroleuca maculis spadiceis varia, γ) cinerea maculis nigricantibus conspersa.*

flavum. 17. C. testa subovata sulcata: latere anteriore scabro, posteriore dentato. *Mus. Lud. Ulr.* 490. *n.* 43.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 72.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 79.
*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 11. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 5.
γ) *Gualt. test. t.* 71. *f.* G.
δ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 89.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 87.
ε) *Rumpf mus. t.* 44. *f.* E.
*Petiv. amb. aq. t.* 8. *f.* 3.
*Habitat in* India, *testa dorso & posterius utplurimum flava, interdum maculata, ceterum, ut quoque, alba; costis circiter 27 convexis, quarum 5-6 anterius spinis acutis 12-13 posterius tuberculis planis scabrae, reliquae laeves.*

lævigatum. 18. C. testa obovata: striis obsoletis longitudinalibus. *Mus. Lud. Ulr.* 490. *n.* 44. *
*List. Conch. t.* 249. *f.* 83.
*Gualt. test. t.* 82. *f.* A.
*Knorr. Vergn.* 2. *t.* 20. *f.* 4. 5. *t.* 10. *f.* 7. & 6. *t.* 6. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 189.
β) *Kaemmer Conch. Rudolst. p.* 210. *t.* 12. *f.* 4?
γ?) Eggcockle. *Mart. univ. conch.* 2. *t.* 79.
*Habitat in* mari atlantico, & americano, *flavo affine, testa glabra, margine intus ferrata, ultra 2 pollices longa, 1¾ lata, sulphurea, aurantia, rubra, variegata, alba, alba flavo, aut rubro mista, aut fasciis transversis flavis picta;* ε) *nivea anterius rubella, intus a cardine deorsum ma-*

*maculis duabus purpureis oblongis, exterius lineis aureis picta, tenui, utrinque glabra.*

ferratum. 19. C. testa obovata lævi: striis obsoletis, margine interiore serrato. *Mus. Lud. Ulr.* 491. *n.* 45.* *Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 185. 186.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *laevigato minor, testa flava minus convexa, & obsoletius striata, margine exteriore crenulato, natibus regularibus.*

edule. 20. C. testa antiquata: sulcis viginti sex obsolete recurvato imbricatis. *Fn. Suec.* 2141. *It. oel.* 2. *Mull. zool. dan. prodr.* 2972.
*Bast. ap Subs.* 2. *p.* 72. *t.* 8. *f.* 3. 4.
*List. Conch. t.* 333. *f.* 170. & *t.* 334. *f.* 171. *an. angl. t.* 5. *f.* 34.
*Gualt. test. t.* 71. *f.* F.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 8. *f.* 2. 4.
*Chemn. Conch.* 6. *p.* 141. *Vign.* 4. *f.* C. & *t.* 19. *f.* 194.
*Habitat frequentissimum in* Oceano europæo, mari balthico, caspio, mediterraneo, *testa non admodum convexa, sordide alba, rarius caerulea, aut flava, sulcis ad* 30 *transverse striatis rugosisque; incola esculentus.*

islandicum. 21. C. testa sulcata: costis ad triginta sex triquetris lævibus.
*Chem. Conch.* 6. *t.* 19. *f.* 195.
*Habitat in* Islandia & Groenlandia, *eduli perquam affine, at sulcis testae pluribus & profundioribus, striis transversis, praeter marginem exteriorem, nullis distinctum, testa sordida nigricante, nonnunquam fasciata.*

groenlandicum. 22. C. testa antiquata glabra tenui murina: lineis angulatis ferrugineis picta, margine glabra: striis longitudinalibus obsoletis. *Chemn.*

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 19. *f.* 198.
*Habitat in* Groenlandia & Islandia, *testa ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa & ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices lata, fasciis interdum fuscescentibus picta; an mera edulis varietas?*

rusticum. 23. C. testa antiquata: sulcis viginti remotis; interstitiis rugosis.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 77. 78.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 19. *f.* 197.
*Habitat in* maribus europæis, *praecipue* mediterraneo, *etiam* caspio, *eduli affine*, *ac testa anterius valvis clausis carinata, ano evidente, sed angusto, sulcis profundioribus, costis paucioribus magis convexis distinctum, testa nunc ferruginea fasciis lividis, nunc alba, anterius fusca intus caerulescente, nunc alba fasciis ferrugineis flavicantibus aut caerulescentibus.*

glaucum. 52. C. testa subantiquata anterius glauca: sulcis viginti posterius retrorsum imbricatis, natibus violaceis. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 13.
*Habitat ad* Barbariæ littora, *ad* 10 *lineas altum*, $11\frac{1}{3}$ *latum*, & 8 *profundum.*

pectinatum. 24. C. testa subcordata pectinata. *Muf. Lud. Ulr.* 492. *n.* 47. *
*Murr. fund. teftac. t.* 2. *f.* 18.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testae albae striis distantibus sursum scabris, cavitate sub umbone flava, ano ovato impresso: marginibus prominulis.*

virgineum. 25. C. testa triangulo rotundata æquilatera: rugis transversis membranaceo recurvatis, cardinibus cæruleis.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 181.
*Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 5.

*Ha-*

*Habitat in* mari mediterraneo, ε) *in* indico & americano, *cardinis dentibus lateralibus ad marginem accedens, testa pulchella, fasciata, epidermide glauca obtecta, intus alba,* β) *testa tenui fragili longitudinaliter striata, anterius & ad vulvam purpurea, ad umbonem rubra.*

trilaterum. 26. C. testa triangulari gibba striata.
*Habitat in* Mari caspio; *an distincta species?*

Auricula. 27. C. testa cordata subrhombea: costis utrinque viginti quatuor; sulcis subtilissime crenulatis, natibus distantibus. *Forsk. Fn. arab. p.* 122. *n.* 52.
*Regenf. Conch.* 2. (*ined.*) *t.* 9.
*Habitat in* Arabia & Ægypto, *testa alba pellucida* 2¼ *pollicem longa,* 1¼ *lata, dorsi margine revoluto dentato.*

triste. 28. C. testa ovata lævi; rima anoque striatis. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 680. *n.* 74. *Mus. Lud. Ulr. p.* 491. *n.* 46.
*Habitat - - - testa laevi exolete cinerea, albo radiata, natibus reflexis.*

monstrosum. 29. C. testa gibba altero latere impressa ochroleuca, altero convexa cordata albida flavo maculata, valvis dentato carinatis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 14. *f.* 149. 150.
*Habitat rarissimum ad* insulas Nicobaricas.

Lima. 30. C. testæ gibbæ costis aculeatis: anterioribus tuberculis membranaceis recurvatis ad latera crenatis, sulcis intermediis granulatis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 15. *f.* 153. 154.
ε) *Chemn Conch.* 6. *p.* 161.
*Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 13. a. b. Cardium coronatum.

*Ha-*

*Habitat ad insulas* Nicobaricas, *testa ochroleuca: margine anteriore incarnato, umbone rubello; in β) costis magis rotundatis, non aculeatis, sed granulatis.*

ringens. 31. C. testa rotunda ventricosa alba: marginis dentibus profundis: anterioris roseis.
*List. Conch. t.* 330. *f.* 167.
*Adans. Seneg. t.* 18. *f.* 1.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 3. & 6. *t.* 3. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 16. *f.* 170.
*Habitat ad* Africæ *littus*, & *in* mari americano.

papyraceum. 32. C. testa pellucida cinerea: striis longitudinalibus tenuibus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 184.
*Habitat in* India, *testa fragillima, intus alba & purpurascenti maculata.*

æolicum. 33. C. testa crassa: striis anterioribus longitudinalibus, posterioribus transversis.
*List. Conch. t.* 314. *f.* 150.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 91.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 89.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* A.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2. *t.* 27. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 187. 188.
*Habitat ad* Guineæ & *insularum* Antillarum *littora, testa valde convexa, ex albo & rubello varia.*

oblongum. 34. C. testa flavicante oblonga turgida costata anterius glabra cordata margine crenata.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 19. *f.* 190.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 3. *f.* 8.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa ad* 3 *pollices longa, &* $2\frac{1}{2}$ *fere lata; costis* 30.

craſſum. 35. C. teſta ſubfuſca oblongiuſcula craſſa antiquata : marginis dentibus profundioribus.
*Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f. 12.*
*β) Liſt. Conch. t. 332. f. 169.*
*Habitat in* mari mediterraneo & ſeptentrionali, *oblongo affine, at teſta multo majore, minus anguſta, craſſiori, coſtis planioribus circiter 23 diſtinctum.*

latum. 36. C. teſta lata inæquilatera intus alba : coſtis magnis planis ſpinuloſis.
*Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 192. 193.*
*Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 6.*
*v. Born muſ Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. f. 9.*
*Habitat rarius* Tranquebariæ *& ad inſulas* Nicobaricas, *teſta 2 pollices longa, 2½ lata, nunc vertice alba, medio flavicante, margine flava, nunc vertice fuſco-varia, ceterum flavicante : faſciis nonnullis fuſcis.*

exiguum. 37. C. teſta oblongiuſcula inæqualiter coſtata ſubfuſca.
*Liſt. Conch. t. 317. f. 154.*
*Habitat - - - minutum, an diſtincta ſpecies ?*

maculatum. 38. C. teſta maculata confertim undulato-rugoſa: coſtis latis, ſulcis anguſtiſſimis intus dilute rubella.
*Liſt. Conch. t. 328. f. 165.*
*Habitat in* ſinu Campechienſi, *teſta 3 fere pollices longa, 3¾ lata.*

flexuoſum. 39. C. teſta rotundata fuſca : coſtis flexuoſis, ſulcis rugoſis.
*Liſt. Conch. t. 343. f. 180.*
*Habitat - - - teſta 1¾ pollices longa, & fere aeque lata.*

flu-

fluviatile. 40. C. testa planiuscula crassa alba : costis planioribus.
*List. an. angl. p.* 187. *t.* 5. *f.* 32.
*Habitat rarissimum ad* ostium fluvii Angliæ Tees.

gaditanum. 41. C. testa rotundata flavicante albo, rubro viridi fuscoque varia decussatim striata.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 63.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 62.
*Habitat in* mari Gaditano; *utrum hujus generis, an arcae?*

brasiliense. 42. C. testa rotundata : costis latis planis minutissime crenatis.
*Bonnan. recr.* 3. *f.* 395.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 117.
*Habitat frequens ad* Brasiliæ *littora.*

amboinense. 43. C. testa oblongiuscula alba nigricante-maculata : costis valde convexis.
*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 129.
*Habitat ad* Amboinæ *littora, testa* 1¾ *pollices longa : costis circiter* 12.

squamosum. 44. C. testa cordata æquilatera ex albo fulvida intus purpurascente, costis imbricatim squamosis.
*Gualt. test. t.* 71. *f.* N.
*Habitat - - - frago affine, at dentibus ad marginem testae anteriorem nullis.*

cancellatum. 45. C. testa subrubra tenui rotundata decussatim striata.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* B.
*Habitat - - - exiguum.*

rubiginosum. 46. C. testa rubella inæquilatera : costis convexis transversim striatis.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 83. *f.* D.
*Habitat* - - -

albidum. 47. C. teſta inæquilatera coſtata ſubalbida intus purpurea.
*Gualt. teſt. t.* 83. *f.* H.
*Habitat* - - - *puſillum.*

viresſcens. 48. C. teſta inæquilatera oblonga : coſtis ſubtilibus ; ſupra duplicatis.
*Gualt. teſt. t.* 84. *f.* A.
*Habitat* - - - *teſta fragili pellucida, ex albido virescente, maculis roſeis interdum varia, intus argentea.*

faſciatum. 49. C. teſta rotundata albida : faſcia fuſca, coſtis acutis.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 8. *f.* 3.
*Habitat* - - - *cardine exterius fuſco & cinereo.*

## 307. MACTRA. *Animal* Tethys.

*Teſta* bivalvis, inæquilatera æquivalvis.

*Cardo* dente medio complicato cum adjecta foveola, lateralibus remotis inſertis.

Spengleri. 1. M. teſta lævi : vulva plana, rima lunula hiante.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 20. *f.* 199-201.
*Spengl. catal. t.* 3. *f.* 1-3.
*Schroet. Litter.* 1. *f.* 4-6.
*Habitat ad* caput bonæ ſpei, *teſta manus fere magnitudine, ſubhiante, pallida, ſubdiaphana, ſubtriangulari,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata, latera anteriori ſubcarinata a limbis diſtincta, poſteriori planiuſcula ſtriata, vulva ad nates incurvas lu-*

*lunata, acuta, tota hiante in fossulam cardinis, c[illegible] dentes laterales trianguli.* L. Spengler.

plicataria. [illegible] testa transverse rugoso plicata diaphana, [illegible] planiuscula, ano compresso oblongo.
*Gualt. Conch. 6. t. 20. f. 202-204.*
*Habitat in* Oceano indico, *testa ovi latitudine, 1-1½ pollices longa, 1½-2½ pollices lata, alba, papyri instar tenui, vulva unoque laevibus lanceolatis, ima planiuscula, carina ab umbonibus distincta, hoc magis impresso, magis ovato, natibus incurvis recurvatis, cardinis dentibus lateralibus ex membranis 2 parallelis.*

papyracea. 3. testa pellucidissima alba convexa anteris subhiante subtiliter striata & costata
*Chemn. Conch. 6. t. 23. f. 231.*
*Habitat varissima ad insulas* Nicobaricas, *plicatariae affinis, at testa magis convexa & inaequilatera, ad tellinas accedens, sed cardine mactrae.*

striatula. 4. M. testa laevi diaphana: umbonibus subtriatis, vulva laevi impressa carina circumscripta.
*Gualt. test. t. 85. f. F.*
*Knorr Vergn. 6. t. 34. f. 1.*
*Chemn. Conch. 6. t. 21. f. 205. 206.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *& ad* littus Coromandel, *testa alba, ad 2½ pollices longa, & 3 lata, subtrigona, satis convexa, anterius subhiante: valva lanceolata, umbonibus striatis.*

striata. 5. M. testa crassa triangulari striis validis laevibus confertis arcuatis exarata.
*Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 222.*
*Habitat - - - testa alba, intus & ad umbones glabra.*

rotundata. 6. M. testa obtuse trigona albida, umbone lacteo-

fa-

fasciato, natibus vulva & margine interiore atque anteriore subviolaceis.
*List. Conch. t. 263. f. 99.*
*Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 8. f. 1.*
*β) List. Conch. t. 264. f. 100?*
*Habitat - - - glabratae affinis, at testa 1¼ pollicis longa & 1¾ pollicis lata, anterius angustiori striis subtilioribus exarata: margine tamen glaberrimo.*

glabrata. 7. M. testa laevi diaphana striata, umbonibus laevissimis, vulva anoque striatis.
*Gualt. test. t. 71. f. A.*
*Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 216. 217.*
*Habitat in* Oceano africano & indico, *testa alba, ad 1½ pollicem longa, & 2 pollices lata, natibus laevissimis; limbo striato, vulva nulla carina distincta.*

nitida. 8. M. testa nivea nitente crassa diaphana laevi, vulva carina distincta anoque convexiuscullis striatis.
*Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 8. f. 2. 3. p. 88.*
*Habitat - - - glabratae affinis, at testae natibus retroversis magis distantibus, rimaque triangulari distincta; testa triangulari.*

coralli- 9. M. testa laevi subdiaphana alba: fasciis lacteis.
na. *Bonann. recr. 2. f. 53.*
*mus. Kirch. 2. f. 52.*
*Rondel. test. 1. p. 32. t. 33.*
*Klein ostr. t. 12. f. 80.*
*Gualt. test. t. 71. f. B.*
*Planc. Conch. t. 3. f. 4?*
*Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 218. 219.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *& ad* Guineae *littora, testa 2 pollices lata, 1½ longa, triangulari, ano vulvaque obtusis, natibus non antiquis, rima triangulari.*

lactea. 10. M. testa tenui turgida pellucida alba anterius subtilissime striata : fasciis lacteis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 22. *f.* 220.
*Habitat rarior in* Oceano indico , *corallinae affinis & aequalis , at testa tenuiore , magis convexa , anterius planiuscula : margine obtuso.*

stultorum. 11. M. testa subdiaphana lævi obsolete radiata intus purpurascente , vulva gibba.
*Syst. nat. X. p.* 681. *n.* 8. Cardium stultorum.
*Adans. seneg. t.* 17. *f.* 16. Lisor.
*List. Conch. t.* 251. *f.* 85.
*Gualt. test. t.* 71. *f.* C.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 1.
*Murr. fund. testac. t.* 2. *f.* 10.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. p.* 50. *vign.*
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 23. *f.* 224-227.
*Habitat in* mari mediterraneo , atlantico & americano , *testa valde convexa , ceterum satis trigona , fusca , testacea , cinerea , ( utplurimum obsolete ) radiata.*

grandis. 12. M. testa subdiaphana lævi cervina pallide radiata: umbone & cardine extra medium positis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 23. *f.* 228.
*Habitat rarissima - - - m. stultorum affinis , at testa majore* $2\frac{1}{2}$ *pollicis longa ,* $3\frac{1}{4}$ *lata , angulo extremo subbiante , latere anteriore productiori.*

solida. 13. M. testa opaca læviuscula subantiquata. *Mull. zool. dan. prodr.* 2973.
*Fn. suec.* 2140. Cardium solidum.
*List. Conch. t.* 253. *f.* 87. 88.
*an. angl. t.* 4. *f.* 24.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 51. 52.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 50. 51.
*Klein ostr. t.* 10. *f.* 42.
*Rondel. test. l. c.* 7.

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 8. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 23. *f.* 229. 230.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 170. *f.* 1656.
*Habitat frequentissima in* Oceano europæo, *testa crassa, alba, flavescente, cinerea aut fusca, subantiquata, non raro cingulis lacteis aut fasciis caeruleis aliisve picta, cardinis dentibus lateralibus minus, quam in congeneribus, elongatis, foveola majore, & dente intermedio minore.*

lutraria. 14. M. testa ovali oblonga lævi, dentibus lateralibus nullis.
Mya lutraria. *Fn. suec.* 2128. *Mus. Lud. Ulr.* 470. *n.* 9.
*List. Conch. t.* 415. *f.* 259.
*an. angl. p.* 170. *t.* 4. *f.* 19.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 2. *f.* 19.
*Rumpf mus. t.* 45. *f.* M.
*Gualt. test. t.* 90. *f.* A. 2?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 240. 241.
*Habitat ad ostia fluviorum* Oceani europæi, *testa utrinque hiante,* 2¼ *pollices longa,* 4¼ *lata, robusta, sordide alba, antiquata, natibus convergentibus.*

Cygnus. 15. M. testa nivea crassa trilatera subtiliter transversim striata, anterius planiuscula subtiliter rugosa, ano lato impresso cordato tenuiter striato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 21. *f.* 207.
*Habitat rarissima ad* Tranquebariæ *littora, testa pollicem longa, & ultra pollicem lata.*

macu- lata. 16. M. testa obtuse trigona lævi tenui pellucide spadiceo maculata, intus alba tenuissime striata, ano cordato impresso.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 21. *f.* 208.
*Habitat rarissima in* Oceano indico, *testa circiter* 1½ *pollicem longa, &* 1¾ *lata.*

tur-

turgida. 17. M. testa inflata obsolete striata ochroleuca intus alba : natibus distantibus purpurascentibus, cardinis dente supernumerario triangulari duplici.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 21. *f.* 210. 211.

*Habitat ad* Tranquebariæ *littus, testa ad* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata tenui, subpellucida, anterius & posterius subtiliter striata & rugosa.*

violacea. 18. M. testa tenui obsolete radiata subtiliter transversim striata, vulva anoque albidis, cardinis dente supernumerario duplici triangulari.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 22. *f.* 213. 214.

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 2?

*Habitat ad* Tranquebariæ *littus, testa* 2 *fere pollices longa,* 3 *lata, tenera, fragili, hinc inde hiante, vulvae oblongae margine elevato rugoso.*

cuneata. 19. M. testa cuneata caerulea subtiliter transversim striata, margine intus crenulato.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 22. *f.* 215.

*Habitat - - - violaceae proxime affinis, at testa minore pollicem lata, vix pollicem longa, rarius nivea.*

glauca. 20. M. testa ovata sordide alba glauco radiata subtilissime transversim striata anterius rugosa.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 3. *f.* 11. 12.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 23. *f.* 232. 233.

*Habitat in* mari mediterraneo, *testa* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata : natibus retrorsum versis ; rima intermedia angusta.*

pellucida. 21. M. testa ovata tenui pellucida alba inæqualiter transversim striata.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 234.

*Habitat ad* Guineæ *littus, testa fragili,* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* 2 *lata, antrorsum productiore & paulisper hiante.*

fragilis. 22. M. testa ovata tenui lævi pellucida planiuscula, vulva transversim striata rugosaque.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 235.
*Habitat ad* insulas Nicobaricas, *pellucidae affinis, testa anterius hiante subplicata: margine acuto antrorsum subangulato posterius rotundato.*

rugosa. 23. M. testa ovata sordide alba, striis elevatis longitudinalibus transversas magis elevatas decussantibus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 236.
*Habitat in* Oceano europæo, *testa* 2¼ *pollicis longa*, 2¼ *lata*, *crassa*, *intus magis alba.*

nicobarica. 24. M. testa ovata tenui pellucida anterius lævi, posterius cancellatim striata.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 237.
*Habitat ad* insulas Nicobaricas.

complanata. 25. M. testa ovata tenui arcuatim plicata: plicis transversim striatis, dentibus lateralibus nullis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 24. *f.* 238.
*Habitat in* Oceano indico, *testa alba aut caerulescente pollicem longa*, 2¼ *lata.*

Listeri. 26. M. testa tenerrima subrotunda albida: foveola dentis cardinis triangularis ampla pyriformi.
*List. an. angl. t.* 4. *f.* 23.
*Habitat ad ostium fluvii* Angliæ Tees, *testa* 1½ *pollicem longa*, 2 *lata.*

piperata. 27. M. testa ovata compressa transverse striata: dentibus minimis; foveola magna obliquata.
*Poiret voyage en Barbar.* 2. *p.* 15.
*Bellon. aq. p.* 404. Piperata chama latinis.
*Aldrov. exang. p.* 421. Chama piperata Bellonii.
*Planc. Conch. p.* 32. Tellina vilior.
*Adans. Conch. p.* 232. *t.* 17. *f.* 18. Calcinella.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 21. Mya hiſpanica.
*Petiv. gazoph. t.* 9. *f.* 3.
*Habitat in* mari mediterraneo, 21 *circiter lineas lata*, 17 *alta*, 7 *profunda.*

308. DONAX. *Animal* Tethys.
*Teſta* bivalvis: margine (ſæpe) crenulato; antico obtuſiſſimo.
*Cardo* dentibus duobus; marginalique ſolitario (rarius duplici, triplici aut nullo) ſubremoto ſub ano.

Scortum. 1. D. teſta triangulo-cordata, vulva plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 493. *n.* 48. *
*Liſt. Conch. t.* 377. *f.* 220.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* L.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 7?
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 4. *f.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 25. *f.* 242-247.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta cinerea hinc inde violaceo miſta, intus praeter umbonem violaceum nivea, cardinis dente marginali altero ſub valva poſito, in alterutra valva duplici: foveola intermedia.*

pubeſcens. 2. D. teſta anterius ſpinis ciliata.
*Rumpf muſ. t.* 42. *f.* F?
*Chemn. Conch. t.* 25. *f.* 248.
*Habitat rarior in* Oceano indico, *teſtae colore interno cardinisque ſtructura ſcorto ſimilis, at teſta extrinſecus cinerea aut cinereo albida argute decuſſatim ſtriata, anterius plana: laterum angulo carinata, valva hiante ovata: nymphis nudis ano ovato-oblonga.*

rugoſa. 3. D. teſta anterius rugoſa gibba: marginibus cre-

crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 50. *
*Adanſon Seneg. t.* 18. *f.* 1. Paman.
*Liſt. Conch. t.* 375. *f.* 216.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 37. 38.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 36. 37.
*Gualt. teſt. t.* 89. *f.* F.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* L.
*Klein oſtrac. t.* 11. *f.* 61.
*Seba muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 10. 11.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 25. *f.* 250-252. *& p.* 242. *Vign.*
*Schroet. Journ.* 3. *t.* 2. *f.* 9.
*Habitat in* mari mediterraneo, atlantico, americano, *varietas rariſſima major in* indico. *teſta utplurimum* ¾ *pollicis longa*, 1¼ *lata*, *vario colore conſpicua*, *frequenter faſciata*, *intus violacea & alba*, *dente marginali nullo.*

Trunculus. 4. D. teſta anterius lævi intus violacea: marginibus crenatis. *Fn. ſuec.* 2142. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 51. *Mull. zool dan. prodr.* 2974.
*Adanſ. Seneg. t.* 18. *f.* 2. Gaſet.
*Liſt. Conch. t.* 376. *f.* 217.
*an. angl. t.* 5. *f.* 35.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 47.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 48.
*Gualt. teſt. t.* 88. *f.* O.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 39. b.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 7.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 4. *f.* 3. 4.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 253. 254.
*Habitat frequens in* maribus europeis, *etiam* atlantico & europæo, *teſtae colore externo vario, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis.*

ſtriata. 5. D. teſta anterius obtuſiſſima undique ſtriata: margine denticulato, vulva ovata.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 28. *f.* 8.

*Ha-*

*Habitat in* Europæ auſtralis Oceano, *teſta alba, & tota, exceptis natibus, gibba, magis, quam in congeneribus.*

denticulata. 6. D. teſta anterius obtuſiſſima: labiis tranſverſe rugoſis, margine denticulato, nymphis dentiformibus.

*Adanſ. Seneg. t.* 18. *f.* 3. Naſar.
*Liſt. Conch. t.* 376. *f.* 218. 219.
*Gualt. teſt. t.* 89. *f.* D.
*Knorr Vergn. 2. t.* 23. *f.* 2. 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 256. 257.
*β) Knorr Vergn. 2. t.* 23. *f.* 4. 5.
*Habitat frequens in* mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta cuneiformi, laevi, longitudinaliter punctato-ſtriata, alba albida, aut caeruleſcente, (2. ſtraminea, vulvae centro caeruleo, intus violacea) radiis faſciisve caerulescentibus interdum picta, intus albicante, vulva ſubrotunda minima, dente cardinis marginali altero ſub vulva.*

cuneata. 7. D. teſta cuneiformi: marginibus integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n.* 52. *
*Liſt. Conch. t.* 392. *f.* 231 ?
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 3.
*v. Born muſ. Cuef. Vind. teſt. p.* 52. *vign.*
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 260.
*β) Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 7.
*γ) Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 267 ?
*Habitat in* Tranquebariæ *littore, teſta alba interdum caeruleo radiata (2 flava aut rufa margine violacea) complanata pollicem longa, & 1¾ lata, anterius transverſim rugoſa: lineis perpendicularibus rugas decuſſantibus, ceterum ſubtiliter decuſſatim ſtriata, intus violacea & alba.*

Faba. 8. D. teſta gibba ſubtiliter transverſim ſtriata, ſua-

flavicante maculata: umbonis apice & fascia ad marginem externum integerrimum cæruleſcente, hac radio albo intercepta.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 266.
*Habitat* - - - *ſcriptae affinis, at teſta craſſiore, natibus verſus vulvam flexis, rima nulla, labiis clauſis diſtincta.*

ſcripta. 9. D. teſta ovata compreſſa lævi, ſcripta lineis purpureis undatis: rima acuta, marginibus crenulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n.* 53. *
*Adanſ. Seneg. t.* 17. *f.* 31. Sunet.
*Liſt. Conch. t.* 379. *f.* 222. & *t.* 380. *f.* 323.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 43.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 42.
*Rumpf muſ. t.* 43. *f.* L. M.
*Petiv. amb. aq. t.* 2. *f.* 7. & *t.* 18. *f.* 5.
*Gualt. teſt. t.* 88. *f.* Q.
*Klein oſtr. t.* 11. *f.* 59.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 4. 5.
*Murr. fund. teſt. t.* 2. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 261-265.
β) *Liſt. Conch. t.* 381. *f.* 224.
*Habitat frequens ad littora* Malabariæ & inſularum Xylanearum, *teſtae lineis angulatis, rubellis, caeruleſcentibus aut fuſcis pictae cardine ad veneres propius accedens.*

muricata. 10. D. teſta ovata: ſtriis muricatis, margine denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 496. *n.* 54. *
*Habitat in* Oceano indico, *teſta gibba ruſeſcente: rima hiante antrorſum utrinque dente compreſſo terminata, ano nullo.*

Irus.

---

*An diſtincta hujus generis ſpecies eſt, quam* Argenville *zoomorph. t.* 5. *f.* M. *depingendam curavit? Ad hoc genus referas quoque teſtas a* Chemnitzio *Conch.* 10. *t.* 172 *f.* 1668. 1669. *depictas.*

Irus. 11. D. testa ovali rugis membranaceis erectis striatis cincta.

*Gualt. test. t. 95. f. A.*

*Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 268-270.*

*Habitat in* mari mediterraneo, *cardine veneribus propior, testa phaseoli magnitudine alba, anterius obliquissima rugosa: rugis arcuatis, reflexo-erectis fere crispis; exterioribus senim anterioribus majoribus.*

lævigata. 12. D. testa anterius obtusa ad latera obsolete striata, ex viridi flavicante intus & ad nates violacea, margine integerrimo, cardinis dente marginali nullo.

*Chemn. Conch. 6. t. 25. f. 249.*

*Habitat rarior ad* Tranquebar, *testa 6 lineas ultra pollicem longa, & 3 ultra 2 pollices lata, vulvae unique labiis subincumbentibus.*

spinosa. 13. D. testa nivea intus cæruleſcente posterius lævi perpendiculariter striata, anterius truncata tenerrime cancellata, angulis subspinosis.

*Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 258.*

*Habitat rarissima ad* Tranquebariæ *littus, natibus glabris, cardine rugosam referens.*

incarnata. 14. D. testa incarnata anterius truncata reticulatim striata rugosaque, posterius cuneata striis tenerrimis perpendicularibus exarata.

*Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 259.*

*Habitat* Tranquebariæ, *testa interdum fasciis transversis flavicantibus hinc inde picta.*

argentea. 15. D. testa ovali lævi oleaginea intus argentea: marginis dentibus prope cardinem elatioribus acutis.

*Gualt. test. t. 88. f. R.*

*Habitat* - - -

bi-

bicolor. 16. D. testa ovata striis elevatis, pauciores transversas decussantibus exarata rufa: radio in altero latere albo.
*Gualt. test. t. 88. f. S.*
*Habitat* - - -

radiata. 17. D. testa striis confertis arcuatis transversis extrinsecus, perpendicularibus intus, rugas anterius inæquali fusca hyalino maculata.
*Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 104. t. 8. f. 3.* &
*Habitat* Tranquebariæ, *testa pollicem fere lata, ultra ½ longa, anterius minus obtusa radiis 2 albis picta, posterius rotundata: limbo albo, intus nivea luteo & caerulescente maculata, cardinis dente medio in altera valva unico obtuso, marginali in utroque duplici, margine integerrimo.*

straminea. 18. D. testa striis tenerrimis perpendicularibus anterius costas transversas decussantibus exarata straminea: fasciis transversis obscurioribus: margine spadiceo posterius integerrimo.
*Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 105. t. 8. f. 4. a. b.*
*Habitat* - - - *testa ultra pollicem longa & ½ lata intus incarnata antrorsum viridescea: parte anteriori limbo lato subconvexo distincta, natibus umbellis, cardinis dentibus marginalibus in utraque valva 2.*

candida. 19. D. testa tota candida striis teneris rarioribus arcuatis transversis antrorsum obliquis, cardinis dentibus mediis tribus obliquis, margine integerrimo.
*Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 106. t. 8. f. 5.*
*Habitat* Tranquebariæ, *testa ¾ fere pollicis longa, & paulo latiore, tenui, fragili, inter ovatam & cuneatam quasi media, anterius medio elevatiori, striis marginem versus in rugas abeuntibus.*

309. VENUS. *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis ; labiis margine antico incumbentibus.

*Cardo* dentibus trifvis : omnibus approximatis ; lateralibus apice divergentibus.

*Vulva & Anus* distincta.

* *Pubentes.*

Dione. 1. V. testa subcordata transverse sulcata , pube spinosa. *Mus. Lud. Ulr.* 497. *n.* 55. *

*List. Conch. t.* 307. *f.* 140.
*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 121.
*Rumpf mus. t.* 48. *f.* 4.
*Olear. mus.* 29. *f.* 4.
*Pet. gaz. t.* 31. *f.* 9.
*Lochner mus. Besler. t.* 21. *f.* 11.
*Gualt. test. t.* 76. *f.* D.
*Lesser testaceoth. f.* 134.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* I.
*Murray fund. testac. t.* 2. *f.* 11. 16. 17.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 4. *f.* 3. 4.
*delic. nat. sel. t.* B. V. *f.* 9.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. p.* 57. *vign. f.* a.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 271-273.
*Schroet. Litterat.* 1. *f.* 1. 2.
*Habitat rarior & pretiosa in* Oceano americano.
*Venerem filiam Dionis s. e concha maris natam finxere poetae ; hujus typus praecipue determinabit conchyarum partium metaphoricam denominationem.*

TESTA *bivalvis , aequivalvis , semicordata , rotundata , subincarnata , posterius & anterius magis gibba umbonibus undique exaratis* striis *transversis , distantibus , parallelis , marginatis , subrecurvatis aequalibus : exterioribus obtusioribus ,*

*po-*

*posterius alternis altioribus acutioribusque & abbreviatis minoribus.* INTUS *laevis, alba, sub umbonibus fornicata.* CARDO *sinistrae tridentatus: dentibus approximatis scrobiculo distinctis; denticulo intermedio compresso, angustiore: lateralibus divergentibus crassiusculis obtusis.* Dextrae *cardo denticulis duobus approximatis compressis inter scrobiculos duos.* MARGO *ambitus obtusissimus integerrimus.* NATES *recurvatae, obtusiusculae, apice glabrae.* ANUS *impressus, ovatus, laevis, incarnatus. Anterius* Pubes *ciliaris, utrinque, e natibus ad summum montis veneris, cingens vulvam spinis e striis alternis tertiisve testae ortis, subulatis, depressis, adscendentibus, antrorsum arcuatis, subtus canaliculatis, superioribus sensim longioribus, longissimis longitudine ipsius rimae.* VULVAE *regio incarnata, oblique striata sursum a rima ad pubem. Labia laeviora, incarnata, inclusa fascia pallida, armata, a natibus ad medium rimae aculeis utrinque quinque brevissimis; margo vulvae supra rimam connivet sulco longitudinali, intra quem sinistrae margo gibbosior se insinuat.* Rima *lanceolata, hians labris prominulis, clausa hymene.* NYMPHAE *cartilagineae, retractiores, longitudine rimae.*

Paphia. 2. V. testa subcordata: rugis inaequalibus, pube rugis attenuatis, labris complicatis.

*List. Conch. t.* 279. *f.* 116.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 75.
*muf. Kirch.* 2. *f.* 72.
*Rumpf muf. t.* 48. *f.* 5.
*Valent. Abh. t.* 16. *f.* 29?
*Spengl. felt. Conch. t.* 1. *f.* I.
*Gualt. teft. t.* 85. *f.* A.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* B.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 28. *f.* 2. & 6. *t.* 5. *f.* 6. & *t.* 6. *f.* 2. *Re-*

*Pegenf. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 11.
*Chemn. Conch* 6. *t.* 27. *f.* 274-276.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 277.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 6.
*Habitat ad insulas* Americæ *oppositas*, *testa alba*: *maculis*, *striis*, *nebulis*, *anterius lineis angulatis subfuscis picta*, *ultra* 2 *pollices longa*, $1\frac{3}{4}$ *lata*, *ano fusco*, *costis transversis latis convexis.*

Marica. 3. V. testa subcordata decussatim striata, pube lamellosa. *Mus. Lud. Ulr.* 497. *n.* 56. *
*List. Conch. t.* 280. *f.* 118 ?
*Argenv. zoom. t.* 12. *f.* C.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 282-286.
*Habitat rarissima in* Oceano americano, *testa alba*, *exterius radiis maculis venisque ex fusco rubelli picta*: *margine crenulato.*

Dysera. 4. V. testa subcordata: sulcis transversis remotis reflexis margine crenulato. *Mus. Lud. Ulr.* 498. *n.* 57. *
*List. Conch. t.* 277. *f.* 114. *t.* 278. *f.* 115. *t.* 285. *f.* 122. a.
*Benanm. recr.* 3. *f.* 348 ?
*mus. Kirch.* 2. *f.* 103.
*Gualt. test. t.* 88. *f.* D.
*Klein. ostrac. t.* 10. *f.* 48. 49.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 24. *f.* 3 ? 6. *t.* 10. *f.* 2 ? 2. *t.* 28. *f.* 3.
*Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 8.
*Born mus. Caes. Vind. test. t.* 4. *f.* 9 ?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 279 ? 280 ? 281 ? & *t.* 28. *f.* 287-294.
β) *List. Conch. t.* 280. *f.* 117 ?
*Habitat in* Oceano americano, *varior & speciosior in* indico, *testa colore & pictura varia costis tenuibus saepius acutis inaequali.*

Ba-

Bajana. 5. V. testa fragili glabra : striis transversis rarioribus.
*Bonann. musf. Kirch.* 2. *f.* 124. 125.
*Habitat in* Brasiliæ *littore, testa ochroleuca nigrovaria.*

excavata. 83. V. testa lentiformi transversim striata : ano profunde impresso cordato, vulva lata.
*Schroet. Init. in Conch.* 3. *p.*167. *n.* 34. *t.*8. *f.*10.
*Habitat* - - - *sinuatae similis, at striis testae acutis subtilioribus, anterius & posterius in rugas abeuntibus, colore ex fusco luteo aut ex albo cinereo, pube squamoso-spinosa distincta.*

** *impuberes.*
† *Subcordatae.*

verrucosa. 6. V. testæ sulcis membranaceis striatis antrorsum inprimis verrucosis, margine crenulato.
*Adans. Senег. t.* 16. *f.* 1. Cloniffe.
*Lift. Conch. t.* 284. *f.* 122.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* H.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* 60.
*v. Born. musf. Caes. Vind. test. t.* 4. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 29. *f.* 299. a. 299. b. 300.
*Habitat in* mari mediterraneo, *ad* Angliæ, Antillarumque *littora, paphiae affinis, testa crassa, 2 pollices longa & aeque lata flavicante, maculis radiisque paucis fuscis varia.*

Lapicida. 148. V. testa alba, antrorsum longitudinaliter, posterius transversim striata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 356. *t.* 172. *f.* 1664. 1665.
*Habitat ad insulas* Americæ *media obversas, coralia lapidesque calcareos rodere perhibita.*

divergens. 147. V. testa alba : striis subtilissimis divergentibus densissimis.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 10. *p.* 357. *t.* 172. *f.* 1666. 1667.
*Habitat ad* insulas Americæ *mediae obversas.*

Cafina. 7. V. testæ sulcis transversis recurvis acutis, margine posteriori crenulato: pone anum canaliculato.
*List. Conch. t.* 286. *f.* 123.
*Chemn. Conch.* 6. *t* 29. *f.* 301 ? 302 ?
*Schroet. Eind. in Conch.* 3. *p.* 115. *t.* 8. *f.* 6.
*Habitat rara in* Oceano europæo, *frequentius fossilis, testa alba maculis striis, vibicibus subfuscis varia, ano fusco, umbonibus rubellis.*

cancellata. 8. V. testa striis transversis membranaceis remotis, ano cordato. *Mus. Lud. Ulr.* 506. *n.* 71.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 39. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 6. *t* 13. *f.* 137-138. *t.* 29. *f.* 304-307.
*Habitat rara in* Oceano indico, *testa ultra pollicem longa & ultra* 1½ *lata, cinerea: radiis nonnullis exoletis fuscis, intus rubra aut subfusca, striis interdum quoque longitudinalibus exarata, margine crenulato.*

Gallina. 9. V. testa radiata: striis transversis obtusis, cardinis dente posteriore minimo, margine crenulato. *Fn. Succ.* 2143. *Mull. zool. dan. prodr.* 2975.
*List. Conch. t.* 281. *f.* 119. *t.* 282. *f.* 120. *t.* 295. *f.* 131.
*Klein. ostr. t.* 10. *f.* 54.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 39. C ?
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 14. *f.* 2-5.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. p.* 57. *vign. f.* b.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 30. *f.* 308-310.
ε) *List. Conch. t.* 295. *f.* 132 ?
*Habitat in* Oceano americano & maribus europæis, *testa crassa, planiuscula, pollicem longa & 1¼ lata, glaberrima colore varia, radiis ut-*

*Plu-*

*plurimum 3 subfuscis aut rubellis : intermediis interdum lineis angulatis , ano cordato fusco , vulva lineis maculisque fuscis varia.*

guineensis. 10. V. testa cinerea intus nivea : striis transversis acutis : vulvæ margine albo labiisque subtiliter striatis roseis : margine integerrimo.
*Chemn. Conch. 6. t. 30. f. 311.*
*Born mus. Cæs. Vind. test. t. 4. f. 8.*
β) *Chemn. Conch. 6. t. 34. f. 312.*
*Habitat in* Africæ *littore* occidentali , *gallinae affinis testa hinc inde dilute rubello mista : striis elevatis validis non ramosis , ano cordato.*

Petulca. 11. V. testa subsulcata : margine crenulato , vulva subovata hiante , nymphis acutis.
*Habitat in* Oceano Europæ australioris , *testa avellanae magnitudine albo fuscoque nebulosa : ano oblongo.*

flexuosa. 12. V. testæ sulcis transversis obtusis , vulvæ labiis angulo elevato distinctis.
*Rumpf mus. t. 43. f. A ? O ?*
*Gualt. test. t. 83. f. I.*
*Born mus. Cæs. Vind. test. t. 4. f. 10.*
*Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 333. 334.*
*Habitat in* Oceano americano & indico , *testa pollicem longa , & 1¼ lata , albida rufo-punctata , aut radiata , aut cinerascente maculis striisque subfuscis , ( rarius nivea vulva anoque nigris , cardine caeruleo , ) striis transversis vix crenatis vulvam versus bifidis , vulva retusa , rufa , obliqueque striata : angulis lateralibus elevatis & gibbis , margine vix manifeste crenulato.* Solander.

Erycina. 13. V. testa transversim parallele sulcata : sulcis obtusissimis , vulva glabra , ano ovato.
*List. Conch. t. 208. f. 104.*

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 32. *f.* 337-339.
*Habitat in* India, *Chionae affinis, testa craſſa planiuſcula, 2¼ pollicis longa & 2¾ lata & majore, incarnata; radiis pluribus fuſcis & marginem verſus fuſcia aurantia picta, ano aurantio, vulvae rima anguſta longa hiante, cardinis dentibus mediis 4.* J. Th. Fagræus.

mercenaria. 14. V. teſta ſolida tranſverſe ſubſtriata lævi: margine crenulato, intus violacea, ano ovato.
*Fn. ſuec.* 2144. *Mull. zool. dan. prodr.* 2976.
*Liſt. Conch. t.* 271. *f.* 107.
*Spengl. Schr. der berl. Naturf.* 6. *p.* 307. *t.* 6. *f.* 1-3.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 171. *f.* 1659. 1660.
*Habitat in* Europæ & Americæ Oceano ſeptentrionali (*in* Sueciæ *montibus foſſilis*), *teſta ultra* 3 *pollices longa, & perinde fere lata, ovata, anterius anguſtata, ſub epidermide fuſca ſtramínea ſubtus & antrorſum radiis violaceis picta, ſtriis ſemicircularibus elevatis tranverſis ſulcisque longitudinalibus ſubaſpera: ano cordato impreſſo longitudinaliter ſtriato, vulva glabra: Penſylvaniae incolis olim inſtar numi.*

islandica. 15. V. teſta tranſverſim ſtriata rudi, nymphis hiantibus, ano nullo. *Mull. zool. dan.* 1. *p.* 95. *t.* 28. *f.* 1-5. *prodr.* 2977. *rar.* 1. *p.* 58. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 411. *n.* 412.
*Brit. zool.* 4. *p.* 80. *t.* 53. *f.* 47.
*Liſt. Conch. t.* 272. *f.* 108.
*anim. angl. p.* 173. *t.* 4. *f.* 22.
*Petiv. muſ. n.* 832.
*Gualt. teſt. t.* 58. *f.* B.
*Coſta britt. Conch. p.* 183. *t.* 14. *f.* 5.
*Olaff. isl.* R. 1. §. 98. *t.* 11. *f.* 8. §. 239. 577. 901. *f.* 2.
*Strœm. ſondm.* 1. *p.* 201. *n.* 9.

*Born muſ. Cæſ. Vind. teſt. t. 4. f. 11.*
*Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 341.*
*ε) Liſt. Conch. t. 1057. f. 3.*
*γ) Chemn. Conch. t. 32. f. 342.*
*Adanſ. Senegal. t. 16. f. 7. Pitar.*
*Habitat in* Oceano Europæ ſeptentrionali, *ε) in* mari caſpio, ) *in* africano, *teſta 3½ pollices longa, & 4 fere lata, craſſa epidermide tenui fuſcedante tranſverſim ſtriata, junioribus flava, adultioribus fuſca obtecta, alba faſciis rubellis tranſverſis picta, intus tota alba: margine acuto integerrimo, vulva longa anguſta clauſa; animal lylandis eſculentum piſciumque eſca fulvum ſubquadratum: pallio pallido, apertura utraque tentaculis cincta.*

Chione. 16. V. teſta tranſverſe ſubrugoſa lævi, cardinis dente poſteriori lanceolato. *Muſ. Lud. Ulr. 500. n. 58.* *

*Liſt. Conch. t. 269. f. 105.*
*Bonann. recr. 2. f. 64. 65.*
*muſ. Kirch. f. 63. 64.*
*Gualt. teſt. t. 86. f. A.*
*Argenv. Conch. t. 21. f. C.*
*Regenf. Conch. 1. t. 8. f. 17.*
*Knorr Vergn. 6. t. 4. f. 1.*
*Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 343.*
*ε) Rumpf muſ. t. 42. f. G.*
*Pet. aq. amb. t. 18. f. 20.*
*Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 340.*
*γ) Chemn. Conch. 6. t. 33. f. 344.*
*Habitat in* mari britannico, mediterraneo, atlantico, ε) *ad* Sinæ & Japoniæ *littora*, γ) *in* Indica *teſta 2½ pollices longa, & 2¼ lata ſubfuſca picta cervina radiis utplurimum obſcurioribus picta: margine integerrimo*; γ) *teſta glaberrima nivea: lineis anguſtiſſimis obſcure rubellis.*

ma-

macu-lata. 17. V. testa lævi : maculis exoletis sparsis. *Mus. Lud. Ulr.* 500. *n.* 59. *

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 15. Jouret.
*List Conch. t.* 270. *f.* 106.
*Gualt. test. t.* 86. *f.* J.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* H.
*Knorr. Vergn.* 2. *t.* 28. *f.* 5. & 5. *t.* 20. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 16.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 345.
*Habitat frequens in* Oceano americano, *Chiondae affinis, at testa minore* 1½ *pollicem longa*, 2¼ *lata, alba, subfusca, aut ex fusco viridi, maculis fuscis aut spadiceis, interdum radiis* 2 *interruptis varia, cardinis dente posteriori brevi, crasso, obtuso.*

Meretrix. 18. V. testa glabra : vulva fusca gibba ; nymphis hiantibus. *Mus. Lud. Ulr.* 501. *n.* 60. *

*Gualt. test. t.* 76. *f.* C.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* F.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 6. *f.* 3.
*Schroet. Journ.* 3. *t.* 2. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 347-352.
ε) Venus paradoxa. *Born mus. Caes. Vind. test. t.* 4. *f.* 12. 13.
*Habitat rarior in* Oceano indico, *praesertim ad ostia fluviorum, sat spectabilis, testa crassa, convexa, glaberrima, nunc alba, nunc fusca radiis nunc picta, nunc nullis intus alba : margine anteriore caeruleſcente, ano non distincto, margine testae integerrimo.*

Læta. 19. V. tumida glaberrima albo-radiata : labris subviolaceis.

*Gualt. test. t.* 88. *f.* V.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 24. *f.* 2. & 6. *t.* 10. *f.* 5.
*Schroet. Hal. in Conch.* 3. *p.* 127. *t.* 8. *f.* 7.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *testa pe-*

*ne 1¼ pollicem longa, 1½ lata, nitente, flavicante, radiis nunc albis, nunc caeruleſcentibus, nunc ſubfuſcis, vulva oblonga infra acuminata, impreſſa, glabra, albo caeruleoque varia, ano ſubcordato impreſſo albo.*

caſtrenſis. 20. V. teſta triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inſcripta. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 61. *

*Liſt. Conch. t.* 257. *f.* 92. 93. *t.* 258. *f.* 94. *t.* 259. *f.* 95. *t.* 262. *f.* 98. *t.* 287. *f.* 123. a.

*Bonann. recr.* 3. *f.* 376. 378.

*muſ. Kirch.* 2. *f.* 126. 311. 312.

*Rumpf muſ. t.* 42. *f.* K.

*Valent. Abh. t.* 15. *f.* 16.

*Petiv. amb. aq. t.* 5. *f.* 2.

*Gualt. teſtac. t.* 82. *f.* G. H.

*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* M.

*Leſſer teſtaceoth. f.* 108. 109.

*Knorr l'ergn.* 1. *t.* 21. *f.* 5. 2. *t.* 20. *f.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 4. & 6. *t.* 6. *f.* 5. 6.

*Regenf. Conch.* 1. *t.* 1. *f.* 3. 4. *t.* 4. *f.* 41.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 35. *f.* 367-381.

*Habitat in* Oceano indico & mari rubro, *teſta ad 1½ pollicem longa, 1¼ lata, ſtriis tranſverſis arcuatis ſubtiliſſimis exarata alba lineis fuſcis, ſpadiceis, luteis, triangula formantibus picta: margine integerrimo.*

Phryne. 21. V. teſta lævi anterius poſteriusque tranſverſe ſtriata; ano obcordato; venis violaceis.

*Habitat in* Oceano *magis* auſtrali.

Meroe. 22. V. teſta ovata compreſſa tranſverſe ſtriata: ſutura poſterius hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 62. *

*Liſt. Conch. t.* 378. *f.* 221.

*Argenv. zoomorph. t.* 12. *f.* B.

Knorr

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 2. 4. 6. 5. 6.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 43. *f.* 450-454.
*Habitat in* Oceano americano & indico, *testa* 1½ *pollicem longa*, 2¼ *lata*, *aut alba lineis maculisque angularibus caeruleſcentibus*, *fuſcis vel roſeis aut violacea*, *aut faſciis alternis caeruleis & flammeis picta*, *intus alba*, *ſtriis tranſverſis exarata*, *natibus diſtantibus*, *vulva exciſa*, *margine denticulato*.

minuta. 23. V. teſta ſubovata tranſverſim ſtriata ſubpellucida, nymphis clauſis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 412. *n.* 413.
*Habitat frequens in* ulvis foliaceis maris Islandiam alluentis, *islandicae affinis*, *teſta* 1-2 *lineas lata*, ¾-1½ *lineas longa tenera*, *fragili*, *oblonga exterius ex fuſco violacea*: *limbo albicante*, *intus alba*, *ſtriis longitudinalibus nullis*.

defloratа. 24. V. teſta ovali longitudinaliter rugoſa anterius violacea, nymphis atris.
*Liſt. Conch. t.* 425. *f.* 273.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 17?
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 20. *f.* 5. & 5. *t.* 11. *f.* 2. & *t.* 21. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 79-82.
β) Tellina arenoſa. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 83.
*Rumpf muſ. t.* 45. *f.* C.
*Petiv. arab. aq. t.* 17. *f.* 9.
*Gualt. teſt. t.* 85. *f.* G.
*Habitat in* mari atlantico & americano, β) *in* indico, *teſta ſolida ad* 2 *pollices longa*, & 3 *lata*, *magis longitudinalibus* (*in* β) *medio hiſtis*) *ſtrias tranſverſas teneras decuſſantibus inaequali*, *intus violacea* (β. *albida*) *exterius alba*, *cinerea*, *flavicante*, *rubella*, *vel caeruleſcente*, *aut radiis caeruleſcentibus rubellisve picta*, *cardinis dentibus in altera valva* 2, *in altera* 1 *fiſſo*.

fim-

fimbriata. 25. V. testa ovali gibba longitudinaliter striata transverse sulcata: margine crenulato. *Mus. Lud. Ulr.* 502. *n.* 63. *

*Argenv. conch. t.* 21. *f.* G. Chama scobinata.
*List. Conch. t.* 355. *t.* 172. & *t.* 1056. *f.* 1 ?
*Rumpf mus. t.* 43. *f.* F.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 8.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* C.
*Klein ostr. t.* 10. *f.* 52.
*v. Born. mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 7. *p.* 3. *vign.* 8. & *t.* 43. *f.* 448. 449.
β) *Rumpf mus. t.* 43. *f.* G. Tygers tong.
*Petiv. amb. ab. t.* 18. *f.* 10.
*Habitat in* Oceano indico, *testa solida, 2 pollices longa 3 lata, alba (3. sordide rubella margine nigricante, striis longitudinalibus nullis) rima oblonga hiante, ano impresso, cardinis dentibus 2 mediis, & 2 lateralibus.*

reticulata. 26. V. testæ striis elevatis decussatis, ano cordato, margine integro. *Mus. Lud. Ulr.* 503. *n.* 64. *

*List. Conch. t.* 836. *f.* 173.
*Gualt. test. t.* 83. *f.* L.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 10. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 382-384.
β) *Gualt. test. t.* 88. *f.* A.
*Habitat in* India, *fimbriatae affinis, at testa magis cordata, ut 2 pollices longa, 2½ lata sit, minus gibba, alba subfusco aut rubello nebulosa, interdum radiata aut maculata, striis tenuioribus, transversis magis arcuatis, ano cordato gibbo, cardinis dentibus 3;* β) *nunc fusco, nunc rubro maculata.*

squamosa. 27. V. testa reticulato-striata retrorsum squamosa.

*Rumpf mus. t.* 44. *f.* M.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 17.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 83. *f.* G.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 31. *f.* 335.
*Habitat in* India, *flexuoſae affinis, teſta flavicante aut ferrugineo, vulva ſubglabra impreſſa oblongo-ovata venis lineisque caeruleis varia, ano fuſco, intus albo, margine crenato.*

Puerpera. 28. V. teſta ſubrotunda: ſtriis membranaceis decuſſatis, labiis flexuoſis. *Mant.* 2. *p.* 540.
*Gualt. teſt. t.* 76. *f.* G.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* F.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 10. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 30. *f.* 388. 389.
*γ) Liſter Conch. t.* 341. *f.* 178.
*Habitat rara in* India, *reticulatae affinis, at teſta magis rudi, ſolida, convexaque, ano plano vix impreſſo, exterius maculis, lineis, vibicibus fuſcis varia, antrorſum fuſca, intus caerulea.*

tripla. 29. V. teſta ſubtriangulari lævi, anterius & poſterius retuſa. *Mant.* 2. *p.* 545.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 108. *f.* 4. Tivel.
*Liſt. Conch. t.* 252. *f.* 86.
*Gualt. teſt. t.* 75. *f.* Q.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 31. *f.* 330-332.
*ε) Knorr Vergn.* 6. *t.* 6. *f.* 4.
*Habitat in* Africae *littore* occidentali, *β) in* mari mediterraneo, *teſta circitee pollicem longa,* 1¼ *lata, ſtriis transverſis tenerrimis exarata rubella, ex fuſco lutea, alba, aut cinerea: radiis interdum 2 fuſcis, γ) ex fuſco lutea, labiis caeruleſcentibus, ani ſtriis magis obſoletis, quam vulvae.*

plicata. 30. V. teſtae ſtriis transverſis membranaceis arcuatis, ano rubello, cordato: labiis obliquis.
*Argenv. Conch. t.* 21 *f.* k.
*Valent. Abh. t.* 15. *f.* 21.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 28. *f.* 295-297.
*Habitat rara & pretiosa in* mari indico, *e) in mediterraneo, testa dilute incarnata: umbone albido, vulva saturatius rubra, glabra, profunda, rima ampla, oblonga, hiante.*

rugosa. 31. V. testæ gibbæ striis transversis membranaceis arcuatis, ano cordato, margine crenulato.
*Mant.* 2. *p.* 545.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 29. *f.* 303.
*Habitat rarior in* India, *testa crassa ultra 2 pollices longa & lata, ex cinereo alba, maculis oblongis spadiceis varia: vulva oblonga subimpressa, in sinistra valva glabra fusco alboque varia: rima oblonga ampla hiante.*

Calliste. 32. V. testæ striis transversis acutis antrorsum membranaceis: vulva breviore, ano inconspicuo.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 156. *t.* 8. *f.* 8. 9.
*Habitat in* mari rubro; *guinceensi affinis, testa anterius exterius caeruleascente intus saturatius tincta, posterius utplurimum sordide alba.*

granulata. 33 V. testa rotundata decussatim striata anterius & margine crenulato violacea.
*Born. mus. Caes. Vind. test. t.* 4. *f.* 5. 6.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 30. *f.* 313.
*Habitat in* Oceano americano, *maricae affinis, at vulva glabra nunc livida nunc albo & caeruleascente varia, testa ipsa alba maculis lineisque angularibus lividis aut nigris varia, ano cordato impresso nigricante aut caeruleascente.*

imbricata. 34. V. testæ costis perpendicularibus imbricatis transversim striatis, margine crenato.
*List. Conch. t.* 497. *f.* 52.
*Chemn. Conch.* 6. 30. *f.* 314. 315.

Ha-

*Habitat in* Campania Gallorum *fossilis*, *cardine venerem*, *reliquo habitu cardium referens.*

divaricata. 35. V. testæ striis transversis teneris longitudinales marginem versus divergentes decussantibus, ano ovato, margine crenato.
*List. Conch. t.* 310. *f.* 146.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 30. *f.* 316.
*Habitat* - - - - *testa alba*, *lineis*, *venis maculisque fuscis varia*, *vulva oblonga hiante*, *venosa*, *ex atro subfusca*, *cardinis dentibus* 4.

contraria. 36. V. testa oblonga planiuscula: striis transversis posterius contrariis, margine crenato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 30. *f.* 317-319.
*Habitat ad* Guineæ *littora*, *cardio aeolico affinis*, *testa versicolore*, *vulvae anique margine interiori nigro maculato.*

Gallus. 37. V. testa oblongo-ovata radiata: striis transversis confertis crassis, vulva lata ovata, ano cordato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 31. *f.* 324. 325.
*Habitat ad* Malabariæ *littus*, *testa* 1½ *pollicem longa & ultra* 2 *lata*, *in junioribus cinerea*, *in adultioribus flavicante*: *radiis* 4 *obscurioribus.*

flammea. 38. V. testa transversim striata dorso glabra: vulva latissima anoque cordato fusco-linearis.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 12.
β) Gallus radiatus. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *n.* 146.
*Habitat in* mari rubro, *gallo affinis*, *at testa umbonem caeruleascentem versus magis gibba alba vibicibus*, *lineis maculisque cinereis varia*, *in* β) *radiis* 3 *subfuscis picta.*

Corbicula. 39. V. testa triangulari lævi utrinque truncata flavi-

vicante-radiata, vulva anoque cordatis, margine integerrimo.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 2. & 6. *t.* 10. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 31. *f.* 326.
*Habitat rara in* mari atlantico & americano, *vulva subspadicea rima ampla hiante.*

hermaphrodita. 40. V. testa triangulari glaberrima olivacea obscure fasciata intus alba vel cæruleſcente, vulva cordata, ano ovato.
*Martin.* 1. *Manigf.* 1. *p.* 402. *t.* 1. *f.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 31. *f.* 327-329.
*Habitat rariſſima in* Guineæ *fluviis, testa crassa rudi, natibus convergentibus, cardinis dentibus crenatis.*

coaxans. 41. V. testa viridi intus alba: striis transversis inæqualibus membranaceis, margine acuto.
*Rumpf muſ. t.* 42. *f.* H?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 32. *f.* 236.
*Habitat in* Zeylonæ fluviis, *testa* 2½ *pollices longa* & 3 *lata: rima oblonga hiante,* 2 *ex cardinis dentibus fiſſis.*

caſta. 42. V. testa gibba nivea anterius convexa intusque subviolacea; vulva subrotunda, ano ovato violaceo-umbrosa, margine integerrimo.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 346.
*Habitat in* India, *rima ampla, oblonga, hiante, cardinis dente anteriori in utraque valva crenulato.*

affinis. 43. V. testa tenui glabra convexa alba fusco varia: ano elongato; labiis obliquis tumidis, cardinis dentibus quatuor.
*Gualt. teſt. t.* 75. *f.* M.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 24. *f.* 2.
*Chemn. Conch. t.* 33. *f.* 353. 354.

*Ha-*

*Habitat in insula* S. Mauritii, *laetae affinis testa radiis, maculis, lineis angularibus fuscis picta, fragili, vulvae excavatae rima oblonga hiante.*

opima. 44. V. testa crassa convexa: vulva ovata, ano cordato-ovato, cardinis dentibus tantum tribus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 355-357.
*Habitat in* India, *testa nunc pallida obscurius radiata, nunc alba caerulescente maculata & nebulosa, nunc grisea maculis nebulisque obscurioribus varia.*

triradiata. 45. V. testa convexa grisea: radiis tribus ex nigricante caerulescentibus, anoque elongato, labiis tumidis.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 358.
*Habitat ad* Tranquebariae littus.

nebulosa. 46. V. testa ochroleuca cinereo & caerulescenti maculata: vulvae ovalis labiis anoque ovato caerulescentibus.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 359-361.
*Habitat ad* Tranquebariae littus, *testa utplurimum 4 ex albo & cinereo variis picta.*

contemta. 47. V. testa crassa trigona aequilatera glabra: natibus convergentibus, cardinis dente primario crenulato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 362. 363.
*Habitat ad* Malabariae *littus, testa minuta natibus nunc albis, nunc rubellis, nunc obscurioribus, interdum littera sanguinea M notatis.*

japonica. 48. V. testa oblongo-ovata inaequilatera ad latera confertim transverse striata, ano oblongo-ovato.
*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 134?
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 364.
*Habitat - - - testa fulvescente aut lactea characteri-*

*ribus purpureis triangularibus & angulatis inſcripta : an hujus familiae ?*

ſtriata. 49. V. teſta ventricoſa anterius anguloſa : ſtriis tranſverſis craſſis lævibus ſubarcuatis, ano ovato.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 365. 366.

*Habitat rara ad* inſulas Nicobaricas, *teſta ex cinereo alba intus ſub umbonibus flavicante, rima oblonga hiante, vulva glabra oblongo-ovali.*

crenata. 50. V. teſta trigona : ſtriis tranſverſis confertis elevatis ; ſulcis intermediis & margine crenulatis, ano rugoſo fuſco cordato.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 377.

*muſ. Kirch.* 2. *f.* 113.

*Chemn. Conch.* 6. *t.* 36. *f.* 385.

*β*) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 36. *f.* 386.

*Habitat rara in* India, *teſta ex cinereo alba, radiis, nubibus maculisque fuſcis varia, vulvae ovatae labiis plicatis.*

Textile. 51. V. teſta ovali glaberrima inæquilatera ; vulva anoque oblongis ; lineis dilute ſpadiceis aut caeruleſcentibus pictis, margine integerrimo.

*Liſt. Conch. t.* 400. *f.* 439.

*Knorr Vergn.* 2. *t.* 28. *f.* 4.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 442. 443.

*Habitat ad* Malabariae *littus & in* mari rubro, *teſta ad* 1¼ *pollicem longa, & 2¼ lata flavicante aut dilutius incarnata venis caeruleſcentibus aut ſubfuſcis picta, vulvae labiis rotundatis.*

corrugata. 52. V. teſta ovata exalbida : ſtriis tranſverſis anterius craſſis validis, poſterius tenerrimis medio undulatis.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 444.

*Habitat in* mari mediterraneo, *rima oblonga amopla hiante.*

monſtroſa. 53. V. teſta ovata albida decuſſatim ſtriata, cardinis in ſiniſtra valva dentibus modo duobus.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 445. 446. a. b.
*Habitat rariſſima ad* inſulas Nicobaricas, *valva dextra ſiniſtram ſuperante tam ad cardinem, quam anterius poſteriusque prominentiis inaequali.*

ponderoſa. 54. V. teſta ſolida inæquilatera anterius poſteriusque rugoſa cinerea: margine crenulato, cardinis dentibus duobus.
*Chemn. Naturf.* 19. *t.* 8. *f.* a-d. & *Conch.* 7. *t.* 69. *f.* A-D.
*Habitat in* Oceano auſtrali, *vulva oblongo-ovata, natibus verſus anum ovatum impreſſum verſis.*

ſubviridis. 55. V. teſta ſubviridi glabra ſolida: natibus prominentibus, margine integerrimo.
*Liſt. Conch. t.* 158. *f.* 13.
*Habitat in - - - fluviis.*

roſtrata. 56. V. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis tranſverſas decuſſantibus.
*Liſt. Conch. t.* 346. *f.* 183.
*Klein oſtrac. t.* 10. *f.* 51.
β) *Liſt. Conch. t.* 348. *f.* 186.
*Habitat - - - teſta* β) *fuſco-maculata.*

fuſca. 57. V. teſta fuſca: ſtriis ſubtiliſſimis perpendicularibus.
*Liſt. Conch. t.* 423. *f.* 271.
*Habitat - - - teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, & $2\frac{1}{4}$ *lata*; *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

luſitanica. 58. V. teſta oblonga transverſim ſubtiliter ſtriata, margine crenato.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 45.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 44.
*Habitat in* mari luſitanico.

punctulata. 59. V. testa ovata alba, lineis badiis punctisque subflavis varia.
*Bonann. recr. 2. f. 46.*
*muſ. Kirch. 2. f. 45.*
*Habitat in* mari Drepanitano.

faſciata. 60. V. testa tereti lævi radiis badiis & subflavis picta altera parte cyanea altera livida.
*Bonann. recr. 2. f. 66.*
*muſ. Kirch. 2. f. 65.*
*Habitat* - - - -

carnea. 61. V. testa ovali inæquilatera subrugoſa carnea: radiis tribus.
*Bonann. recr. 3. f. 382.*
*muſ. Kirch 2. f. 115.*
*Habitat* - - - *testa* 1½ *pollicem longa*, 2½ *lata centrum verſus in roſae vel purpurae colorem vergente.*

virgata. 62. V. testa intus violacea, extus chalybea: radiis luteis.
*Rumpf. muſ. t. 42. f. I.*
*Petiv. aq. amb. t. 18. f. 16.*
*Habitat in* Oceano indico, *coaxanti affinis at testa tenuiori.*

verſicolor. 63. V. testa ovali oblique ſtriata albida: radiis albis, fulvidis cæruleſcentibus rubrisque.
*Gualt. teſt. t. 86. f. B. C.*
*Habitat* - - - *testa inaequilatera profunde ſulcata.*

variegata. 64. V. testa ovata inæquilatera subtiliſſime ſtriata cæruleſcenti-punctata, radiis subfuſcis & nigricantibus.
*Gualt. teſt. t. 89. f. H.*
*Habitat* - - - *testis lineis nonnulis transverſis albis inſignita.*

ame-

amethystina. 65. V. testa ovata violacea perpendiculariter striata.
*Argenv. Conch. t. 21. f. D.*
*Habitat - - - testa ultra 1¾ pollicis longa & 2¼ lata; an hujus generis?*

calypiga. 66. V. testa posterius ovata transverse inæqualiter striata lineis angularibus picta.
*Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 5. f. 1.*
*β) Bonann. recr. 2. f. 62.*
*mus. Kirch. 2. f. 61.*
*Habitat ad Chrysiponense littus, testa flavicante, lineis fuscis picta: umbone niveo.*

Senegalensis. 67. V. testa ovata subtilissime decussatim striata alba aut carnea fusco varia.
*Adans. Seneg. t. 17. f. 11.* Lunot.
*Habitat in* Senegalia, *minuta, testa sesquipollicem lata & duplo breviori.*

Matadon. 68. V. testa triangulari alba aut flava: sulcis transversis parallelis circiter quadraginta.
*Adans. Seneg. t. 18. f. 5.* Matadon.
*Habitat rarissima in* Senegalia, *triplae affinis, testa sesquipollicem longa.*

succincta. 86. V. testa cordata sulcis transversis remotis excavatis: margine ctenulato. *Mant. 2. p. 546.*
*Habitat - - - testa magnitudine extimi digiti, sulcis 14 ano ovato impresso, vulvae rima excisa.*

compressa. 87. V. testa subcordata compressissima transverse sulcata. *Mant. 2. p. 546.*
*Habitat - - - testae margine integerrimo, vulva anoque linearibus subexcisis.*

australis. 88. V. testa cordata nitida alba, characteribus fuscescentibus notata: margine integro. *Chemn. Conch.*

*Conch.* 10. *p.* 355. *t.* 171. *f.* 1662.
β) *Mart. univ. Conchol. t.* 40 ?
*Habitat in* Oceano auſtrali.

gigantea. 89. V. teſta ovata livida : radiis numeroſiſſimis interruptis cæruleſcentibus, ano impreſſo ovato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 354. *t.* 171. *f.* 1661.
*Favann. Conch. t.* 49. *f.* 91.
*Habitat ad* Zeylonæ, Floridæ *littora.*

†† *orbiculatae.*

tigerina. 69. V. teſta lentiformi : ſtriis crenatis decuſſatis, ano impreſſo ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 503. *n.* 65. *
*Adanſ. ſeneg. t.* 16. *f.* 3. Cadock.
*Liſt. Conch. t.* 337. *f.* 174.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 69.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 70.
*Rumpf muſ. t.* 43. *f.* H.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 9.
*Gualt. teſt. t.* 77. *f.* A.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* E.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 44.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 1. & *t.* 3. *f.* 3. & 6. *t.* 37. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 37. *f.* 390. 391.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 2 ?
γ) Venus orbicularis. *Siſt. nat.* X. 1. *p.* 688. *n.* 118.
*Habitat in* Oceano americano & indico, *ſatis magna, teſta interdum tota alba, interdum anterius & poſterius rubella intusque rubra : umbone flavo, ſtriis perpendicularibus evidentioribus, margine intus glabro exterius crenato, vulva lineari, ano anguſto, cardinis dentibus mediis* 2.

proſtrata. 70. V. teſta orbiculata transverſe ſtriata, labiis ſcabro-membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 66. *

*Born*

*Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. f. 6.*
*Chemn. Conch. 6. t. 29. f. 298.*
*Habitat ad littus* Coromandel, *teſta complanata nigra, cinerea aut ſubfuſca, 2 pollices longa, & paulo minus lata, natibus reflexis, vulva ſubpubente, rima oblonga patula, ano cordato.*

pensylvanica. 71. V. teſta lentiformi glabro-rugoſa alba: anterius utrinque ſulco longitudinali. *Muſ. Lud. Ulr. 504. n. 67.* *
*Liſt. Conch. t. 305. f. 138.*
*Argenv. Conch. t. 21. f. N.*
*Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 4.*
*Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. f. 8.*
*Schroet. Journ. 31. t. 2. f. 8.*
*Chemn. Conch. 7. t. 37. f. 394-396.*
α) Venus ſulco longitudinali utrinque altero ad anum. *Liſt. Conch. t. 265. f. 101? t. 298. t. 135.*
*Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 408. 409.*
γ) Venus fragilis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 313. n. 314?*
*Habitat in* Oceano americano, *teſta ad 2 pollices longa, alba, ſolida, rima lineari, ano exili rugoſo cordato, margine integerrimo.*

ſpuria. 72. V. teſta alba ſubglabra: ſulco anterius longitudinali cardinisque dentibus lateralibus nullis.
*Liſt. Conch. t. 296. f. 133.*
*Chemn. Conch. 7. t. 38. f. 399.*
*Habitat in* mari Islandiam inſulamque Ferroe *alluente, penſylvanicae affinis, at rima ampliori, rimaque oblonga.*

inerustata. 73. V. teſta lentiformi glaberrima lævissima punctis excavata. *Muſ. Lud. Ulr. 505. n. 68.* *
*Habitat in* Oceano indico, *teſta intus cruſta craſſa al-*

*albida obducta, an forsan eadem cum tigerina, forsan aetate & arte deformata?*

puncta- ta. 74. V. testa lentiformi longitudinaliter fulcata intus punctata. *Mus. Lud. Ulr.* 505. *n.* 69. *
*Rumpf mus. t.* 43. *f.* D.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 6.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* D.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 37. *f.* 397. 398.
*Habitat rara in* India, *testa solida-antiquata ultra* 2 *pollices longa, & 2¼ lata alba hinc inde rubeis-misa, intus crusta crassa ochroleuca interdum laevi obducta, ceterum rubra, margine integerrimo.*

exoleta. 75. V. testa lentiformi transversim striata pallida obsolete radiata, ano cordato. *Fn. suec.* 2145. *Mus. Lud. Ulr.* 506. *n.* 70. * *Mull. zool. dan. prodr.* 2978.
*Adans. Senég.* 1. *t.* 16. *f.* 4. Cotan.
*List. Conch. t.* 292. *f.* 128. & *t.* 297. *f.* 134.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* F.
*v Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 9.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 402. 404.
β) Venus Lupinus. *Syst. nat.* X. 1. *p.* 689. *n.* 123.
γ) Venus testa æquilatera. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 406.
*List. Conch. t.* 293. *f.* 129.
*Habitat in* Norwegiæ Angliæque *littore*, γ) *testa magis aequilatera flavicante aut ex cinereo alba ad* insulas Antillas, *praestratae affinis, ac testa magis convexa labiis non scabris distincta, 2 fere pollices longa & perinde lata, intus crusta crassa albida obducta, ano ferrugineo.* tu-

---

*An distinctae species, & si, cui familiae adscribendae* Venus testa ovata laevi tenera a Mullero *zool. dan. prodr.* 2970. & Venus testa ovata laevi convexa ex *Mus. Lud. Ulr. n.* 203. *non* Born *Mus. Lud. Ulr. Conch. t.* 274. *f.* 110. *depicta? a Bysso retentiles? app. t.* 11. *f.* 59. c. *acclimata?*

tumidula. 90. V. testa gibba : sulcis transversis remotis obsoletiusculis. *Mant.* 2. *p.* 546.
*Habitat* - - - *testae margine integerrimo, vulvae rima simplici, ano impresso rhombeo-excavato.*

finensis. 91. V. testa longitudinaliter striata : arcubus transversis albis violaceisque, margine intus crenato.
*Chemn. Conch.* 10. *p.* 356. *t.* 171. *f.* 1663.
*Habitat in* mari Sinam *alluente.*

sinuata. 76. V. testa lentiformi transversim striata alba : rima oblonga attepla hiante, cardinis dentibus quatuor.
*List. Conch. t.* 294. *f.* 130.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 400. 401.
*β) List. Conch. t.* 290. *f.* 126.
*γ) List. Conch. t.* 289. *f.* 125.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* N ?
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 3.
*Habitat rarior ad* insulas Nicobaricas, *exoletae affinis, at testa minus orbiculari, magis convexa, striis magis elevatis distincta.*

borealis. 77. V. testa lentiformi : striis transversis membranaceis erectis remotissimis.
*List. an. angl. p.* 174. *t.* 4. *f.* 123.
*Gualt. test. t.* 75. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 39. *f.* 412-414.
*Habitat in* Oceano europaeo septentrionali, *testa* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, & paulo latiori sub epidermide spadicea alba, angulata, ad rimam longam & angustam recta & quasi truncata, striis inaequalibus, & si cum exoleta compares, remotioribus, ano oblongo-ovato cardinis dente in altera valva* 1. *in altera* 2.

pectinata. 78. V. testa sublentiformi : sulcis longitudinalibus

bus rugosis, pube antrorsum ramosa. *Mus. Lud. Ulr.* 507. *n.* 72. *

*List. Conch. t.* 312. *f.* 148. *t.* 313. *f.* 149.
*Rumpf mus. t.* 42. *f.* D.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 14.
*Gualt. test. t.* 72. *f.* E. F. & *t.* 75. *f.* A.
*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* P.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 39. *f.* 415-419.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *testa ultra, 1½ pollicem longa & 2 fere lata nunc magis nunc minus convexa, nunc alba: ano maculisque quibusdam anterioribus fuscis, nunc per totam superficiem fusco maculata, nunc anterius maculis vibicibusque ex atro fuscis notata: ano cordato, margine inaequaliter crenato.*

scripta. 79. V. testa lentiformi compressa striata: posterius angulo recto angulata. *Mus. Lud. Ulr.* 507. *n.* 73. *

*Rumpf mus. t.* 43. *f.* C. Chama literata rotunda.
*Argenv. Conch. t.* 24. *f.* M. Chama optica.
*Pet. amb. aq. t.* 18. *f.* 3.
*Gualt. test. t.* 77. *f.* C.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 40. *f.* 420-426.
ε) *v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 39. *f.* 410. 411.
*Habitat rarissima in* Oceano indico, ε) *in mari rubro, testa utrinque truncata, posterius quidem magis, intus alba: macula fusca, extrinsecus varia: margine integerrimo, vulva anoque spadiceo-maculatis.*

edentula. 80. V. testa subglobosо-lenticulari rugosa edentula: ano ovato. *Mus. Lud. Ulr.* 508. *n.* 74. *

*List. Conch. t.* 260. *f.* 96.
*Gualt. test. t.* 88. *f.* B.

Chemn.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 40. *f.* 427-429.
*Habitat in* Oceano americano, *testa diaphana exalbida, recenti rubella, intus praeter marginem utrinque integerrimum aurea; ano ovato-acuto, valde excavato, rima angusta, natibus anum versus versis.*

cincta. 81. V. testa valde convexa annulis cincta: sulcis intermediis crenatis ano cordato, margine crenulato.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 36. *f.* 387.
*Habitat* - - - *testa minuta alba maculis & nebulis ferrugineis varia, intus sub umbone maculis aliquot purpureis.*

concentrica. 82. V. testa alba suborbiculari compressa: striis concentricis, margine integerrimo, ano cordato.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 16. *f.* 5. Dosin.
*List. Conch. t.* 261. *f.* 91. *t.* 288. *f.* 124. & *t.* 291. *f.* 127.
*Gualt. test. t.* 76. *f.* F.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 37. *f.* 392. 393.
*Habitat in* mari atlantico, americano, *testa satis magna: rima hiante, cardinis dentibus* 4 *obliquis approximatis.*

juvenilis. 84. V. testa lentiformi: striis transversis confertis circularibus anterius & posterius in rugas terminatis, ano cordato, margine integerrimo.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 405.
*Habitat in* India *testa alba: maculis spadiceis, fasciis radiisque albis variis, rima oblonga, ampla, hiante, sinuata.*

Histrio. 85. V. testa lentiformi: striis transversis acutis arcuatis, margine integro, ano cordato, ferrugineo.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 407.
*Habitat varior in* India, *testa maculis radiisque spadiceis varia, vulva elongata, lata, sinuata, maculis albis spadicisque varia.*

globosa. 86. V. testa globosa hyalina: striis transversis subtilissimis, margine integerrimo, cardinis dentibus duobus.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 40. *f.* 430. 431.
*Habitat rarissima in* mari rubro, *testa ultra pollicem longa, & pene* 1¼ *lata, ano vulvaque vix impressis.*

Pectunculus. 87. V. testa orbiculari æquilatera transversim rugosa rufo variegata.
*List. Conch. t.* 254. *f.* 89. *t.* 255. *f.* 90. *& t.* 256. *f.* 91.
*Habitat in* Japonia.

albida. 88. V. testa orbiculari subcompressa æquilatera alba: striis transversis subtilibus.
*List. Conch t.* 273. *f.* 109.
*β) List. Conch. t.* 274. *f.* 110.
*Habitat in* Jamaica.

campechienſis. 89. V. testa orbiculari inæquilatera: striis transversis confertis acutis.
*List. Conch. t.* 283. *f.* 121.
*Habitat in* sinu Campechiensi, *testa* 2¼ *pollices longa.*

crassa. 90. V. testa orbiculari solida compressa: striis transversis subtilibus, radiis rubris.
*List. Conch. t.* 299. *f.* 136.
*Habitat* - - -

pur-

*An huic generi inserendæ testæ a* Chemnizio *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1670. 1671. *depictæ?*

purpurascens. 91. V. testa orbiculari subtiliter transversim striata purpurascente radiata.
*List. Conch. t.* 303. *f.* 144.
β) *List. Conch. t.* 304. *f.* 145.
*Klein ostr. t.* 11. *f.* 57.
*Habitat* - - -

rubra. 92. V. testa orbiculari inæquilatera spadicea obscurius radiata: striis transversis confertis crassis.
*List. Conch. t.* 306. *f.* 139.
*Habitat in* Jamaica.

pusilla. 93. V. testa orbiculari æquilatera albida perpendiculariter striata.
*List. Conch. t.* 311. *f.* 147.
*Habitat* - - - *an forsan cardii species?*

violacea. 94. V. testa intus violacea: striis perpendicularibus squamosis, margine denticulato.
*List. Conch. t.* 338. *f.* 175.
*Habitat* - - - *testa mediae magnitudinis, longiore quam lata.*

spadicea. 95. V. testa spadicea: striis perpendicularibus versus marginem squamosis.
*List. Conch. t.* 340. *f.* 177.
*Habitat* - - - *testa* 2 *pollices longa, & pene* $2\frac{1}{2}$ *lata.*

cancellata. 96. V. testa subrusa cancellata.
*List. Conch. t.* 344. *f.* 181.
*Habitat* - - - *exilis.*

bengalensis. 97. V. testa orbiculari subæquilatera: striis crassis perpendicularibus, natibus anum versus versis.
*List. Conch. t.* 345. *f.* 182.
*Habitat in* Bengala, *satis magna.*

au-

aurea. 98. V. teſta ſuborbiculari aurea inæquilatera ſuborbiculari: ſtriis tranſverſis ſubtilibus confertis.
*Liſt. Conch. t.* 404. *f.* 249.
*Habitat* - - -

obſcura. 99. V. teſta fuſca: ſtriis perpendicularibus tenuiſſimis.
*Liſt. Conch. t.* 423. *f.* 271.
*Habitat* - - - *teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, $2\frac{1}{4}$ *lata.*

purpurata. 100. V. teſta orbiculari ſubæquilatera perpendiculariter rugoſa: radiis purpureis.
*Liſt. Conch. t.* 424. *f.* 272.
*Habitat* - - - *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem fere longa*, *et* $1\frac{1}{4}$ *lata.*

Nux. 101. V. teſta lentiformi teſtacea rugoſa, ano cordato.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 39.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 38.
*Habitat in* mari Jonico.

rugata. 102. V. teſta orbiculari teſtacea ſubæquilatera rugis transverſis diſtantibus.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 54.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 52.
*Habitat* - - -

gibbula. 103. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata, antrorſum truncata.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 55.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 53.
*Habitat* - - -

ſtellata. 104. V. teſta orbiculari lævi aurea: ſtella ad umbonem candida.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 62.
*Habitat in* Ulyſſiponenſi *littore.*

ita-

italica. 105. V. testa orbiculari lutea: striis transversis elevatis distantibus.
*Bonann. recr 2. f. 76.*
*mus. Kirch. 2. f. 75.*
*Habitat in* mari mediterraneo, Italiam *alluente.*

brasiliana. 106. V. testa lentiformi fusco lutea: striis transversis tenerioribus distantibus, ano cordato vulvaque latis cæruleſcentibus.
*Bonann. recr. 3. f. 345.*
*mus. Kirch. 2. f. 102.*
β) *Bonann. recr. 3. f. 380.*
*mus. Kirch. 2. f. 114.*
*Habitat frequens in* Brasiliæ *littore, natibus anum versus inflexis.*

pellucida. 107. V. testa orbiculari pellucida lævi: vulva dilute aurea spadiceo maculata, ano cordato viridi rubroque venoso.
*Bonann. recr. 3. f. 397.*
*mus. Kirch. 2. f. 118.*
*Habitat in* Brasiliæ *oris.*

holoſericea. 108. V. testa orbiculari solida candida: striis extrinsecus undulatis aureis, fasciaque versus marginem lata flava lineis transversis fuscis varia.
*Bonann. recr. 3. f. 398.*
*mus. Kirch. 2. f. 119.*
*Habitat - - - pellucida major, pictura opus holosericeum puncto francese Italis dictum simulans.*

macassarica. 109. V. testa orbiculari ventricosa crassa subfusca albo radiata: striis annularibus.
*Leers catal. p. 129. n. 1240.* Eykenhouts doublet.
*Rumpf mus. t. 43. f. K.*
*Petiv. amb. aq. t. 18. f. 13.*
*Habitat in* Macassar.

au-

aurantia. 110. V. testa suborbiculari aurantia.
*Valent. Abh. t. 15. f. 20.*
*Habitat - - - testa 2 fere pollices longa, & 2¼ lata ; an hujus familiae ?*

fulva. 111. V. testa lentiformi fulva : striis circularibus subtilissimis.
*Gualt. test. t. 75. f. E.*
*Habitat - - -*

albicans. 112. V. testa orbiculari transversim striata albida lineis angularibus characteribus maculisque fuscis varia.
*Gualt. test. t. 75. f. G.*
*Habitat - - - castrensi affinis.*

candida. 113. V. testa orbiculari alba reticulatim striata.
*Gualt. test. t. 75. f. L.*
*Habitat - - -*

undulata. 114. V. testa suborbiculari transversim striata exalbida lineis undulatis punctisque rubellis varia.
*Gualt. test. t. 75. f. O.*
*ε) Gualt. test. t. 75. f. P.*
*γ) Gualt. test. t. 75. f. R.*
*ι) Gualt. test. t. 76. f. A.*
*Habitat - - -*

lineata. 115. V. testa orbiculata æquilatera alba : striis transversis subtilibus, marginem versus crassioribus.
*Gualt. test. t. 77. f. B.*
*Habitat - - -*

lævis. 116. V. testa lævi subæquilatera albida.
*Gronov. zooph. 3. p. 260. n. 1090.*
*Gualt. test. t. 77. f. F.*

β)

ε) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* G.
*Habitat - - - an diſtincta ſpecies.*

cornea. 117. V. teſta orbiculari lævi inæquilatera lividocornea : linea tranſverſa alba.
*Gualt. teſt. t.* 82. *f.* B.
*Habitat - - -*

guttata. 118. V. teſta orbiculata fulvida ad marginem albo guttata.
*Gualt. teſt. t.* 82. *f.* F.
*Habitat - - -*

rufeſcens. 119. V. teſta inæquilatera rufeſcente lævi : lineis nonnullis tranſverſis.
*Gualt. teſt. t.* 85. *f.* D.
*Habitat - - -*

virens. 120. V. teſta lentiformi cancellatim ſtriata radiata margine crenulata virente obſcurius maculata.
* *Argenv. zoomorph. t.* 5. *f.* B. Palourde.
*Habitat - - -*

maculoſa. 121. V. teſta alba maculato-radiata arcuatim ſtriata : macula media griſea magna ſurſum attenuata.
*Argenv. zoomorph. t.* 12, *f.* G.
*Habitat - - -*

coſtata. 122. V. teſta tota incarnata : coſtis longitudinalibus rugas tranſverſas remotiores decuſſantibus.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 3.
*Habitat - - - teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, $1\frac{1}{2}$ *lata.*

Wauaria. 123. V. teſta tenui convexiuſcula ſubtiliter tranſverſim ſtriata intus nivea, extrinſecus littera W punctis multis adſperſis inſignita, natibus inflexis.

*Re-*

*Regenf. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 12.
*Habitat* - - - *ſcriptae affinis.*

tumens. 124. V. teſta tumida ſolida nivea lævi, margine verſus rugis aliquot tranſverſis exarata.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 16. *f.* 7. Pitas.
*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *teſta epidermide ſordide alba veſtita*, $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, ultra* 2 *lata, cardinis dentibus* 4 *in utraque valva.*

diaphana. 125. V. teſta tenui orbiculari pellucida lævissima nivea: cardinis in utraque valva dentibus duobus.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 16. *f.* 8. Felan.
*Habitat in* Africæ *littore* occidentali, *diametri ſeſquipollicaris.*

dura. 126. V. teſta ſuborbiculari compreſſa dura tranſverſim ſulcata rubella fuſco radiata intus violacea.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 12. Pégon.
*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *teſta* 2 *fere pollices longa nitente.*

nivea. 127. V. teſta alba pellucida ſubhiante: ſulcis viginti diſtantibus marginem verſus in rugas abeuntibus.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 17. Fatan.
*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *teſta* 6 *fere pollices lata*, $4\frac{1}{2}$ *longa*; *an hujus generis?*

eburnea. 128. V. teſta orbiculari compreſſa nivea: ſulcis longitudinalibus rotundatis ſtrias tranſverſas decuſſantibus.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 3. Jajon.
*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *teſtae diametro* 9 *linearum, ſulcis circiter* 26-30, *cardinis dentibus breviſſimis.*

In-

lucida. 129. V. teſta lucida dilute fulva intus & extrinſecus ſulcis longitudinalibus ſubtiliſſimis exarata.

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 4. Movin.

*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *teſta* 16 *circiter lineas longa vix anguſtiore.*

diſcors. 130. V. teſta orbiculari convexiuſcula ſtriis longitudinalibus: mediis perpendicularibus; exterioribus obliquis divergentibus tranſverſas decuſſantibus: ſulcis intermediis & margine interno crenatis.

*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 199. *t.* 8. *f.* 11.

*Habitat* - - - *teſta inæquilatera albida aut ochroleuca, ſtriis non raro undulatis, aut radiis, interdum maculis nebulisque nonnullis fuſcis varia, intus alba, ano cordato oblongo; vulva anguſta oblonga fuſca: labiis cancellatis albis nigro lineatis.*

aculeata. 131. V. teſta orbiculari ſubæquilatera: coſtis acutis elevatis tuberculatis, margine denticulato crenato, cardinis dentibus mediis duobus.

*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 13.

*Habitat* - - - *teſta varius unicolore rubra perſici florum æmula, frequentius alba fuſco ſtriata, vulva minuta, ſulcis profundis.*

††† *ovales, ſupra rimam* ſubangulatæ.

litterata. 132. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis tranſverſis ſubundulatis. *Fn. ſuec.* 2146. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 75. *

*Argenv. Conch. t.* 21. *f.* A. Chama litterata.

*Rumpf muſ. t.* 43. *f.* B. Chama literata oblonga.

*Liſt. Conch. t.* 402. *f.* 246.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 67.

*muſ. Kirch.* 2. *f.* 66. 120.

Pe-

*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 2.
*Valent. Abh. t.* 13. *f.* 6. *t.* 14. *f.* 13.
*Gualt. teſt. t.* 86. *f.* E ? F.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 6. *f.* 4.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 39.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 432-434.
β) Venus litterata nebuloſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 435.
*Valent. Abh. t.* 14. *f.* 10. 11. 12. 14.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 14. *f.* 1.
γ) Venus litterata punctata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 436. 437.
*Valent. Abh. t.* 15. *f.* 19.
δ) Venus litterata conſperſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 438.
ε) Venus litterata radiata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 439.
ζ) Venus litterata maculoſa. *Martin. allg. Naturg.* 1. *p.* 267. *t.* 12. *f.* 4.
η) *Valent. Abh. t.* 14. *f.* 7-9. & *t.* 15. *f.* 17. 18.
θ) *Regenf. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 40 ?
*Habitat rarior in* India, *teſta ad* 2 *pollices longa*, 3 *lata*, *characteribus lineisque fuſcis picta*, *valva longa anguſta profunda*: *rima longitudinalis lata*, *natibus minutis.*

geographica. 133. V. teſta inæquilatera tenui ſubtiliter decuſſatim ſtriata, alba, fuſco reticulata.
*Gualt. teſt. t.* 86. *f.* H.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 440.
*Habitat in* mari mediterraneo.

rotundata. 134. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis, cardinis dente intermedio bifido.
*Muſ. Lud. Ulr.* 509. *n.* 76. *
*Argenv. zoom. t.* 12. *f.* D.
*Olear. gotl. t.* 29. *f.* 2.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 18. *f.* 4.

*Chemn.*

*hemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 441.

*Habitat rarior in* Oceano indico, *testa ad* 1½ *pollicem longa, & 3 lata, subfusca aut maculosa flava radiis ex maculis fuscis luteisque compositis picta, ano ex ovato lanceolato.*

decussata. 135. V. testa ovata anterius angulata decussatim striata. *Mus. Lud. Ulr.* 509. *n.* 77. *

*Gualt. test. t.* 85. *f.* E. I. L.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 2. 3.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 43. *f.* 455. 456.

*Habitat frequens in* mari mediterraneo, *testa ad* 1½ *pollicem longa & 2 lata, solida, convexa, colore varia, radiata, maculata, aut virgata, intus alba flavo mista, ano minimo retuso, vulva longa angusta margine interno utplurimum caerulea; cardinis dentium intermedio rarius 2 fissis.*

virginea. 136. V. testa subovata anterius subangulata: striis transversis inæquilineatis, vulva tumida.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 447. *t.* 43. *f.* 457. 458. & a. b. c.

*Habitat frequens in* mari adriatico *aliisque, decussatae similis, at testa minore, striis perpendicularibus nullis distincta, rubella, interdum radiata, maculis cinereis, aut lineis angularibus fuscis varia, intus alba aut flavicante, ad latera interdum aut marginem caerulea, nunc magis nunc minus ovata, striis transversis nunc magis nunc minus conspicuis: Incola edulis.*

virginica. 137. V. testa ovata transversim rugosa: cardinis dentibus duobus.

*List. Conch. t.* 390. *f.* 229.

*Habitat in* Virginia, *testa pollicem longa, &* 1½ *lata.*

cruentata. 138. V. testa ovata inæquilatera transversim striata rubro maculata. *List.*

*Liſt. Conch. t.* 396. *f.* 243.
*Klein oſtr. t.* 10. *f.* 50.
β) *Liſt. Conch. t.* 403. *f.* 247.
*Habitat - - - teſta ſtriis exaſperata.*

luteſcens. 139. V. teſta ovata transverſim ſtriata exterius radiata marginem verſis characteribus lineis maculisque varia, intus luteſcente.
*Liſt. Conch. t.* 404. *f.* 248.
*Habitat - - -*

ſanguinolenta. 140. V. teſta ovali lævi flaveſcente: maculis punctisque rubris.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 68.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 67.
*Habitat ad* Neapolitanum *littus, teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1¼ *lata.*

argentea. 141. V. teſta oblongiuſcula lævi argentea: lineis nigris in faſcias coadunatis.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 85.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 85.
*Habitat in* Gaditano *littore; an hujus generis.*

donacina. 142. V. teſta oblongiuſcula complanata anterius transverſim ſulcata, margine interno crenulato, vulva anoque lineari excavatis.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 28. *f.* 7.
*Habitat - - - teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1¼ *lata, nunc unicolore, nunc maculis, lineis angulatis aliterve varia, vulvae rima minuta vix hiante, cardinis dentibus modo* 2.

afra. 143. V. teſta ſulcata: umbone acuminato; ano excavato rugoſo cordato.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 16. *f.* 6. Gordet.
*Habitat in* Africæ *littore* occidentali, *teſta pollicem lata, ſulcis ſubtilioribus ultra* 130 *exarata.*

deal-

dealbata. 144. V. testa oblonga tenui complanata vivo animali cæruleſcente, mortuo nivea.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 18. Calcinelle.
*Habitat ad* Africæ *littus* occidentale, *testa* 1½ *pollicem lata, dimidio anguſtiori; an hujus familiae?*

litho-phaga. 145. V. testa ovata reticulata utrinque hiante: cardinis dentibus binis; alternis bifidis. *Retzius act. Taurin.* 1786. 1787. *add. p.* 11-14. *f.* 1. 2.
*Habitat* Liburni *ad* rupes littoreas, *intra lapidem calcareum porojum flavicantem.*

310. SPONDYLUS. *Animal* Tethys.
*Testa* inæquivalvis, rigida.
*Cardo* dentibus 2 recurvis cum foveola intermedia.

Græda-ropus. 1. Sp. testa ſubaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 510. *n.* 78. *
*Buccon. obſerv.* 1674. *t.* 304. Concha hiſtricina.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 6. Gouron.
*Liſt. Conch. t.* 206. *f.* 40.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 21.
*Rumpf muſ. t.* 47. *f.* E.
*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 6.
*Guall. teſt. t.* 99. *f.* F.
*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* B.
*zoomorph. t.* 12. *f.* A.
*Klein oſtr. t.* 8. *f.* 23. & *t.* 9. *f.* 37.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 7.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 48.
*Knorr delic. t.* B. IV. *f.* 1.
*Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 1.



Spondyli tota teſtæ ſtructura ad oſtreas accedunt, ſed dentibus cardinis differunt, ſpinis vulvarum chemis propiores, ſcopulis utplurimum adhærentes, teſta altera convexa, altera planiore.

*Murray teſtaceol. t. 2. f. 14.*
*v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 76. vign.*
*Chemn. Conch. 7. t. 44. f. 459.*
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. f. 20. 22.*
*Gualt. teſt. t. 101. f. A.*
*Argenv. Conch. t. 20. f. E.*
*Chemn. Conch. 7. p. 63. vign. 9. f. a. b.*
γ) *Chemn. Conch. 7. p. 63. vign. 9. f. c.*
δ) *Chemn. Conch. 7. t. 44. f. 460.*
ι) *Rumpf muſ. t. 48. f. 1.*
*Gualt. teſt. t. 101. f. B.*
*Argenv. Conch. t. 19. f. E. H.*
*Seb. muſ. 3. t. 88. f. 1.*
*Chemn. Conch. 7. t. 44. f. 461. 462.*
ζ) *Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 463.*
η) *Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 464.*
θ) *Seb. muſ. 3. t. 89. f. 8.*
*Knorr Vergn. 5. t. 9. f. 1. & 6. t. 9. f. 1.*
*Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 465.*
ι) *Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 466.*
κ) *Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 468.*
λ) *Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 469.*
μ) *Knorr Vergn. 5. t. 7. f. 2. 3.*
*Chem. Conch. 7. t. 45. f. 470.*
ν) *Rumpf muſ. t. 48. f. 2.*
*Argenv. Conch. t. 19. f. G.*
*Seb. muſ. 3. t. 88. f. 10. 11. & t. 89. f. 5.*
*Knorr Vergn. 1. t. 9. f. 2.*
*Chemn. Conch. 7. t. 46. f. 472.*
ξ) *Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 2.*
*Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 474.*
ο) *Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 476.*
π) *Seb. muſ. 3. t. 88. f. 4.*
*Chemn. Conch. 7. t. 47. f. 477. 478.*
ϱ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. f. 18.*
*Knorr Vergn. 6. t. 12. f. 3.*
*Chemn. Conch. 7. t. 69. f. E. F.*
*Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 213. t. 8. f. 14. 15.*
σ)

σ) *List. Conch. t.* 207. *f.* 41.
τ) *List. Conch. t.* 208. *f.* 42.
υ) *List. Conch. t.* 209. *f.* 43.
φ) *Valent. Abh. t.* 16. *f.* 24.
χ) *Gualt. test. t.* 99. *f.* E. b.
ψ) *Gualt. test. t.* 100. *f.* A.
ω) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* I.
αα) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 2.
ββ) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 3.
γγ) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 5.
δδ) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 6.
εε) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 7.
ζζ) *Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 9.
ηη) *Seb. mus.* 3. *t.* 89. *f.* 1.
θθ) *Seb. mus.* 3. *t.* 89. *f.* 2.
ιι) *Seb. mus.* 3. *t.* 89. *f.* 3.
κκ) *Seb. mus.* 3. *t.* 89. *f.* 4.
λλ) *Adans. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 7. Satal.
μμ) *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 224. *n.* 42. *t.* 8. *f.* 16.
νν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 984.
ξξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 985. 986.
οο) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115 *f.* 987.
ππ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 988-990.
ρρ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 991.

*Habitat in* mari mediterraneo, δ) & κ) *in* mari rubro, ε) *in* sinensi, β) γ) ζ) η) λ) μ) ν) ξ) ο) π) *in* Oceano indico, θ) & ι) *in* americano, *testae colore nunc simplici purpureo, aurantio, albo, perstei florum aemulo, nunc striis, maculis, punctis, fasciis, spinarum colore diverso vario, magnitudine, crassitie in immensum varians.*

regius. 2. Sp. testa inaurita spinosa. *Mus. Lud. Ulr.* 511. *n.* 79. *

*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* G.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 46. *f.* 471.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 6. *f.* 2.

γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 13. *f.* 1.
δ) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* L ?
ε) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* M ?
*Habitat rarissimus in* India, γ) *prope* Maltam, *testa majore subglobosa, intus alba, exterius purpurascente, kermesina, ignea, aurantia, rarius alba, spinis utplurimum longioribus, ad 2 pollices longis, interdum cylindricis, margine crenato.*

plicatus. 3. Sp. testa inaurita mutica plicata. *Mus. Lud. Ulr.* 511. *n.* 80. *
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 2. Garin.
*List. Conch. t.* 210. *f.* 44. & *t.* 1059. *f.* 1.
*Gualt. test. t.* 99. *f.* E. & *t.* 104. *f.* F ?
*Schroet. Litterat.* 1. *t.* 1. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 47. *f.* 479-482.
β) *Regenf. Conch.* 1. *t.* 9. *f* 30.
*Habitat in* Oceano indico & americano, mari rubro, mediterraneo, β) *in* Guinea, *testa alba lineis venisque nunc flavicantibus & rubellis, nunc subfuscis & violaceis varia,* β) *aurantia.*

citreus. 4. Sp. testa oblonga plicata spinosa.
*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* K.
*Habitat - - - testa imbricata, 2 circiter pollices longa, 1¾ lata, citrea, aut rubra margine interno aurantio.*

311. CHAMA. *Animal* Tethys.
*Testa* bivalvis, grossior.
*Cardo* callo gibbo, oblique inserto fossulæ obliquæ.
*Vulva* clausa absque nymphis.

Cor. 1. Ch. testa subrotunda lævi: natibus recurvatis, rima hiante. *Mus. Lud. Ulr.* 516. *n.* 88. *
*List. Conch. t.* 275. *f.* 111.

Bo-

*Bonann. recr.* 2. *f.* 88.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 92.
*Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 10.
*Gualt. teſt. t.* 71. *f.* E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 1.
*Ginann. adriat. t.* 2. *t.* 19. *f.* 129.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 8. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 48. *f.* 483.
*Habitat in* mari adriatico *verſus* Dalmatiam, *etiam* caſpio, *teſta grandi inius alba, exterius ſub epidermide nigricante ex albo & ſubfuſco varia, craſſa, ſubrotunda, transverſim rugoſa clauſa, margine integerrimo, valvis figura cor turgidum referentibus, natibus rubellis, magnis, inſtar cornu arietis contortis, ani regione retuſa, in medio pauliſper elevata; vulva ovato-oblonga: nymphis nudis ligamento coriaceo obtectis.*

Gigas. 2. Ch. teſta plicata fornicato-ſquamoſo: ano hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 512. *n.* 81. *
*Rumpf muſ. t.* 42. *f.* A. B. Chama ſquamata.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* E. Imbricata.
*Liſt. Conch. t.* 351. *f.* 189. *t.* 352. *f.* 189. b. *t.* 353. *f.* 190. *t.* 354. *f.* 191.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 83. 84.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 82. 83.
*Petiv. amb. aq. t.* 5. *f.* 13. & *t.* 7. *f.* 13.
*Gualt. teſt. t.* 92. *f.* A-G. & *t.* 93. *f.* B.
*Klein oſtr. t.* 10 *f.* 53.
*Lochner muſ. Besler. t.* 20.
*Olear. muſ. t.* 29. *f.* 6.
*Knorr delic. t.* B. III. *f.* 1.
*Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 3. & 6. *t.* 36. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 48.
*Murray teſtaceol. t.* 2. *f.* 12. 20.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 40. *f.* 492-496.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 49. *f.* 497.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta lucida alba, extrin-*

*trinsecus interdum rosea, aut ex flavo rubro alboque varia, ad minimum ¾ pollices longa, & 1½ lata, sed saepius omnium concharum [illegible] 532 libras pondere aequet, animali [illegible] tam grandi, ut 120 hominibus cibo [illegible] queat, tamque robusto, ut navium [illegible] re, hominumque manus resecare [illegible] testae costis, sulcis, squamis magnitudine variis, ani hiatu ovali: ambitu tumido crenato, testae margine dentato, cardine praeter callum sub vulva dente armato.*

Hippopus. 3. Ch. testa plicata muricata; ano retuso clauso dentato. *Mus. Lud. Ulr.* 513. *n.* 82. *

*Rumpf mus. t.* 42. *f.* C. Chama aspera obtusa.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* H. Folium brassicæ.
*List. Conch. t.* 394. *f.* 187. *t.* 350. *f.* 188.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 81. 82.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 80. 81.
*Petiv. amb. aq. t.* 18. *f.* 15.
*Gualt. test. t.* 93. *f.* A.
*Lesser testaceoth. f.* 124.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 49.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 22. *f.* 1. 2. & 6. *t.* 9. *f.* 3.
*v. Born. mus. Caes. Vindob. test. p.* 79. *vign.*
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 50. *f.* 498. 499.
*Habitat in* Oceano indico, *testa ad* 5 *pollices longa, &* 7 *lata, alba, extrinsecus maculis rubris & purpureis varia, interdum flavicante, ventricosa, cardinis callis flavis, in altera valva* 2.

antiquata. 4. Ch. testa subcordata: sulcis longitudinalibus striisque transversis. *Mus. Lud. Ulr.* 514. *n.* 84. *

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 16. *f.* 2. Ajar.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 98.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 96.
*Valent. Abh. t.* 16. *f.* 30.
*Gualt. test. t.* 71. *f.* I. L.

Knorr

*Knorr Vergn.* 2. *t.* 20. *f.* 3. & *t.* 14. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 48. *f.* 488-491.
*Habitat in* mari atlantico, americano, indico, *testa inaequilatera, maculis fuscis, rarius ferrugineis varia, costis* 19 22 *utplurimum transversim striatis, margine dentato, natibus anum versus inflexis, vulvae rima profunda clausa.*

trapezia. 5. Ch. testa trapezia gibba: sulcis longitudinalibus crenulatis. *Mull. zool. dan. prodr* 2981.
*Schroet Einl. in Conch.* 3. *p.* 236. *n.* 5. *t.* 8. *f.* 17.
*Habitat in* mari norwegico, *testa parva, pisi magnitudine alba, extrinsecus antrorsum fusca albo mista, instar arcae noae gibbosa margine crenulata: striis circiter* 20 *nodulis obtusis inaequalibus, natibus parum recurvatis, ano ovato cordato, vulva oblonga, distincta, plana, extus crenata.*

semiorbiculata. 6. Ch. testa suborbiculata compressa rudi decussatim striata. *Mus. Lud. Ulr.* 514. *n.* 85. *
ε) *Linne Lehrb. Thierr.* 2. *t.* 37. *f.* k ?
*Habitat - - - testa longitudinaliter striata, squamis annotinis imbricata, ani lobo albido, margine posteriori crenato.*

calyculata. 7. Ch. testa oblonga: sulcis imbricatis, anterius retusa.
*Adans. Seneg,* 1. *t.* 15. *f.* 8. Jeson.
*List. Conch. t.* 347. *f.* 184. *n.* 185.
*Gualt. test. t.* 90. *f.* F.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 10. 11.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 50. *f.* 500. 501.
ε) *List. Conch. t.* 348. *f.* 186 ?
ϛ) *Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 127.
*Habitat in* mari atlantico, americano & indico, *interdum fossilis, testa ultra* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *la-*

*lata, alba, juniore fusca, cardinis dentibus 2 margine exteriori serrato, interiore laevi.*

cordata. 8. Ch. testa cordata transversim striata, hinc elongata compressa. *Mus. Lud. Ulr.* 515. *n.* 86. *

reniformis. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 50. *f.* 502. 503.
*Habitat* - - - *β) in* mari rubro & indico, *testa ferruginea β) spadicea, sulcis inferne, non versus marginem exteriorem, transversis, dispositis obtusis: angulo inter rimam & marginem exteriorem elongato obscuriore.*

fatiata. 9. Ch. testa subrotunda: sulcis dentatis punctis interstinctis, ano retuso.
*Habitat* - - - *testa alba extrinsecus rufescente, sulcis elevatis longitudinaliter dentatis, anterioribus brevioribus, margine crenulato, ano cordato.*

oblonga. 10. Ch. testa oblonga anterius angulata: dentibus anterioribus acutis. *Mus. Lud. Ulr.* 515. *n.* 87. *
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 50. *f.* 504. *f.* 505.
*Habitat rarior ad* Guineae *littora, mytilo modioli structura affinis, testa subdiaphana alba subtilissime decussatim striata, intus citrea, margine integerrimo, cardinis dentibus 3 mediis, & lateralibus oblongo acuto, foveolae inter binos dentes alterius valvae intermediae inserto.*

Lazarus. 11. Ch. testa imbricata lamellis laceris, nate obliquae subspinali *Mus. Lud. Ulr.* 513. *n.* 83. *
*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* F. Placenta foliacea.
*Rumpf mus. t.* 47. *f.* C. *t.* 48. *f.* 3.
*Valent. Ath. t.* 13. *f.* 4. *t.* 16. *f.* 22.
*Seb. mus.* 3. *t.* 88. *f.* 12. *t.* 89. *f.* 6. 9. 11.
*Knorr Vergn. t. t.* 8. *f.* 1.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 5. *f.* 12-14.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 51. *f.* 507-509.
*Habitat in* India, *fcopulis adhaerens*, *teſta flava*, *aut alba natibus rubris intus glabra*: *valva ſuperiore paulo minore & planiore*, *in inferioris cardine callo obtuſo*, *craſſo*, *lato*, *ad alterutrum latus crenato*: *foveola oblique adjacente.*

gryphoides. 12. Ch. teſta orbiculata muricata: valvula altera planiore; altera nate productiore ſubſpirali.
*Rondel. teſt.* 1. *c.* 25. Concha rugata.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. Jataron.
*Liſt. Conch. t.* 212. *f.* 47. *t.* 213. *f.* 48.
*Gualt. teſt. t.* 101. *f.* C. D. E. F.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 86.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 51. *f.* 510-513.
*Geſn. aq.* 316.
*Aldr. exſang.* 458.
*Sloan. jam. t.* 241. *f.* 4-7.
α) *Gualt. teſt. t.* 101. *f.* L.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 1.
γ) *Kaemmerer Cabin. Rudolſt. p.* 234. *vign. f.* 1. 2.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 255. *t.* 8. *f.* 19.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 992.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 993.
*Habitat in* mari mediterraneo, americano, indico, *ſixa teſtae proportione & cardine Lazaro affinis*, *teſta alba*, *flava*, *rubra*, *ſanguinea*, *albo rubroque varia*, *ſquamis nunc magis foliaceis*, *nunc fornicatis & muricatis.*

bicornis. 13. Ch. teſta valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubuloſis valvula longioribus.
*Column. purp. c.* 19. *p.* 43.
*Major teſtac. t.* 2.
*Liſt. Conch. t.* 214. *f.* 49.
*Gualt. teſt. t.* 101. *f.* G.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 87. 88.

*Chemn.*

*Chemn. Naturf.* 20. *t.* 1. *f.* 1-5.
*Conch.* 7. *t.* 52. *f.* 516-520.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 245. *t.* 8. *f.* 18.
*Habitat rara in* Oceano indico & americano, *etiam* mediterraneo *gryphoidi affinis, testa utrinque flava, rubra aut alba, imbricatim lamellata, rarius rugosa.*

Arcinella. 14. Ch. testa sulcata muricata excavato-punctata, cardinis callo sessili.
*List. Conch. t.* 355. *f.* 192.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 336.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 101.
*Olear. mus. t.* 29. *f.* 3.
*Lesser testaceoth. f.* 98.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 14. *f.* 1. & *t.* 36. *f.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 52. *f.* 522. 523.
*Habitat rarior in* Oceano americano, *testa* 2 *pollices lata, & pene aeque longa, alba, spinis rarius roseis, intus flavicante, margine crenato; ano cordato, impresso, verrucoso, rugoso magno ad alterum latus appendice saepius aucto.*

Moltkiana. 15. Ch. testa obtuse triangula æquilatera plicata, vulva elevata plicis striisque obliquis inæqualibus.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 48. *f.* 484-487.
*Habitat - - - Ch. cordi affinis, nucis avellanae oblongae magnitudine, testa tactea, opaca; natibus paullisper distantibus, cardinis dente sub natibus angusto rotundato ferobi profundae appressio, cui dens alterius valvae inseritur, alteraque introrsum fovesta longa profunda inter binos dentes intermedia, & paulo magis retrorsum alio adhuc rotundato & dilatato dente.*

con-

Chamae *plurimae fixae adhaerent: aliis corporibus, valva superiore saepius gibbiore.*

conca-merata. 16. Ch. teſtæ rugis tranſverſis, ſtrias latas longitudinales decuſſantibus; utriuſque valvæ medio intus camera aucto.

*Walch. Naturf.* 12. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 5-7.
*Chem. Conch.* 7. *t.* 50. *f.* 506. a-d.
*Habitat rariſſima in* Oceano americano, *teſta parva, albida.*

macero-phylla. 17. Ch. teſta rotundata ſeriatim lamellata: margine interno crenulato.

*Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 8.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 2. & 5. *t.* 24. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 52. *f.* 514. 515.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 12?
*Habitat in* Oceano americano, *gryphoidi perquam affinis, teſta nunc flava, nunc rubra nunc albo rubroque varia, intus nunc alba, nunc rubra,* β) *elegantiſſime variegata; valva utraque convexa, lamellis marginem verſus increſcentibus; an varietas Lazari?*

foliacea. 18. Ch. teſta alba: ſtriis tranſverſis foliaceis ſerratis, interſtitiis crenatis, natibus recurvatis.

*Liſt. Conch. t.* 215-217. *f.* 51-53.
*Klein oſtr. t.* 12. *f.* 81.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 52. *f.* 521.
β) *Liſt. Conch. t.* 215. *f.* 50.
*Habitat in* mari mediterraneo & americano, *foſſilis quoque in* Campania Galliæ, *teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga.*

ſtrata. 19. Ch. teſta rotundata alba, fuſco undulata: coſtis trigonis perpendicularibus rugoſis, margine inæquali.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 86.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 84.
*Habitat rara in* Syracuſano *littore; utrum hujus generis, an ad cardia referenda.*

fuſ-

fusca. 20. Ch. testa rugosa oblonga angusta fusca: valva inferioris nate protensa rotundata subincurva.
*Gualt. test. t.* 101. *f.* 1.
*Habitat* - - - -

citrea. 21. Ch. testa subrotunda ventricosa inæquivalvi muricata: spinis sparsis inæqualibus squamosis.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 44.
*Habitat in* Oceano americano, *testa citrea, cardine ad chamas accedente.*

Thaca. 22. Ch. testa subrotunda longitudinaliter striata, ano retuso.
*Molin. hist. nat. Chil. p.* 178.
*Habitat ad* litus Chilense *in arena se occultans, testa alba violacea & flava intus eleganter purpurascente diametri* 4 *pollicum, verme incola suffissimo.*

rugosa. 23. Ch. testa suborbiculata: sulcis profundissimis, rugis subimbricatis, margine dupliciter plicato. *Mant.* 2. *p.* 546.
*Habitat* - - - *testa magnitudine extimi digiti, gibba, crassa, sulcis* 30, *margine interiore obtuse plicato, exteriore unguibus eminentibus concavis e ruga eductis, cardine sulcis* 2-3 *obliquis versus vulvam declinatis.*

gryphica. 24. Ch. testa obliqua lacuna laterali, rugosa, cardinis collo dentato. *Mant.* 2. *p.* 546.
*Habitat in* Barbaria, *Anomiae Gryphi facie, testa ponderosissima, crassissima, pugni magnitudine, natibus oblique versus anum* incurvatis longitudinaliter *concavum, valva longitudinaliter canaliculata, versus nates obliqua.*

coralliophaga. 25. Ch. testa cylindrica alba diaphana decussatim striata: striis transversis arcuatis imbricatis.

*Chama.*

*Chemn. Conch.* 10. *p.* 359. *t.* 172. *f.* 1673. 1674.

312. ARCA. *Animal* Tethys?
*Testa* bivalvis æquivalvis.
*Cardo* dentibus numerosis acutis alternis insertis.

* *margine integerrimo.*
† *natibus recurvatis.*

tortuosa. 1. A. testa parallelepipeda striata: valvula obliquè carinata. *Mus. Lud. Ulr.* 517. *n.* 861. *
*Rumpf mus. t.* 47. *f.* k. Ostreum tortuosum.
*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 122. 123.
*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 9.
*Gualt. test. t.* 95. *f.* B.
*Argenv. Conch. t.* 19. *f.* I.
*Klein ostr. t.* 8. *f.* 16.
*Lesser testaceoth. f.* 137.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 3.
*Martin. Beseh. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 14.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 53. *f.* 524. 525.
*Habitat rara & pretiosa in* Oceano indico, *testa alba, interdum subfusco-maculata aut nebulosa triplo latiore quam longa, extrinsecus varia directione & intus striata, valvis dissimilibus, margine intus, in junioribus utrinque crenato.*

†† *natibus inflexis.*

Noæ. 2. A. testa oblonga striata apice emarginata, natibus remotissimis, margine hiante. *Mus. Lud. Ulr.* 517. *n.* 90. *
*Rondel. aq.* 2. *p.* 27. Concha rhomboides.
*List. Conch. t.* 368. *f.* 208. & *t.* 369. *f.* 209. Musculus Matthioli.

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* P. Arca Noæ.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 9. Muſſole.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 32. Concha rhomboides.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 31.
*Petiv. amb. aq. t.* 17. *f.* 10.
*Gualt. teſt. t.* 87. *f.* G. H. I?
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* G.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 138.
*Knorr delic. t.* B. V. *f.* 2.
*Vergn.* 1. *t.* 16. *f.* 1. 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 73.
*Martini Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 53. *f.* 529-531. a. b. & *t.* 54. *f.* 532. 533.
ε) *Argenv. Conc. t.* 29. *f.* 20. A.
*Habitat in* mari mediterraneo, rubro, atlantico, americano, indico, *teſta alba, rarius unicolore, frequentius ſubfuſco luteo aut fuſco maculata nebuloſa, ſtriata, undulosa, venoſa, rhombea, margine extimo crenato, interno integro.*

barbata. 3. A. teſta oblonga ſtriis barbata: natibus approximatis, margine clauſo. *Fn. ſuec.* 1147. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91. * *Mull. zool. dan. prodr.* 2982.
*Rondel. teſt.* 14. Chama aſpera.
*Liſt. Conch. t.* 231. *f.* 65.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 79.
*muſ. Kircher.* 2. *f.* 78.
*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* F.
*Argenv. Conch. t.* 72. *f.* M.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 2. *f.* 7.
*Murray teſtaceol. t.* 2. *f.* 22.
*Martin Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 8.
*Chemn. Conch. t.* 54. *f.* 535.
ε) Arca tortuoſa. *Mull. zool. dan. prodr.* 2983.
γ) *Gualt. teſt. t.* 90. *f.* B.
*Martini Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 12. *Chemn.*

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 54. *f.* 534.
*δ) Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 13.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 54. *f.* 536. *f.* 537.
*Muſ. Teſſin. t.* 6. *f.* 1.
*ε) Rumpf muſ. t.* 44. *f.* L. Pecten faxatilis ?
*Habitat in* mari mediterraneo, rubro, indico, *ζ) in* norwegico, *η) etiam in* americano, *teſta ſub fibris ſunſpadicea, interdum albo mixta, decuſſatim ſtriata: fibris in ſectionis angulo nodulo ſis.*

Modiolus. 4. A. teſta oblonga ſtriata anterius angulata.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta mytili modioli figura, ſabuc majoris magnitudine, exterius flavescente, intus aut ſubviolacea: cardine elongato, valvis anterius profundius ſtriatis, poſterioribus natibus vix vel parum longioribus.* Zoega.

Pella. 5. A. teſta ovata pellucida ſubſtriata: vulva prominente diſtincta, cardine ciliari.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 746.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta alba, nitidiſſima, magnitudine ſeminis helianthi annui, ſubtrigona: ſtriis ſubtiliſſimis transverſis ſemilunatis, natibus mediis valde transverſe ſtriata, cardinis dentibus, ſub vulva praeſertim, ſubulatis, acutiſſimis, margine intus & extrinſecus edentulo.* Logie.

ovata. 6. A. teſta ovata decuſſatim ſtriata nivea epidermide pulla obtecta: margine hiante.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 54. *f.* 538.
*Habitat in* mari rubro, *teſta magna, ano excavato undulatim ſulcato & ſtriato; an hujus familiae ?*

pellucida. 7. A. teſta pellucida fragili anterius poſteriusque rotundata obſolete ſtriata: cardinis dentibus acutiſſimis.
*Spengl. Catal. t.* 1. *f.* 10. 11.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 541. a. b.
*Habitat ad* insulas Nicobaricas, *testa tenui straminea, rarius fusca intus fuscescente.*

rostrata. 8. A. testa convexiuscula transversim striata posterius rotundata anterius in rostrum acutum producta.
*Martini Beschr. Berl. Naturf.* 3. *t.* 7. *f.* 17. 18.
*Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 550. 551. a. b.
*Habitat in* mari Baltico & Norwegico, *tellinae rostratae affinis, testa epidermide virescente tecta, ad* ½ *pollicem longa, &* 1¼ *lata, natibus minutis antrorsum flexis.*

striata. 9. A. testa lentiformi copiosissime decussatim striata lateritia intus rubella, ano triangulari, cardine arcuato.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 58.
*Habitat in* mari rubro, *testa pollicem lata & paulo longiori.*

pulchella. 10. A. testa subrotunda biradiata: striis transversis arcuatis.
*Rumpf mus. t.* 47. *f.* 1.
*Habitat* - - - *an hujus generis & ordinis?*

afra. 11. A. testa exalbida epidermide albicante tecta subtilissime decussatim sulcata oblique truncata.
*Adans. Senég.* 1. *t.* 18. *f.* 8. Jubet.
*Habitat ad* Africæ *littus occidentale, testa* 4-5 *lineas longa, &* 3 *lata, sulcis longitudinalibus* 45-50, *transversis* 20, *natibus approximatis, margine clauso.*

fossilis. 12. A. testa crassa subrotunda longitudinaliter striata transversim costata: costis undulatim striatis.

*Schroet.*

*Schroet. neue Litterat. 2. f. 3. 4.*
*Habitat - - - hactenus modo fossilis reperta in* Ducatu Limburgensi, *testa 3 pollices longa, 3¼ lata.*

cancellata. 13. A. testa cancellatim striata barbata, margine medio hiante.
*Schroet. Einl in Conch. 3 p. 294. t. 9. f. 2.*
*Habitat in* Oceano americano, *testa sub epidermide muscosa utrinque subfusca, exterius albo mista, utrinque 4 pilorum fasciculis fimbriatis hiata, natibus subrecurvis, ano lanceolato.*

minuta. 14. A. testa compressiuscula transversim striata: fine remotiore attenuato; oppolito rotundato.
*O. Fabr. Fn. groenl. p. 414. n. 415. Mull. zool. dan. prodr. 2935.*
*Chemn. Conch. 10. t. 170. f. 1657. 1658.*
*Habitat varissima in* maris Groenlandiam *alluentis profundis, testae figura ad myas accedens, testa ochroleuca glabra, clausa, 2½ lineas longa, 4 lata, natibus conniventibus, albis, acutis, non striatis.*

** *margine crenato.*
† *natibus recurvatis.*

lactea. 15. A. testa subrhomboidea obsolete decussatim striata diaphana.
*List. Conch. t. 235. f. 69.*
*Bonann. recr. 2. f. 34.*
*mus. Kirch. 2. f. 33.*
*Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 547.*

nodulosa. ε) Arca testa oblonga nodulis striata, natibus incurvis remotis, margine integerrimo clauso.
*Mull. zool. dan. prodr. 2984.*
*Habitat in omni* mari europaeo, *fabae equinae magnitudine, natibus approximatis.*

antiquata. 16. A. testa oblique cordata multisulcata: sulcis muticis. *Mus. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91. *

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 7. Anadara.
*List. Conch. t.* 230. *f.* 64. & *t.* 236. *f.* 70.
*Bonann. recr.* & *mus. Kirch.* 2. *f.* 73. 74.
*Rumpf mus. t.* 44. *f.* I.
*Petiv. amb. aq. t.* 17. *f.* 8.
*Gualt. test. t.* 87. *f.* B. C.
*Klein. ostr. t.* 11. *f.* 73.
*Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 13.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 24. *f.* 3. 4.
*Murray testaceol. t.* 2. *f.* 15.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 548. 549.
*Habitat in* Oceano indico, americano, mari mediterraneo, *testa satis magna alba, epidermide pilosa obtecta, vulvae regione quasi angulo compresso prominente.*

senilis. 17. A. testa oblique cordata octosulcata lævi, margine plicato. *Mus. Lud. Ulr.* 518. *n.* 92. *

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 5. Fagan.
*List. Conch. t.* 238. *f.* 72.
*Gualt. test. t.* 87. *f.* D.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* k.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 56. *f.* 554-556.
*Habitat in* Oceano americano, & *ad* Africæ *littus occidentale, testa crassa ultra* 3 *pollices longa* & 4 *lata alba, epidermide nigra, aut (in junioribus) fusca thalassino mista obducta, anterius hiante.*

granosa. 18. A. testa subcordata: sulcis muricatis. *Mus. Lud. Ulr.* 519. *n.* 93. *

*Column. purp.* 11. *p.* 29. 30.

*Ma-*

---

*An huic generi accensendæ, & cuinam ejus tribui & familiæ conchæ ab Argenville Conch. t.* 29. *f.* 17. a. & a Knorr *Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 4. *delineatæ?*

*Major teſt. t.* 10. *f.* 3.
*Liſt. Conch. t.* 241. *f.* 78. & *t.* 242. *f.* 79.
*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* k.
*Petiv. amb. aq. t.* 17. *f.* 7.
*Galt. teſt. t.* 87. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* C.
*Klein oſtr. t.* 10. *f.* 45. 46.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 34. *f.* 2.
*Martini Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 10.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 56. *f.* 557.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *teſta alba, ad* 1½ *pollicem longa, &* 1¼ *lata, fere aequilatera, coſtis circiter* 20 *validis ſpinoſo tuberculatis.*

Corbicula. 19. A. teſta ovata compreſſiuſcula: ſtriis perpendicularibus confertim nodulosis, natibus obtuſis approximatis.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 56. *f.* 558.
ε) *Liſt. Conch. t.* 234. *f.* 68.
*Klein oſtr. t.* 10. *f.* 43. 44.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 559.
*Habitat ad* inſulas Nicobaricas, *granoſae affinis, teſta* 10 *circiter lineas longa & pollicem lata,* β) *ſubglobosa intus capillariter ſtriata.*

decuſſata. 20. A. teſta lenticulari decuſſatim ſubſtriata, rima clauſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 94. *
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 22.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 30. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 561.
*Habitat in* Oceano americano, *teſta maculis fuſcis ſparſis varia, ſtriis tranſverſis nudo oculo vix conſpicuis, cardine leviter arcuato.*

aequilatera. 21. A. teſta lenticulari ſubæquilatera extrinſecus nitusque perpendiculariter ſtriata alba: maculis ſpadiceis.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 562.
*Habitat rarior in* Oceano americano, *decussatae affinis, at testa tenuiore, natibus approximatis.*

pallens. 22. A. testa lenticulari subobliqua decussatim striata, rima angustissima. *Mus. Lud. Ulr.* 549. *n.* 95. *
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 270. *t.* 9. *f.* 1.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *aequilatera intus alba, exterius pallide inter... hinc inde obscurius maculata & nebulosa, ... subtilibus, transversis subtilissimis confertissimis natibus mediis conniventibus, cardine arcuato.*

Cucullus. 23. A. testa ventricosa decussatim striata: vulva cordata, valvis intus costa curvata violacea fasciata auctis; altera prominente, natibus remotis.
*Martini Besch. Berl. Naturf.* 3. *t* 7. *f.* 15. 16.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 53. *f.* 526-528.
*Habitat ad* insulas Nicobaricas, *testa ultra 2 pol. lineas longa, & ultra 3 lata, extrinsecus cinnamomea; utrum hujus, an sequentis familiae?*

magellanica. 24. A. testa utrinque rotundata decussatim striata, spadicea: margine externo in medio inflexo recto pando, natibus approximatis.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 53. *f.* 539.
*Habitat in* freto magellanico.

reticulata. 25. A. testa subrhomboidea decussatim striata, alba: natibus approximatis, vulva cordata.
*List. Conch. t.* 233. *f.* 67.
*Martini Besch. Berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 9.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 54. *f.* 540.
*Habitat* - - - *arcae Noae affinis; utrum hujus an sequentis familiae?*

can-

candida. 26. A. testa pellucida rhomboidali anterius producta posterius truncata decussatim striata : natibus remotis, margine posterius hiante ; hiatu ovato ciliato.

*Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 542.*

β) *Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 544.*

*Habitat in* Oceano americano & *ad* Africæ littus occidentale, *testa alba, quasi granulata, epidermide villosa ex atro subfusca obducta.*

indica. 27. A. testa inæquivalvi ovata : striis planis longitudinalibus sulcisque profundis, vulva cordata.

*List. Conch. t. 232. f. 66.*

*Martini Besch. Berl. Naturf. 3. t. 6. f. 13.*

*Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 543.*

β) *Mart. Besch. Berl. Naturf. 3. t. 6. f. 11.*

*Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 552.*

*Habitat in* Oceano indico, *testa* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, & $1\frac{1}{2}$ *lata, alba, epidermide fusca villosa tecta.*

jamaicensis. 28. A. testa anterius truncata posterius rotundata : costis perpendicularibus crenatis vel nodulosis.

*List. Conch. t. 229. f. 64.*

*Habitat ad* Jamaicam ; *utrum hujus, an sequentis familiae ?*

campechiensis. 29. A. testa ovata : striis perpendicularibus latis crenatis aut squamosis, cardine arcuato.

*List. Conch. t. 237. f. 71.*

β) *List. Conch. t. 243. f. 74 ?*

*Habitat in* sinu Campechiensi, β) *apud* Borbados.

lata. 30. A. testa latiuscula cancellata anterius truncata : vulva cordata.

*Gualt. test. t. 90. f. C.*

*Habitat - - - testa ventricosa vix pollicem lata & dimidio brevior ; utrum hujus, an sequentis familiae ?*

se-

senegalensis. 31. A. testa ovata longitudinaliter sulcata transversim subrugosa alba.

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 18. *f.* 6. Robet.

*Habitat ad* Africæ *littus occidentale, testa* 8 *lineas longa, &* 10 *lata interdum subrubella, intus quoque sulcata.*

†† *natibus inflexis.*

undata. 32. A. testa lenticulari inaurita læviuscula: margine plicato.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 60. 61.

*mus. Kirch.* 2. *f.* 58. 60.

*Gualt. test. t.* 72. *f.* G.

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 14. *f.* 4.

*Martini Besch. Berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 2.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 560.

*Habitat in* Oceano americano, *pectunculo affinis, testa ad* 2 *pollices longa, & perinde lata aequivalvi, subtilissime & confertim transverse striata, fusco maculata, intus alba, interdum quoque fusco maculata, natibus approximatis, cardine arcuato.*

Pectunculus. 33. A. testa lenticulari subaurita sulcata: sulcis subimbricatis, margine plicato. *Mus. Lud. Ulr.* 520. *n.* 96. *

*List. Conch. t.* 239. *f.* 73.

*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 129.

*Gualt. test. t.* 72. *f.* H.

*Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 4.

*Martini Besch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 3. 4.

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 58. *f.* 568. 569.

*Habitat rarior in* Oceano americano *&* mari rubro, *testa planiuscula, ad* 1½ *pollicem longa, vix latiori, alba maculis sparsis fuscis interdum tessellatis varia, intus fusca, albo nonnunquam intermisto, striis* 16-20, *cardine arcuato.*

pe-

pectinata. 34. A. testa lenticulari inaurita longitudinaliter striata: striis lævibus.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 58. *f.* 570. *n.* 1. 2. & *f.* 571.
β) *List. Conch. t.* 239. *f.* 81.
*Klein ostrac. t.* 10. *f.* 41.
*Habitat in* Oceano americano, *pectunculo affinis, at testa minore magis convexa, fusca, spadicea, aut lutea punctata, maculata, nebulosa, aut undulata, intus subfusca aut alba.*

Glycymeris. 35. A. testa subborbiculata gibba substriata. *Mus. Lud. Ulr.* 521. *n.* 97.
*List. Conch. t.* 247. *f.* 82. Chama glycymeris.
*Adans. Senegal.* 1. *t.* 18. *f.* 10. Vovan.
*Bellon. aq.* 408.
*Rondel. test.* 31.
*Gualt. test. t.* 82. *f.* C. D.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 4. & 6. *t.* 14. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 564.
*Habitat in* mari mediterraneo, *ad* Africæ littus occidentale, *in* Oceano americano *pilosa minor, magis lævis & plana, striis transversis oculo nudo vix conspicuis, cardine arcuato, superficie nunc cinerea, nunc spadicea, nunc rubra, nunc flava, nunc maculata, nunc nebulosa, nunc undulata, nunc lineis angulatis notata.*

pilosa. 36. A. testa subborbiculata æquilatera pilosa.
*Gualt. test. t.* 73. *f.* A. Ponderosa ferico indumento.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 80. Nux pilosa.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 79.
*List. Conch. t.* 240. *f.* 77.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 6. & 6. *t.* 12. *f.* 4.
*Martini Conch. berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 565. 566.
ε) *Bonann. recr.* 2. *f.* 78.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 77.

γ) *Liſt. Conch. t. 246. f. 80 ?*
*Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 1. a. b.*
δ) *Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 131 ?*
*Habitat in* mari mediterraneo, *in* Oceano aſiatico & americano, *teſta 2¼ pollices longa lata fuſca, intus alba, interdum fuſco maculata, epidermide villoſa teſta, ſtriis perpendicularibus obliquis, intus quoque conſpicuis, rugis tranſverſas decuſſantibus.*

nummaria. 37. A. teſta ſubrotunda lævi ſubaurita tranſverſim ſtriata.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta unguis magnitudine nitido glabra rufo undulata: ſtriis ſubtilibus ſemis.*

Nucleus. 38. A. teſta obliqne ovata læviuſcula: cardine triangulari.
*Gualt. teſt. t. 88. f. R.*
*Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 574. a. b.*
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *hinc inde etiam in* Europa *foſſilis, teſta avellanae magnitudine ſub epidermide olivacea alba intus argentea, trigona, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis tranſverſis arcuatis paucis, ano ſubcordato.*

rhomboidea. 39. A. teſta tota alba rhomboideo cordata coſtis coſtis anterioribus & dorſalibus nodulofis, natibus remotis.
*Liſt. Conch. t. 244. f. 75.*
*Gualt. teſt. t. 87. f. A.*
*Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 2.*
*Chemn. Conch. 7. t. 56. f. 553. a. b.*
*Habitat in* Oceano indico & americano, *teſta cordata, ano rhomboidali.*

marmorata. 40. A. teſta æquilatera tenui planiuſcula ſubtilifime decuſſatim ſtriata, natibus approximatis, cardine arcuato.
*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 563.
*Habitat in* Oceano americano, *teſta alba, characteribus maculisque flavicantibus varia.*

angulosa. 41. A. teſta ventricoſa longitudinaliter ſtriata & lineata altero latere angulata, natibus approximatis, cardine arcuato.
*Liſt. Conch. t.* 245. *f.* 76.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 57. *f.* 567.
*Habitat ad* littus Africæ occidentale & *in* Oceano americano, *teſta fuſca, aliter atque aliter maculata.*

Scapha. 42. A. teſta oblonga maxime depreſſa ſtriata: natibus vix prominulis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 7.
*Habitat ad inſulam* Zeylon.

313. OSTREA. *Animal* Tethys.
*Teſta* bivalvis (plurimis) inæquivalvis, ſubaurita.
*Cardo* edentulus foſſula cava ovata, ſulcisque (in plurimis) lateralibus transverſis.
*Vulva* anusve nullus.

* *valvis auriculatis radiatis*, Pectines.
† *aequilateres, auriculis aequalibus.*

maxima. 1. O. teſtæ radiis rotundatis longitudinaliter ſtriatis. *En. ſuec* 2148. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 98. *Mull.*

---

Oſtreæ multæ ad cardinem interius ſulcis transverſis numeroſis parallelis in utraque valva oppoſitis gaudent, [illegible] ab arcis [illegible] glymis, quarum dentes [illegible] Pectines exſiliunt ex aquis, aquam in [illegible] exſpuere valent, vaſculoque aperto [illegible] profundo retenti circumjacentia guttulis aquæ inquinant, aquæ [illegible] & [illegible] mox valvas aperiunt, easdemque ſæpius rapide et cum ſonitu claudunt.

*Mull. zool. dan. prodr.* 2989.
*List. an. angl. t.* 5. *f.* 29. Peeten maximus.
*Conch. t.* 263. *f.* 1. & *t.* 167. *f.* 4.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 8.
*muf. Kirch.* 2. *f.* 7.
*Gualt. teft. t.* 98. *f.* A. B. *t.* 99. *f.* A.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. & 2. *t.* 14. *f.* 1. & *t.* 17. *f.* 1. 3 ?
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 19. & *t.* 7. *f.* 3.
*Bytem. app. t.* 12. *f.* 50.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 60. *f.* 585-587.
β) *List. Conch. t.* 168. a.
γ) *Knorr del. nat. fel. t.* B. II. *f.* 2 ?
*Vergn.* 1. *t.* 4. *f.* 2 ?
*Habitat in omni fere* mari europæo, *testa* 5 *circiter pollices longa*, 5½ *lata*, *auriculis magnis decussatim ſtriatis*, *cardinis foſſula ampla profunda*, *valva inferiore convexa alba*, *ſæpius foſſulis nigricantibus rubris varia*, *ſuperiore plana rubra*, *radiis circiter* 14.

jacobæa. 2. O. teſtæ radiis quatuor decim angulatis longitudinaliter ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 99.
*List. Conch. t.* 165. *f.* 2. *t.* 166. *f.* 3.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 3. 4.
*Gualt. teſt. t.* 99. *f.* B.
*Leſſer teſtaceolh. f.* 139.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 22. *f.* 3. 5. *t.* 28. *f.* 4. & *t.* 38. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 60. *f.* 588. 589.
*Habitat frequens in* mari mediterraneo, *maximae affinis*, *teſtae ſulcis transverſim ſtriatis*, *valvae ſuperioris planae radiis rotundatis*, *non longitudinaliter*, *ſed transverſe ſtriatis*, *auriculis laeviſſimis*.

Ziczac. 3. O. teſtæ radiis octodecim explanatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 100. * *List.*

*Liſt. Conch. t.* 168. *f.* 5.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 11. *f.* 53.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 19. *f.* 3. & *t.* 20. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 61. *f.* 590-592.
*Habitat in* Oceano americano, *teſta nunc unicolore, nunc variegata, auriculis ſubtiliter rugoſis, valvae inferioris convexae radiis* 18-20 & *ultra ſubtiliſſime transverſim ſtriatis, intus ſtriis perpendicularibus duplo pluribus; in valva ſuperiore plana lineis angularibus picta radiorum numero duplo majore.*

ſtriatula. 4. O. teſtæ radiis ſedecim obliteratis transverſe membranaceo ſtriatis, margine integerrimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 101. *

*Habitat in* Oceano indico, *mediae magnitudinis, teſta ex pupureo alboque varia intus flaveſcente: radiorum interſtitiis albis, valva inferiore vix magis convexa, quam ſuperior.*

minuta. 5. O. teſtæ radiis viginti convexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 102. *

*Habitat in* Oceano indico, *avellanae magnitudine, teſta inferiore alba valde convexa, ſuperiore alba fuſco nebuloſa planiore plicata.*

Pleuronectes. 6. O. teſta æquivalvi: radiis duodecim duplicatis, extus lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 103. *

*Rumpf muſ. t.* 45. A. B. Amuſium.
*Argenv. Conch. t.* 27. *f.* G. Umbella f. Solea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 354.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 108.
*Petiv. amb. aq. t.* 17. *f.* 14.
*Gualt. teſt. t.* 73. *f.* B.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 30.
*Leſſer teſt theth. f.* 89.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 20. *f.* 3. 4.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 61. *f.* 595.

β) *Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 6.*

*Habitat in* Oceano indico, *testa nunc rubella, nunc carnea, nunc hepatica, in* β) *aurantia rubro radiata, intus argentea, ad* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, utrinque hiante.*

Laurentii. 7. O. valva superiore subconvexa lævi: lineis perpendicularibus tenerrimis striis subtilissimas transversas concentricas secantibus, inferioris radiis viginti quatuor, intus striis quadraginta octo.

*Chemn. Conch. 7. t. 61. f. 593.*

*Habitat rarissima ad* Americæ australis *littora, testa 2 pollices 8 lineas longa, & perinde lata, valva superiore spadicea radiis albis maculisque albidis varia, inferiore alba flavicante obumbrata: radiis paulo obscurioribus.*

japonica. 8. O. testa æquivalvi convexiuscula flavo marginata: valvæ superioris lineis obsoletis fascias transversas concentricas decussantibus: striis intus elevatis quadraginta octo.

*Chemn. Conch. 7. t. 62. f. 596.*

*Habitat varior ad* Guineæ & Japoniæ *littora, pleuronecti affinis, at testa crassiore, auriculis subtiliter rugosis, & infra nodo auctis, valva inferiore ochroleuca glaberrima, testa ad* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa & lata.*

magellanica. 9. O. testa subæquivalvi glabra: striis oblongis confertis.

*Chemn. Conch. 7. t. 62. f. 597.*

*Habitat in* freto magellanico, *pleuronecti affinis, valva testa lateritia non radiata intus glaberrima, valva superiore magis convexa, inferiore magis plana, quam in affinibus, auriculis transversim striatis.*

by-

hybrida. 10. O. testæ radiis novem aut decem: interstitiis longitudinaliter striatis, margine intus repando.
*List. Conch. t. 173. f. 10.*
*Klein ostr. t. 9. f. 31.*
*Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 601. 602.*
*Habitat in* mari norvegico, *testa tenui: valva inferiore alba, superiore sanguinea, venis lineisque angularibus picta.*

Radula. 11. O. testa subæquivalvi: radiis duodecim convexis; striis decussatis crenatis. *Mus. Lud. Ulr. 525. n. 105.* *
*Rumpf mus. t. 44. f. A. Radula.*
*List. Conch. t. 174. f. 11? t. 175. f. 12.*
*Pet. amb. aq. t. 17. f. 1.*
*Gualt. test. t. 74. f. L.*
*Argenv. Conch. t. 24. f. D.*
*Knorr Vergn. 5. t. 9. f. 4.*
*Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 599. 600.*
*Habitat rarior in* Oceano indico, *testa oblonga 3¼ pollices longa, 2¼ lata, alba, vel albo fuscoque varia, satis complanata, ut tamen valva inferior magis convexa sit, auriculis rugosis striis obliquis exaratis.*

imbricata. 12. O. testa subæquivalvi planiuscula radiis novem inæqualibus imbricatim squamosis.
*Chemn. Conch. 7. t. 69. f. G.*
*Habitat in* mari rubro, *radulae affinis, testa albida purpureo maculata ad marginem paullisper crenata, radiis alternatim majoribus.*

subrotunda. 13. O. testa subrotunda: radiis octo convexis spadiceis, auriculis subrotundis albis: limbo luteo.
*Knorr Vergn. 2. t. 19. f. 4.*
*Habitat - - - testa excolore, 1¼ pollicis longa, 2 lata.*

Plica.

Plica. 14. O. testa subæquivalvi: radiis sex convexis lævibusculis, deculatim striata. *Mus. Lud. Ulr.* 520. n. 106. *

*Rumph. mus. t.* 44. *f.* O. Pallium maculatum.
*List. Conch. t.* 171. *f.* 8.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 2. *f.* 9. 10.
*Petiv. amb. aq. t.* 2. *f.* 10.
*Gualt. test. t.* 74. *f.* C. C.
*Argenv. Conch. t.* 24. *f.* C.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 62. *f.* 598. a. b.
β) *Gualt. test. t.* 73. *f.* E ?
*Habitat rara in* India, *testa alba, aut alba fusco maculata, aut rubra albo maculata* 1¼ *pollicis circiter longa,* 1 *lata, striis transversis rarioribus margine repando.*

crenata. 15. O. testa subrotunda: radiis convexis; exterioribus secundum longitudinem subtiliter striatis, margine profunde crenato.
*List. Conch. t.* 170. *f.* 7.
*Habitat* - - - *auriculis transverse striatis.*

sinuosa. 16. O. testa ovata creberrime & subtilissime striata: margine intus crenato.
*List. an. angl. t.* 5. *f.* 31.
*Conch. t.* 172. *f.* 9.
*Habitat in* mari britanico, *testa crocea variegata.*

squamosa. 17. O. testa oblonga: radiis squamosis; interstitiis latioribus perpendiculariter striatis.
*List. Conch. t.* 184. *f.* 21.
*Habitat* - - - *testa lineis angulatis maculisque varia: auriculis perpendiculariter rugosis.*

dubia. 18. O. testa subrotunda: radiis octodecim imbricato squamosis.
*List. Conch. t.* 192. *f.* 29.
*Habitat* - - - *testa ultra* 1¼ *pollicis longa, auriculis transversim striatis.*

elegans. 19. N. testæ radiis viginti lævibus: interstitiis transversim striatis, margine repando.
*List. an. angl. t. 5. f. 30.*
*Habitat ad* Britanniæ magnæ *littora, testa 2 circiter pollices longa paulisper latiore, rubente albo maculata, auriculis transversim striatis.*

versicolor. 20. O. testa complanata: radiis octodecim lævibus; interstitiis cancellatis.
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 6.*
*Habitat - - - testa lutea, alba, thalassina, nigricante aut sanguinea: auriculis transversim striatis.*

rosea. 21. O. testa subrotunda: radiis quinque.
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 2. f. 16.*
*Habitat - - - mediae magnitudinis, testa rosea radiis albis, aut viridi, subflavo lurido & porraceo mista, radiis lividis.*

fusca. 22. O. testa fusca: radiis planis versus cardinem evanescentibus.
*Bonann. recr. 2. f. 87.*
*mus. Kirch. 2. f. 86.*
*Klein ostr. t. 9. f. 35.*
*Habitat in* mari indico, *testa intus candida; valva inferiore convexa, superiore plana.*

tenuis. 23. O. testa tenui plana purpurea: striis minutissimis perpendicularibus circulares decussantibus, intus elevatis.
*Gualt. test. t. 73. f.* C.
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

lutea. 24. O. testa tenui lutea: radiis crassis.
*Gualt. test. t. 73. f.* D.
*ε Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 4. 5?*
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

muricata. 25. O. teſta ſubrotunda ex albo crocea : radiis convexis ſubtiliſſime & acutiſſime muricatis.
*Gualt. teſt. t. 73. f. I.*
*Habitat - - - teſta 2½ pollices longa.*

conſperſa. 26. O. teſta ſubrotunda ſpadicea albo nigroque punctata : radiis craſſis.
*Gualt. teſt. t. 73. f. O.*
*Habitat - - - teſta puſilla.*

nodulosa. 27. O. teſta ſubrotunda fuſca : lineis transverſis punctisque nigris, radiis convexis nodoſis.
*Gualt. teſt. t. 73. f. P.*
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

radiata. 28. O. teſta tenui albido roſea albo virgata : radiis convexis.
*Gualt. teſt. t. 73. f. Q.*
*Habitat - - - nodulosa paulo major.*

punctata. 29. O. teſta oblonga lutea albo maculata : natibus albo fuſcoque variis, radiis crenatis.
*Gualt. teſt. t. 74. f. G.*
*Habitat - - - teſta 2 pollices longa : auriculis cancellatis.*

aculeata. 30. O. teſta tenui roſeo albidoque varia ſubrotunda : radiis craſſis ſquamoſo-aculeatis.
*Gualt. teſt. t. 74. f. H.*
*Habitat - - - punctatae magnitudine.*

plana. 31. O. teſta complanata tenui candida : cardine croceo, radiis rotundis latis.
*Gualt. teſt. t. 74. f. I.*
*Habitat - - - -*

puſilla. 32. O. teſta oblonga rubra minutiſſime ſtriata. *Gualt.*

*Gualt. teſt. t. 74. f. AA.*
*Habitat - - -*

flaveſcens. 33. O. teſta utrinque convexiuſcula intus flavicante : radiis convexis.
*Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 8.*
*Habitat - - - teſta exigua.*

Flabellum. 34. O. teſta ſubrotunda ruberrima : cardine maculisque nonnullis albis , radiis lævibus.
*Regenf. Conch. 1. t. 9. f. 33.*
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

ſpondyloides. 35. O. teſta glabra rubra.
*Regenf. Conch. 1. t. 9. f. 34.*
*Habitat - - - ſpondylo affinis , at auriculis aequalibus.*

violacea. 36. O. teſta utrinque planiuſcula exterius fuſca intus violacea.
*Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 52.*
*Habitat in* mari mediterraneo , *diametri pollicaris.*

aurantia. 37. O. teſta ſubrotunda plicata ſubtiliter ſecundum longitudinem ſtriata : faſcia verſus cardinem ſemicirculari alba.
*Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 56.*
*Habitat - - -*

vittata. 38. O. teſta intus purpurea , extrinſecus faſciis fuſcis rubrisque alternis varia : radiis convexis.
*Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 59.*
*Habitat - - - inter minores.*

miniata. 39. O. teſta alba maculis rubris confluentibus varia : radiis aſperis , valvæ convexioris lamellis tranſverſis criſpis.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. f. 1.*

*Habitat - - - testa 1 pollicem 6 lineas longa, 8 l. p. 4. l. lata.*

inflata. 70. O. testa utrinque convexa clausa oblonga pel. lucida : radiis 32.
*v. Born mus. Caes. Vind. test. t. 6. f. 7. 8.*
*Chemn. Conch. 7. t. 68. f. 649. b.*
*Habitat rarissima - - - testa ochroleuca tenui du plo longiori quam lata.*

†† *auriculis inaequalibus : altera saepius inte ciliato spinosa.*

Pallium. 40. O. testa æquivalvi : radiis duodecim conve xis, striata scabra squamis imbricata. *Mus Lud. Ulr.* 526. *n.* 107. *
*Rumpf mus. t. 44. f. B.* Pecten secundus.
*Argenv. Conch. t. 24. f. 1.* Pallium ducale.
*List. Conch. t. 187. f. 25 ?*
*Valent. Abh. t. 16. f. 26.*
*Petiv. amb. aq. t. 17. f. 2.*
*Gualt. test. t. 74. f. F.*
*Seb. mus. 3. t. 87. f. 8-12.*
*Regenf Conch. 1. t. 6. f. 59.*
*Knorr Vergn. 2. t. 5. t. 21. f. 1. 2. & t. 27. f. 2.*
*Murray testaceol. t. 2. f. 4.*
*Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 607.*
β) *Seb. mus. 3. t. 87. f. 17 ?*
γ) *Knorr Vergn. 1. t. 19. f. 2.*
*Habitat in* India, *testa solida, rubro, albo fusc que varia, auriculis striatis, crenatis aut squa mosis : altera longiore, margine testae denticu lato.*

sangui- 41. O. testa æquivalvi : radiis novem crassis ob
nolenta. tusis : interstitiis longitudinaliter striatis nodosis & aculeatis.
*Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 608.*

Ha

*Habitat in* mari rubro, *pallio affinis, teſta alba ſanguineo-maculata : margine plicato crenato ; limbo purpuraſcente, auricularum ſtriis tranſverſis nodulofis.*

macu-loſa. 42. O. teſta æquivalvi lutea ſpadiceo maculata : radiis duodecim craſſis, planiuſculis, auriculis albis laterntio variis : coſtis tranſverſis ſquamoſis.

*Knorr Vergn. 2. t. 19. f. 5.*
*Habitat - - -*

nodoſa. 43. O. teſtæ radiis novem nodoſo-veſicularibus.
*Muſ. Lud. Ulr. 527. n. 108.* *
*Rondel. teſt. 25.* Concha corallina.
*Argenv. Conch. t. 24. f.* F. Pecten corallinus.
*Liſt. Conch. t. 186. f. 24.*
*Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 138.*
*Rumpf muſ. t. 48. f. 7. 8.*
*Gualt. teſt. t. 99. f.* C. D.
*Seb. muſ. 3. t. 87. f. 1-5.*
*Regenf. Conch. 1. t. 4. f. 38.*
*Knorr delic. t.* B. II. *f. 5.*
*Vergn. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5.*
*Spengler Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. t. 13. f. 1. 2?*
*Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 609-611.*
*α) Knorr Vergn. 2. t. 21. f. 5?*
*γ) Knorr Vergn. 3. t. 24. f. 1. & t. 25. f. 1?*
*Habitat in* Oceano africano & americano, *teſta nunc rubra, nunc kermeſina, nunc rubro alboque, nunc ſpadiceo alboque varia flavedine intermiſta, teſta ſuperiore magis convexa, quam inferiore : auricula intus & ſubtus ſpinoſa.*

Pes fe-lis. 44. O. teſta radiis novem ſtriatis ſcabris : auricula altera minuta. *Muſ. Lud. Ulr. 527. n. 109.* *
*Bonann. recr. 2. f. 7.*
*muſ. Kirch. 2. f. 8.*

*v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 2.*
*Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 612. & t. 65. f. 613.*
*Habitat ad* Africæ *littora, teſta parva, tenui, pel-*
*lucida, utplurimum ſubincarnata maculata &*
*noſa, intus glabra, alba, radiis ſubundulatis,*
*marginis plicis crenatis, auricularum ſtriis tranſ-*
*verſis nodoſis.*

pellu-cens. 45. O. teſta ſubæquivalvi: radiis novem, lævi-
fornice ſquamis cochleari-hemiſphæricis. *Muſ.*
*Lud. Ulr. 528. n. 110.* *

ε) *Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 625-627?*
*Habitat in* mari africano, *teſta ovata minuta, pel-*
*lucida, glabra, alba: valva ſuperiore rubro ma-*
*culata.*

oblite-rata. 46. O. teſta extus lævi: radiis viginti quatuor du-
plicatis. *Muſ. Lud. Ulr. 525. n. 104.* *
*Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 622-624.*
*Habitat rara in* Oceano indico, *pleuronecti aſſi-*
*nis, at teſta minore, ſubtiliſſime decuſſatim ſtria-*
*ta, teſta inferiore dilute rubente, ad cardinem*
*ſubflaveſcente, ſuperiore obſcure rubra, aut ſu-*
*ſpadicea.*

ſangui-nea. 47. O. teſta æquivalvi: radiis viginti duobus ſe-
bris, ſemi-aurita. *Muſ. Lud. Ulr. 528. n. 111.*
*Liſt. Conch. t. 185. f. 22.*
*Gualt. teſt. t. 74. f. M?*
*Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 628.*
*Habitat in* mari mediterraneo, atlantico, ameri-
cano, *teſta ſubrotunda planiuſcula ſanguinea, ſu-*
*ſpadicea, aut kermeſina, ad 2 pollices longa, 1¾*
*lata, radiorum interſtitiis perpendicularibus*
*ſtriatis.*

varia. 48. O. teſta æquivalvi: radiis triginta ſcabris
compreſſis echinatis, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.*
*Liſt.*
529. *n.* 112. *

*Liſt. Conch. t.* 178. *f.* 15.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 5.
*Gualt. teſt. t.* 73. *f.* G. N. *& t.* 74. *f.* R.
*Argenv. Conch. t.* 24. *f.* H.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 18. *f.* 3. 5. *t.* 11. *f.* 3. *& t.* 12. *f.* 5. 6. *t.* 16. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 66. *f.* 633. 634.
*Habitat in* mari mediterraneo, *ſanguineae affinis, at teſta colore magis varia, magis convexa, utrinque aculeata margine magis crenata, radiis pluribus magis convexis: interſtitiis profundioribus non ſtriatis, auricula altera minima duplici aculeorum ordine armata, altera rugoſo plicata, ſubtus* 5-7 *aculeis armata.*

Puſio. 49. O. teſta æquivalvi: radiis quadraginta filiformibus, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 113. *
*Liſt. Conch. t.* 181. *f.* 18. *& t.* 189. *f.* 23.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 15.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 12. *f.* 2. *&* 5. *t.* 13. *f.* 2. *& t.* 28. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 67. *f.* 635. 636.
*Habitat in* mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta avellanae utplurimum magnitudine, interdum duplo majore, paulo longiore, quam lata, nunc hyalina maculis rubentibus, nunc crocea rubrave maculis albis varia, auricula altera vix conſpicua, altera infra crenam acute ſpinoſa.*

Glabra. 50. O. teſta æquivali: radiis decem lævibus planiuſculis, internis ſtriis elevatis duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 530. *n.* 114. *
*Bonann. muſ. Kirch. & recr.* 2. *f.* 11-13.
*Gualt. teſt. t.* 73. *f.* H. *& t.* 74. *f.* A-D. F. Z.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 29.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 16.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 1. *f.* 10. *t.* 3. *f.* 30. 31. *t.* 8. *f.* 15 ? *t.* 9. *f.* 28. *& t.* 11. *f.* 60.

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 1. *t.* 8. *f.* 5. 2. *t.* 10. *f.* 2. & *t.* 18. *f.* 5. & 5. *t.* 9. *f.* 2. & *t.* 10. *f.* 5. 6.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 6. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 67. *f.* 638-645.
*Habitat in* ſinu adriatico, mari mediterraneo, & *ad* Guineam, *teſta ſubrotunda* 2 *pollices longa lata, rubra, flava, vel fuſca, rarius unicolore, quam maculata aut nebuloſa, interdum alba: valva ſuperiore fuſco maculata, ſulcis nonnunquam lineatis, auriculis aequalibus, margine repando.*

opercularis. 51. O. teſta radiis viginti ſubrotunda decuſſatim ſtriato-ſcabra, operculo convexiore. *Muſ. Lud. Ulr.* 530. *n.* 115. * *Mull. zool. dan. prodr.* 2997.
*Liſt. Conch. t.* 190. *f.* 27. & *t.* 191. *f.* 28.
*Seba muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 15.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 3. *f.* 2 ? 3 ?
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 67. *f.* 646.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 317. *t.* 9. *f.* 3.
*n. Litterat.* 3. *p.* 304.
β) Pecten (vigintiſulcatus) teſta æquivalvi intus & extus ſulcata fulva, maculis raris rufis, interſtitiis rugoſis. *Mull. zool. dan. prodr.* 2996 ?
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 4 ?
*Habitat in* mari adriatico & ſeptentrionali, *teſta biante utplurimum variegata, in* γ) *aurorae in modum tincta, ad* 2½ *pollices longa, &* 2½ *lata, radiis acutis, interdum rotundatis, margine repando, intus dentato, auriculis decuſſatim ſtriato-rugoſis, longiore emarginata, & ſub inciſura ſpinoſa.*

gibba. 52. O. teſta æquivalvi: radiis viginti glabris, gibba. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 116. *
*Gualt. teſt. t.* 73. *f.* F.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 1. *f.* 11. *t.* 2. *f.* 16. 17. *t.* 5. *f.* 51. & *t.* 11. *f.* 51.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 18. *f.* 2. 2. *t.* 5. *f.* 4. & *t.* 17. *f.* 2. & 5. *t.* 13. *f.* 9.

*Brown*

*Brown jam. t.* 40. *f.* 10.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 619. 620.
ε) *Liſt. Conch. t.* 182. *f.* 19.
*Habitat in* mari atlantico & americano, *teſta utrinque convexa rubra, rarius unicolore, quam albo maculata, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſime crenatis notata, margine crenato, auriculis aequalibus.*

ſulcata. 53. O. teſta alba carneo-maculata: radiis glabris, fornicis 32, operculis 28.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 6. *f.* 5. 6.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 63. *f.* 603. 604.
*Habitat ad* Malabariae *littus, teſta circiter* 1½ *pollicem longa, & paulo latiore, margine plicato crenato, fornicis auricula emarginata ſpinoſa, operculo complanato.*

hiſtrionica. 54. O. teſta tenui complanata pellucida ſubtilite. transverſim rugoſa: radiis undecim.
*Bonanni. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 14.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 12 *f.* 3.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 97. *vign. f.* 6. *& t.* 6 *? f.* 3.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 614.
*Habitat - - - teſta alba-rubro-& nigro maculata, radiis undatis, auriculis ſubaequalibus.*

islandica. 55. O. teſta orbiculari: circulis purpureis, radiis centum. *Muli. zool. dan. prodr.* 2990.
*Fabr. Fn. groenl. p* 415. *n.*410. Pecten teſta ſuborbiculari aurita: radiis plano-convexis ſubtilis numeroſis; alternis minoribus integris, interne crocea.
*It. wgoth. t.* 5. *f.* 7.
*Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 4.
*Gualt. teſt. t.* 73. *f.* R.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 7.

*Knorr*

*Knorr delic. t.* B. II. *f.* 3. 4.
*Vergn.* 1. *t.* 4. *f.* 1. & *t.* 5. *f.* 2. & 5. *t.* 15. *f.* 1.
*Spengler Schr. berl. naturf. Geſ.* 1. *t.* 5. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 615. 616.
*Habitat in* mari ſeptentrionali *varietate innumera, teſta ad* 3½ *pollices longa &* 3½ *lata, vix hiante, rarius exalbida, quam vivaciſſima rubedine aut flavedine tincta faſciisque transverſis ſemilunaribus ornata, operculo utplurimum elegantiore, radiis* 50-100 *ſquamis acutis imbricatis aſperis, margine crenato, auriculis ſtriis transverſis ſquamoſis notatis, majore emarginata ſpinoſa. Vermis incola edulis.*

triradiata. 56. O. teſta ſubæquivalvi glabra immaculata: ſtriis minutiſſimis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 1. 2. *rar.* 2. *p.* 57. *prodr.* 2991.
*Habitat paſſim in variis* Norwegiæ ſinuum *fucis, teſta rubra maculis parvis albis varia, intus rubente, radiis in operculo tribus: incolae ovario flavicante.*

fuci. 57. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata maculata margine verſus ſcabra.
*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 3-5. *rar.* 2. *p.* 58. *prodr.* 2994. Pecten ſtriatus.
*Habitat in* fuco ſaccharino, *teſta rufa albidis candidisve maculis varia, intus rubra glaberrima: maculis pellucentibus operculi radiis exſoletis, incolae ovario ſplendide rubro.*

tigerina. 58. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata glabra rubra: maculis albidis. *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 6-8. *rar.* 2. *p.* 59. *prodr.* 2993.
*Habitat in* Oceani ſeptentrionalis fucis, *rarior, fornice profundius ſulcata, maculisque magis undulatis confluentibus pallide luteis varia, operculo ſe-*

septem-radiata. 59. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata glabra : radiis convexis ſeptem. *Mull. zool. dan. prodr.* 2992.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali.

arata. 60. O. teſta ſubæquivalvi intus & exterius ſulcata rubea, hinc ſcabra illinc glabra. *Mull. zool. dan. prodr.* 2995.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali.

senatoria. 61. O. teſta utrinque convexa : radiis 22 rotundatis transverſe rugoſis ; interſtitiis longitudinaliter granulatim ſtriatis.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 36 ?
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 617.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta 2 pollices 9 lineas longa, & pene perinde lata, extrinſecus ſpadicea violaceo alboque varia, intus violacea, ad ambitum obſcure badia.*

citrina. 62. O. teſta aurantia : radiis 22 rotundatis, margine plicato, fornice planiore.
*Valent. Abh. t.* 13. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 618.
*Habitat in* India, *radiis nonnullis ſquamoſis ſulcisque quibuſdam granulato-lineatis.*

turgida. 63. O. teſta æquabiliter convexa : radiis 20 glabris ; interſtitiis confertim tranſverſe rugoſis, margine plicato-dentato.
*Liſt. Conch. t.* 169. *f.* 6.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 65. *f.* 621. a. b.
*Habitat rarior in* Oceano indico & americano, *auriculis minimis, fornice alba, operculo ex flavicante, fuſco, albo & cinereo varia, forſan ad tertiam pectinum familiam releganda.*

ſulphurea. 64. O. teſta complanata tenui pellucida ſtriata : radiis plurimis fornicato-imbricatis, margine plicato-crenato. *Seb.*

*Seb. muſ. 3. t. 87. f. 13. 18.*
*Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 629.*
ε) Pecten aurantius. *Seb. muſ. 3. t. 87. f. 14.*
*Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 630. 631.*
*Habitat in* mari rubro, *teſta ſulphurea fragili 2 circiter pollices longa, & paulo anguſtiore, ſex nicis radiis aequalibus, operculi alternatim minoribus; β) teſta aurantia, interdum ſanguinea, carbuncline aurantio, faſciaque ſemilunari alba, aut albo & dilute ſpadiceo varia: limbo ſanguineo.*

porphyrea. 65. O. teſta convexa purpurea intus alba aut ſanguinea: radiis 25 craſſis rotundatis ſquamoſis.
*Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 632.*
*Habitat in* mari rubro, *teſta 2 pollices & 3 lineas longa, & aeque lata, maculis nonnullis albis varia.*

vitrea. 66. O. teſta hyalina margine acuta: radiis tenuiſſimis, ſquamularum arcubus concentricis.
*Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. a.*
ε) *Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. b. c.*
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *inter fucos & zoophyta, lentis utplurimum magnitudine, teſta levi fragili alba; β) albo rubroque varia, auricula altera emarginata ſpinoſa.*

tranquebaria. 67. O. teſtæ radiis viginti rotundatis: interſtitiis ſubtiliter rugoſis, margine repando.
*Liſt. Conch. t. 179. f. 16.*
*Gualt. teſt. t. 73. f.* L. M.
*Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 2. 3.*
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 2.*
*Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 647. 648.*
*Habitat copioſiſſima ad* Tranquebar, *teſta nunc unicolore, ſaepius aurantia, nunc maculis undulatis fuſcis, rubris, rubellis, cinereisve varia, operculo magis convexo.*

falla-

fanciata. 68. O. teſta alba purpureo maculata: radiis plurimis inæqualibus, margine crenato.
*Chemn. Conch. 7. t. 69. f. H.*
*Habitat in* mari rubro.

crenulata. 69. O. teſta oblonga: radiis ſtriisque undulatis, faſciis tranſverſis interruptis, margine crenulato.
*Liſt. Conch. t. 175. f. 12. a.*
*Habitat - - - exigua.*

innominata. 70. O. teſta ſubrotunda maculata: ſulcis profundis ſubtiliter tranſverſim ſtriatis, margine crenato.
*Liſt. Conch. t. 175. f. 12. b.*
*Habitat - - - crenulata paulo major, auricula altera vix conſpicua.*

ſubrufa. 71. O. teſta ſubrotunda ſubrufa: radiis viginti quatuor, auriculis decuſſatim ſtriatis.
*Liſt. Conch. t. 180. f. 17.*
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

ſquamata. 72. O. teſta ſubrotunda: radiis craſſis parallelo ſquamoſis ad latera aculeatis.
*Liſt. Conch. t. 183. f. 20.*
*Habitat - - - teſta convexa maculata.*

anonyma. 73. O. teſta oblongiuſcula: radiis anguſtis ſquamoſis, interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis, auriculis perpendiculariter rugoſis.
*Liſt. Conch. t. 184. f. 21.*
*Habitat - - - teſta lineis angularibus maculisque varia.*

decemradiata. 74. O. teſta complanata: radiis decem lævibus explanatis inæqualibus, auriculis tranſverſim ſtriatis.

*Liſt.*

*Liſt. Conch t.* 188. *f.* 26.
*Habitat* - - -

tenuis. 75. O. teſta tenui : radiis depreſſis ſquamoſis, auriculis brevibus.
*Rumpf muſ. t.* 44. *f.* C.
*β) Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 45.
*Habitat in* India, *teſta nunc badia, nunc cinerea nigro maculata, (etiam in* mari ſeptentrionali) *nunc alba, nunc miniata, nunc citrina.*

Valentini. 76. O. teſtæ radiis viginti, faſciis tranſverſis ſemilunaribus.
*Valent. Abh. t.* 13. *f.* 2.
*Habitat in* India, *maximae affinis, teſta rubra, auriculis inaequalibus.*

media. 77. O. teſta oblongiuſcula : radiis confertis.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* N. O.
*Habitat* - - - *teſta mediae magnitudinis ex rubro crocea, vel ex piceo nigricante.*

crocea. 78. O. teſta crocea : radiis ſquamoſo-muricatis alternatim minoribus.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* P.
*Habitat* - - - *parva.*

florida. 79. O. teſta ſubrotunda alba : maculis roſeis.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* Q.
*Habitat* - - - *teſta parva radiata ; an diſtincta ſpecies?*

ochroleuca. 80. O. teſta oblongiuſcula ochroleuca : radiis altera parte lævibus, altera granulatis.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* S.
*Habitat* - - - *puſilla.*

mu-

muſtelina. 81. O. teſta muſtelina: maculis faſciisque flavis, radiis laevibus, auriculis tranſverſim ſtriatis.
*Gualt. teſt. t. 74. f.* T.
*Habitat - - - teſta 2¼ pollicis longa & perinde lata.*

flammea. 82. O. teſta crocea oblongiuſcula ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata.
*Gualt. teſt. t. 74. f.* V.
*Habitat - - - exilis.*

incarnata. 83. O. teſta oblongiuſcula incarnata: faſciis rubris interruptis, radiis explanatis.
*Gualt. teſt. t. 74. f.* X.
*Habitat - - - parva.*

guttata. 84. O. teſta ſubrotunda flaveſcente rubro punctata: radiis ad cardinem inæqualiter convergentibus.
*Gualt. teſt. t. 74. f.* B. B.
*Habitat - - - parva.*

depreſſa. 85. O. teſta ochroleuca: radiis explanatis bifidis.
*Gualt. teſt. t. 74. f.* DD.
*Habitat - - - teſta pollicem longa, & paulo latiore.*

regia. 86. O. teſta ſubrotunda ruberrima: radiis rotundatis.
*Seb. muſ. 3. t. 87. f. 6.*
*Habitat - - - pallio affinis, at auricula fornicis profunde emarginata.*

palliata. 87. O. teſta æquivalvi: radiis numeroſis lævibus.
*Knorr. Vergn. 1. t. 19. f. 2.* Ha-

---

Quinam familiæ adſcribendæ, ſi quidem diſtinctæ ſint, ſpecies ab Argenville Conch. t. 24. f. A. & t. 29. f. 19. 2. & zoomorph. t. 6. f. A. delineatæ?

*Habitat - - - pallio affinis, at teſta minus ſcabra, rarius radiata, ſtraminea: faſciis purpureis undulatis.*

feminuda. 88. O. teſta aurantia oblonga ad medium usque ſquamoſo-muricata: radiis viginti duobus.
*Knorr. Vergn. 6. t. 9. f. 4.*
*Habitat - - - teſta 1¾ pollices longa, 1¼ lata: auriculis ſubtiliter ſquamoſis.*

modeſta. 89. O. teſta ſubrotunda cana: maculis ſubfuſcis rubellis & cæruleſcentibus, radiorum interſtitiis latis.
*Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 55.*
*Habitat - - - faſciis ad cardinem 2 filiformibus.*

principalis. 90. O. teſta purpurea margine fuſca: radiis ſquamoſis a medio ad cardinem lævibus.
*Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 63.*
*Habitat - - - pallio affinis.*

verſicolor. 91. O. teſta variegata: radiis pectinatis lævibus.
*Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 64.*
*Habitat - - - teſta 1¾ pollicis longa, variae affinis.*

††† *valvis altero latere magis gibbis.*

flavicans. 92. O. teſta ſubæquivalvi: radiis octo ſtriatis, margine altero rotundato. *Muſ. Lud. Ulr. 531. n. 117.* *
*Habitat in* Oceano *magis* auſtrali, *teſta quaſi obliqua, alba fuſco rubroque varia, intus alba: radiis flavis, auricula altera breviſſima.*

faſciata. 93. O. teſta æquivalvi: radiis viginti ſcabris; interſtitiis ſtriatis: auriculis æqualibus exoletis.
*Muſ. Lud. Ulr. 532. n. 118.* *

*Liſt.*

*Liſt. Conch. t.* 177. *f.* 14.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* EE. *t.* 88. *f.* FF. G.
*Habitat in* mari atlantico & americano, *teſta alba pellucida; utrinque hiante intus ſubtiliter ſtriata: margine crenato.*

fragilis. 94. O. teſta æquivalvi: radiis viginti quinque, margine integerrimo, auriculis acutis.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 650.
*Habitat rara ad* inſulas Nicobaricas, *fuſciatae affinis, at teſta planiore: radiis pluribus, fragili, teni,* 1½ *pollicis longa, & dimidio anguſtiori diſtincta.*

Lima. 95. O. teſta æquivalvi: radiis viginti duobus imbricatis; ſquamis altero margine rotundato, auriculis obliteratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 119. *
*Argenv. Conch. t.* 24. *f.* E. Lima.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 71.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 69.
*Rumpf muſ.* 44. *f.* D.
*Petiv. amb. aq. t.* 8. *f.* 4.
*Gualt. teſt. t.* 88. *f.* F.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 35.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 34. *f.* 3.
*Chemn. Conch.* 6. *t.* 68. *f.* 651.
e) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* E?
*Habitat in* mari mediterraneo, rubro, indico, *teſta alba ad* 3 *pollices longa,* 2½ *lata ſatis plana, radiorum numero incerto: ſquamis elatis, acutis, auriculis rugoſis.*

glacialis. 96. O. teſta æquivalvi: radiis quinquaginta imbricatis interruptis, auriculis æqualibus; altera inæqualiter plicata.
*Liſt. Conch. t.* 176. *f.* 13.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 32. 33.

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 38. *f.* 5.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 652.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 653.
*Habitat in* Oceano americano, *limae affinis teſta nivea* 3 *pollices longa*, $2\frac{1}{4}$ *lata, at radiis longe pluribus margine crenato*, β) *integerrimo.*

hians. 97. O. teſta exalbida tenui undique hiante obliqua: radiis exoletis undulatis ſtriisque transverſis ratundatis ſemilunaribus.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 332. *t.* 9. *f.* 4.
*Habitat in* Norwegia, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ultra* $\frac{3}{4}$ *pollicis lata, auriculis exiguis acutis, margine crenato, intus integerrimo.*

excavata. 98. O. teſta ſolide alba: ſtriis longitudinalibus undulatis, annulisque paucioribus transverſis, intus lævi, uniaurita, margine integerrimo.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 654.
*Habitat rariſſima ad* Norwegiæ *littora, teſta* 5 *pollices longa*, $3\frac{1}{4}$ *lata.*

** *rudes, vulgo* Oſtreæ *dictae.*

Malleus. 99. O. teſta æquivalvi triloba: lobis transverſis.
*Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 121. *
*Rumpf muſ. t.* 47. *f.* H. Oſtreum diviſum.
*Argenv. Conch. t.* 19. *f.* A. Malleus brachiatus.
*Liſt. Conch. t.* 219. *f.* 54.
*Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 120.
*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 10.
*Gualt. teſt. t.* 96. *f.* D. E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 4. 5. & *t.* 93. *f.* 1. 2.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 3. *f.* 1.
*Spengl. ſelt. Conch. t.* 1. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 70. *f.* 655. 656.
*Habitat rara & pretioſa in* Oceani indici & australis abyſſo, *teſta nigra, rarius glutinis ſerie alba.*

*niariorum more tincta, hiante, cruciata, 6 circiter pollices longa, 4¼ lata, valvis lamellatis.*

Valsella. 100. O. testa subpellucida angusta elongata fragili lamellata altero fine rotundata lamellata intus lævissima lucida.
*Chemn. Conch. 8. t. 70. f. 657.*
*β) Martini allgem. Naturg. 4. t. 147. f. 2.*
*Habitat in* mari rubro, *testa fragili violacea, spadicea aut ferruginea ad cardinem hiante, 3½ pollices longa, 1 lata, extrinsecus aspera, fine rotundato tenuiore.*

anatina. 101. O. testa pellucida lamellata lateraliter incurva.
*Spengl. catal. rais. t. 6. f. 1. 2.*
*Chemn. Conch. 8. t. 70. f. 658. & t. 71. f. 659.*
*Habitat rara ad* insulas Nicobaricas, *testa tenui fragili, ex albo & violaceo varia, anati sedenti aliquantum simili, pollicem lata, primo 1½ pollicem perpendiculari, tum incurva, & denuo 1⅝ pollicem longa.*

diluviana. 102. O. testa extus plicata: margine dentibus erectis acutangulis.
*Habitat - - - in* Suecia *montibus calcareis, fossilis, magnitudine edulis & ultra, margine introrsum ad angulum cum testa ipsa rectum erecto; dentibus quasi serra exsectis exterius quasi ex lamellis imbricatis compositis, margine plano saepe transversim striato: Valvis pectinatim plicatis; rugis acutis: Vix videtur distincta hujus generis species.*

Folium. 103. O. testa ovata lateribus obtuse plicata parasitica. *Mus. Lud. Ulr. 534. n. 122.* *
*Rumpf mus. t. 47. f. A.* Ostreum Cratium.
*Petiv. amb. aq. t. 10. f. 1.*

*Argenv. Conch. t.* 19. *f.* F.
*Klein ostr. t.* 8. *f.* 22.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 2.
*Spengl. selt. Conch. t.* 1. *f.* H.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 662-666.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 2. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 5. 6.
*Habitat in* Oceano indico, *gorgoniis non raro adhaerens, testa straminea, spadicea, violacea, intus argentea, cardinis loco fossula trigona, valva superiore dorso circiter medio turgida, utrinque rugosa & transversim costata, inferiore minore planiore medio canaliculata.*

orbicularis. 104. O. testa orbiculata plana: margine integro crenato.
*Gualt. test. t.* 104. *f.* G.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 74. *f.* 680?
*Habitat - - - testa alba, magnitudine extimi articuli pollicis, margine obtusissimo.*

edulis. 105. O. testa semiorbiculata: membranis imbricatis undulatis, valva altera plana integerrima.
*Fn. suec.* 2149. *Mus. Lud. Ulr.* 534. *n.* 123.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2986.
*Gesn. aq.* 2. *p.* 37. Ostrea.
*Bonann. recr.* 2. *p.* 108. *f.* 70. Ostrea.
*mus. Kirch.* 2 *f.* 68.
*Aldr. exsang.* 482. Ostrea Rondeletii marina.
*List. anim. angl. p.* 176. *t.* 4. *f.* 26. 27. Ostreum vulgare maximum.
*Conch. t.* 202. *f.* 36. & *t.* 203. *f.* 37.
*Rondel. aq.* 2. *p.* 37.
*Gualt. test. t.* 102. *f.* A. B.
*Ginann. adr.* 2. *t.* 18. *f.* 127.
*Bester op. subs.* 2. *p.* 62. *t.* 8. *f.* 1. 2. 8. 9.
*Argenv. zoomorph. t.* 5. *f.* A.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 24. *f.* 2. & *t.* 25. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 74. *f.* 682. ε)

ε) *Adans. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 3. Vetan.
*List. Conch. t.* 193. *f.* 30. & *t.* 194. *f.* 31. Ostrea major sulcata, inæqualiter utrinque ad cardinem denticulata.
*Klein ostr. t.* 8. *f.* 21.
υ. *Born mus. Cæs. Vindob. test. t.* 6. *f.* 9. 10.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 73. *f.* 672. 673.
φ) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 146. *f.* 3. 4.
χ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 660 ?
ψ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 661 ?
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 994-996.
*Habitat in* Oceano europæo & indico, ε) *etiam ad caput bonæ spei, ſe ſalis affixa, aut in fundo haerens teſta intus alba glabra, interdum matris perlarum ad inſtar nitente, colore ceterum, forma & magnitudine plurimum variante, ad 3½ pollices longa, & 4 lata; incola vermis eſculenta* υ) *praeſertim ſapidiſſima.*

semiaurita. 106. O. teſta ovalis ſemiaurita lævi baſi obliqua.
*Muſ. Lud. Ulr.* 535. *n.* 134. *
*Gualt. teſt. t.* 84. *f.* H.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 365. *t.* 9. *f.* 6.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta* 1½ *pollicem longa, & 1¼ lata, ſordide olivacea, lineis undatis albis nonnunquam varia tenuiſſima, valva utraque convexa in roſtrum terminata, cardinis foſſulis* 5 *rotundis.*

fornicata. 107. O. teſta rudi oblonga lineari: cardinibus divergentibus interne fornicatis. *Forsk. fn. arab. p.* 124. *n.* 61.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 667. a. b.
*Habitat in* mari rubro, *teſta tota ſpadicea fragili membranacea, digiti longitudine, cui excrescens in roſtrum elongatum acutangulum terminata.*

finenſis. 108. O. teſta rudi lamellata inæquali intus gla-

bra : valva inferiore majore excavata in rostrum terminata : plicis decem obtusis.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 72. *f.* 668.
*Habitat ad* Sinæ littora, *testa pulla, intus ad cardinem exalbida, 4 pollices longa, 3 & 10 lineas lata.*

spondyloidea. 109. O. testa æquivalvi pellucida complanata ovali rostrata glabra : valva superiore striis granulatis perpendicularibus undulatis, margine acutissimo.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 72. *f.* 669. 670.
*Habitat in* India, *testa 2 lineas ultra 3 pollices longa & 5. l. ultra 2. p. lata alba : maculis variis fuscis spadiceis.*

Forskahlii. 110. O. testa plicata in rostrum elongatum incurvatum cavum terminata : costis intermediis rugoso spinoso imbricatis, valva altera plana.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 72. *f.* 671. a. b. c.
*Habitat in* mari rubro, *testa pollicem lata, & cum 3 lineis longa, valva planiore exalbida altera subviolacea.*

plicatula. 111. O. testa longitudinaliter plicata : plicis rugosis, valva inferiore paulo minore & planiore.
*Gualt. test. t.* 104. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 73. *f.* 674.
*Habitat in* mari americano & mediterraneo, *forma & magnitudine varia, testa utplurimum fuscanerea, violaceo intermisto, interdum alba rubra aut caeruleſcente striata.*

rostrata. 112. O. testa oblonga rugosa : valva superior lamellata margine denticulata, altera excavata longitudinaliter sulcata, rostro prominente.
*Gualt. test. t.* 102. *f.* D.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 73. *f.* 676.

*Ha-*

*Habitat in* mari mediterraneo, *valva ſuperiore ex viridi flavicante, altera violacea alboque varia, intus cretacea.*

virginica. 113. O. teſta ſubæquivalvi craſſa rudi lamelloſa: valvæ alterius roſtro prominente.
*Liſt. Conch. t.* 200. *f.* 34.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 73. *f.* 677.
*β) Liſt. Conch. t.* 201. 35.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 74. *f.* 678.
*Habitat in* Oceano americano & indico, *teſta ad* 9 *pollices longa, & 4 lata, exalbida, aut ochracea, intus nitente alba.*

Cornucopiæ. 114. O. valva ſuperiore plana, inferiore excavata ſtratis, ſquamis, rugis plicisque inæquali in roſtrum elongatum terminato.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 6. *f.* 11. 12.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 74. *f.* 679.
*Habitat in* Oceano indico & africano.

paraſitica. 115. O. teſta tenui: valva inferiore convexa craſſiori; altera plana.
*Rumpf muſ. t.* 46. *f.* O.
*Petiv. amb. aq. t.* 19. *f.* XI.
*Klein. oſtr. t.* 8. *f.* 17.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 74. *f.* 681.
*β) Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 1. Gaſar.
*γ) Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 907.
*Habitat in* mari indico & atlantico, *arborum littoralium praeſertim mangiferae radicibus affixa, forma & magnitudine varians, ut teſta interdum palmam virilem aequet.*

exalbida. 116. O. teſta tenui: valva ſuperiore longiore magisque convexa.
*Knorr Verga* 5. *t.* 14. *f.* 3. 4.
*Habitat in* mari adriatico, *aliis teſtaceis nunc gregarie*

*gatim nunc solitarie affixa, testa ad 1½ pollicem usque longa, ceterum magnitudinis formaeque variae, utplurimum exalbida, rarius flava aut violacea.*

crista-ta. 117. O. testa rugosa imbricatim lamellata: margine obtuse plicato dentato, apice altero producto. *v. Born mus. Caes. Vind. test.* 1. *p.* 98. *t.* 7. *f.* 3.

*Habitat* - - - *testa pollicem & 10 lineas lata, alba: maculis sparsis nigris, cardinis dente medio lato conico.*

senega-lensis. 118. O. testa æquivalvi subrotunda lævi complanata.

*Adans. Seneg.* 1. *p.* 202. *t.* 14. *f.* 5. Rojel.

*Habitat ad* Africæ littus occidentale, *saxis adhaerens, testa diametri bipollicaris spadicea, intus exalbida.*

stellata. 119. O. testa tenui depressa rudi inæquali: valva superiore costata, costis sparsim spinosis.

*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 377. *n.* 119. *t.* 9. *f.* 7. a. b.

*Habitat ad* Guineam, *cardine aliis corporibus affixa, testa nunc subrotunda nunc oblonga, tenuissima, alba, radiis, virgis maculisque rubris aut caerulescentibus.*

ovalis. 120. O. testa ovali tenuissima in rostrum breve acutum laterale canaliculatum producta: striis obsoletis purpurascentibus inæqualibus.

*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 378. *n.* 120. *t.* 9. *f.* 8.

*Habitat* - - - *testa pollicem circiter longa, fragilis, exalbida, intus ergo tota alba nitente, valva superiore superiorem longitudine & latitudine superante.*

pa-

papyracea. 121. O. teſta ſubrotunda nivea tenuiſſima pellucida : valva ſuperiore in roſtrum breve acutum terminata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 378.
*Habitat intrinſecus in* lepadis tintinnabuli *teſta, firmiſſime adhaerens.*

annulata. 122. O. teſta æquivalvi orbiculari alba : ſemicirculis concentricis. *Mull. zool.dan. prodr.* 2987.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali ; *an diſtincta a reliquis ſpeciés ?*

retuſa. 123. O. teſta æquivalvi oblonga alba glabra ſtriata : umbone a cardine remoto. *Mull. zool. dan. prodr.* 2988.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali.

**** cardinis linea perpendiculariter ſulcata.*

Perna. 124. O. teſta æquivalvi obovata inæquali : hinc rotundiore.
*Liſt. Conch. t.* 199. *f.* 33. & *t.* 228. *f.* 63.
*Klein. oſtr. t.* 8. *f.* 19. 20.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 90.
*Martini Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 7. *f.* 20. 21.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 579. 580.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 351. *t.* 9. *f.* 5.
*Habitat rara in* Oceano indico & americano, *teſta ad* 2½ *pollices longa, figura pernae, alba, interdum ferruginea, lamellata, ad cardinem laevi, roſtro brevi, recto, aperto.*

Iſognomum. 125. O. teſta æquivalvi : lobo laterali majore.
*Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 120. *
*Rumpf muſ. t.* 47. *f.* I.
*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 11.
*Klein oſtr. t.* 8. *f.* 15.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 6.

*Chemn.*

*Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 584.*
*β) Seb muſ. 3. t. 91. f. 7.*
*γ) Gualt. teſt. t. 97. f. A.*
*Valent. Abh. t. 13. f. 3.*
*Seb. muſ. 3. t. 91. f. 8.*
*Knorr Vergn. 4. t. 10. f. 1. 2. & 6. t. 13. f. 1.*
*Mart. Beſch. Berl. Naturf. 3. t. 7. f. 19.*
*Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 582.*
*ε) Chemn. Conch. 7. t. 59. f. 583.*
*Habitat rarior & pretioſa in* Oceano indico, *α) ad quosque in* auſtrali, *teſta interdum ultra 5, γ) ad 7½ pollices longa, & in medio 1¼ lata, nigra vitta laceo intermiſto, intus margaritacea, lamellata, roſtro aperto.*

Ephippium. 126. O. teſta æquivalvi orbiculata compreſſa membranacea. *Muſ. Lud. Ulr. 525. n. 135.*
*Liſt. Conch. t. 227. f. 62.*
*Klein oſtrac. t. 18. f. 18.*
*Seb. muſ. 3. t. 90. ſer. ſuc. fig. 1. & ult.*
*Knorr Vergn. 6. t. 21. f. 1.*
*Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 7. f. 22.*
*Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 576. 577.*
*Habitat rariſſima in* Oceano indico *& ad capitis* bonæ ſpei, *teſta nigricante, ferruginea aut purascente intus margaritacea, 5 pollices aliquando longa, & 5½ lata, hiante, ſubrotunda, lamellata: margine acutiſſimo.*

picta. 127. O. teſta æquivalvi tenui pellucida ad cardinem acuminata, altero fine dilatata: margine acutiſſimo.
*Mart. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 7. f. 23. 24.*
*Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 575.*
*Habitat in* mari rubro, *teſta nonnullas lineas ultra pollicem lata, duasque longa ex fuſco luteſcente radiis dilutioribus undulatis.*

Le-

Legumen. 128. O. teſta complanata cana tenui pellucida lamellata : cardinis linea obliqua ; ſulcorum interſtitiis nigris.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 578.
*Habitat rara ad* inſulas Nicobaricas, *teſta* 4 *lineas lata*, & 2 *ultra pollicem longa*, *macula ad umbonem livida.*

alata. 129. O. teſta complanata fragili pellucida marginem verſus dilatata, cardinis linea obliqua in roſtrum parvum terminata.
*Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 581.
*Habitat rara in* Oceano americano.

mytiloides. 130. O. teſta ſubæquivalvi ovata ventricoſa recta.
*Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *n.* 11. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
*Habitat* - - - *foſſilis in* Alſatia *prope* Gundershofen.

torta. 131. O. teſta æquivalvi intorta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *p.* 276.
*Habitat* - - - *foſſilis in* Alſatia *prope* Gundershofen.

Pes lutræ. 132. O. teſta æquivalvi lauri cuneata : plicis ſenis obtuſis. *Mant.* 2. *p.* 547.
*Gualt. teſt. t.* 74. *f.* C C.
*Liſt. Conch. t.* 171.
*Argenv. Conch. t.* 27. *f.* A.
*Habitat teſta ex purpuraſcente alboque varia longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata* ; *an hujus tribus ? an hujus etiam quidridentata*, *a* Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XVI. *memorata ?*

314. ANOMIA. *Animal* Corpus Ligula *emarginata ciliata : ciliis valvæ superioris affixis* : Brachiis 2 *lineari-subulatis corpore longioribus conniventibus porrectis, valvæ alternis utrinque ciliatis : ciliis affixis valvæ utrique.*

*Testa* inæquivalvis : valva altera planiuscula, altera basi magis gibba : harum altera basi rarius perforata.

*Cardo* cicatricula lineari prominente introrsum dente lateralibus ; valvæ vero planioris in ipso margine.

*Radii* duo ossei pro basi animalis.

Cranio-laris. 1. A. testa orbiculata : valva gibbosiore convexa, planiore basi foveolis tribus.

*Retz. Schr. berl. Naturf.* 2. *t.* 1. *f.* 2. 3.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 687. a. b.
*β) Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 688. *α. β.*
*Habitat rarissima in* mari mediterraneo *& ad insulas* Philippinenses (*frequentius fossilis*, municipalis Brattenburgensis), *testa albida, vix pollicem longa, & ¾ lata, valva inferiore solidiore intus tuberculis* 3 *laevibus inaequali.*

pectinata. 2. A. testa oblonga ramoso-sulcata : gibbosiore posterius foveolis duobus.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 689. 690.
*Habitat in* mari mediterraneo, (*frequentius fossilis*) *testa exalbida, pollicem circiter longa, & ½ lata, valva planiore perforata, altera striis longi-*

*gitudinalibus asperis, squamosis, hinc inde bifidis inaequali.*

Ephippium. 3. A. testa suborbiculata rugoso-plicata planiore perforata.
*List. Conch. t. 204. f. 38.*
*Bonann. recr. 2. f. 56.*
*mus. Kirch. 2. f. 55.*
*Gualt. test. t. 97. f. B.*
*Ginann. adr. 2. t. 27. f. 172.*
*Argenv. Conch t. 19. f. C.*
*Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 692. 693.*
*Habitat in* Oceano indico & americano, *testa utplurimum alba, interdum rubella, 2 pollices longa, 2¼ lata, tenera sublamellata.*

Cepa. 4. A. testa obovata inæquali violacea: superiore convexa, inferiore perforata.
*Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 5.*
*Murray testaceol. t. 2. f. 13.*
*Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 694. 695.*
β) Anomia violacea. *Dis. encyclop. p. 71. n. 4.*
*Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, testa figurae variae, nucis juglandis utplurimum magnitudine, valva inferiore alba, superiore ex rubescente caerulescente.*

electrica. 5. A. testa subrotunda flava lævi, altera convexo gibbosa.
*Rumph. mus. t. 47. f. L.* Ostreum electricum.
*List. Conch. t. 205. f. 39?*
*Petiv. amb. aq. t. 20. f. 8.*
*Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 6.*
*Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 691.*
*Habitat ad* Africae litus *septentrionale & occidentale, cum praecedentis, at colore, testa minore, tenera, chartae instar tenui, valva inferiore planiore, foramine ovali pertusa, & minuto in cardinis regione umbone distincta.* Squa-

Squamula. 6. A. testa orbiculata integerrima plana : margine altero gibba lævi. *Fn. suec.* 2151. *Mull. zool. dan. prodr.* 2998.
*It. wgoth.* 170. Patella.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 696.
*Habitat frequentissima in* Oceano Europæ septentrionali, *aliis marinis adhaerens, minuta, valva planiori teneriori utplurimum perforata.*

patelliformis. 7. A. testa ovata convexa subdiaphana striata : vertice posteriori recurvo lævi. *Fn. suec.* 2152. *Mull. zool. dan. prodr.* 2999.
*Habitat in* mari norwegico, *rarior, patellae lacteae affinis, testa albida tenera fragilis, striis longitudinalibus subtilissimas transversas decussatibus, rostro obsoleto valva inferiore plana, laevi, basi perforata.*

Scobinata. 8. A. testa subrotunda lævi intus scabra, nate perforata.
*Gualt. test. t.* 96. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 704.?
*Schroet. Journ. fur Liebh. Steinr.* 3. *t.* 2. *f.* 4:
*Eint. in Conch.* 3. *p.* 389. *t.* 9. *f.* 9.
*Habitat in* Pelago, *testa tenui pellucida, alba, tenerrime striata, intus argentea : margine externo glabro acuto.*

aurita. 9. A. testa obovata striata subaurita : nate perforata.
*Gualt. test. t.* 96. *f.* B.

*Ha-*

---

*In duo genera dividit anomias inter fossilia frequentiores O. Fr. Muller eas scilicet, quarum animal branchiis gaudet cincinnatis, & in quarum testa valva superior deorsum perforata, & cardo in altera dentibus uncinatis armatus, terebratulas, eas autem, quarum animal branchiis gaudet simplicibus, et in quarum testa cardo cochlitulus est, et valva inferior perforata, anomias nuncupando.*

*Habitat in* mari norwegico, *capiti serpentis affinis, at dorso testae penitus aequabili distincta.*

retusa. 10. A. testa obovata striata retusa: convalle longitudinali, nate perforata. *Fn. suec.* 2153. *Mull. zool. dan. prodr.* 3000.
*Habitat in* Pelago norwegico, *alcyoniis adhaerens.* Pennant.

Gryphus. 11. A. testa oblonga laevi: altera valva plica laterali obsoleta; nate incurveta altera brevi planiuscula.
*Muf. Teffin. p.* 92. *t.* 5. *f.* 9.
*Olear. muf.* 67. *t.* 33. *f.* 3.
*Rumpf muf. t.* 59. *f.* B.
*Lift. an. angl. p.* 238. *t.* 8. *f.* 45.
*Column. aq. p.* 54. *t.* 52.
*Bonan. recr.* 2. *f.* 31.
*Habitat - - - hactenus modo foffilis reperta, testa lamellata, rugofa, magnitudinis formaeque variae.*

Pecten. 12. A. testa semiorbiculata depressa multistriata: valva altera plana.
*Lift. anim. angl. p.* 243. *t.* 9. *f.* 49.
*Habitat - - - hactenus modo foffilis inventa, & rarius quidem, in* Anglia, *testa in regione cardinis linea tranfversa notata.*

striatula. 13. A. testa subrotundo-dilatata utrinque gibba striata: valvis aequalibus.
*Habitat - - - hactenus modo inter foffilia detecta, testa rotundata, fed duplo latiori, quam longa, posterius magis gibbosa, anterius margine tenui.*

truncata. 14. A. testa suborbiculata obsolete striata: cardine truncato. *Mull. zool. dan. prodr.* 3001.
*Lift. Conch. t.* 462. *f.* 23.

an-

*an. angl. t. 9. f. 50.*
*Andreae Br. a. d. Schw. t. 1. f. d-g.*
*v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 14.*
*Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 701. a. b.*
*Schroet. Journ. fur Liebh. Steinr. 3. t. 2. f. 5.*
*Habitat in maris Norwegici coralliis, ſtriatula affinis, at cardine recto excijo diſtincta, teſta exalbida, latiori quam longa, ſubtiliſſime decuſſatim rugoſa convexa, intus granulata.*

reticulatis. 15. A. teſta cordata decuſſatim ſtriata: valva breviore magis gibboſa.
*Muſſ. Teſſ. p. 88. t. 5. f. 5.*
*Habitat - - - hactenus modo foſſilis, teſtae lateribus prominulis compreſſis, natis planioris valvae parum prominente.*

plicatella. 16. A. teſta dilatato-lunata plicata: ſulcis longitudinaliter ſtriatis, media latiore.
*Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis praecipue in Helvetia, teſtae lateribus ſubmucronatis, plicis longitudinalibus, natum ſuperiore admodum prominente.*

criſpa. 17. A. teſta dilatato-triangulari plicata: ſulcis rugoſis, media latiore.
*Muſ. Teſſ. t. 5. f. 7.*
*Liſt. anim. angl. t. 9. f. 56.*
*Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia, Helvetia, Italia, teſtae fere lunatae ſulcis 5-6 rugis arcuatis transverſis, lateribus ſubmucronatis, natum ſuperiore prominente.*

lacunoſa. 18. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis apice plicatis, altera breviore lacunoſa, apice quadridentata.
*Muſ. Teſſn. t. 5. f. 6.*
*Column. de purp. c. 15. p. 35.* Concha altera anomia ſtriata trilobos. *Liſt.*

*Liſt. an. angl. p.* 249. *t.* 9. *f.* 57.
*Grew. muſ. t.* 19. *f.* 6.
*Klein oſtr. t.* 11. *f.* 57.
*Habitat - - - modo foſſilis.*

pubeſcens. 19. A. teſta obovata ſulcata : vulva altera nate ad cardinem dehiſcente apertura.
*Mull. zool. dan. prodr.* 3007 ? Terebratula teſta tomentoſa ſubquinquangulari longitudinaliter ſtriata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 397. *t.* 9. *f.* 10. a. b.
*Habitat in* Oceano Norwegico zoophytis, *teſta alba parva, magnitudine vix ſeminis cucumeris, ſubaequivalvi, pilis brevi ſſimis erectis diſtantibus, an ſarſan a ſpongiae ſpecie adhaerente ? hirta, non retuſa, nec plicata, cardinis inſtar longitudinaliter ſulcata : Valva alterius natis poſterius prominens alteram valvam verſus foramen offert.* Zoega.

farcta. 20. A. teſta ſubrotunda multiſulcata : valvis convexis apice octodentatis.
*Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia deprehenſa in* Helvetia, Weſtphalia, *teſta nonnunquam fere globoſa.*

Caput ſerpentis. 21. A. teſta obovata ſtriata tomentoſa : valva altera nate longiori perforata. *Ion. Juec.* 2154.
*Grundler Naturf.* 2. *t.* 3. *f.* 1-6.
*Andreae Br. a. d. Schweiz t.* 1. *f.* c.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 6. *f.* 13.
*Schroet. Abh. Naturg.* 2. *t.* 5. *f.* 8. a. b. & *f.* 9. a. b.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 712.
*Habitat in* maris norwegici abyſſo *madreporae proliferae utplurimum adhaerens, teſta alba, longitudinaliter & paruper transverſe ſtriata, anterius compreſſa, fragili : margine circulato, cardi-*

*dine utrique ad latus prominente in utraque valva dente armato ; valva superiore posterius prominente & utrinque longiore , anterius aeciniata , medio sulco exarata , apice perforato ligamento affixa corallis aliisve zoophytis ; valva inferiore rotundata , anterius retusa.*

Terebratula. 22. A. testa obovata lævi convexa : valva altera triplicata , altera biplicata. *Fn. suec.* 2155.
*Column. purp. c.* 12. *f.* 1. *p.* 32.
*List. anim. angl. p.* 240. *t.* 8. *f.* 46 ?
*Klein. ostr. t.* 11. *f.* 74.
*Habitat - - - hactenus modo sed copiosissime fossilis reperta , nate alterius valvae prominente pertusa.*

angulata. 23. A. testa basi laterum compresse anterius plicata : medio tridentato.
*Mus. Tess. p.* 96. *t.* 5. *f.* 4.
*Habitat - - - hactenus modo fossilis , testae ceterum laevis antrorsum plicis numero ovariis.*

Hysterita. 24. A. testa dilatata lævi convexa striata subtrilobata anterius depressa : margine acuto.
*Mus. Tessin. p.* 90. *t.* 5. *f.* 1-3.
*Wolf. Hass. subterr. t.* 3. *f.* 3-5.
*Worm. mus. t.* 83.
*Habitat - - - hactenus tantummodo inter fossilia reperta in Hassia , & vicinis* Moguntini electoratus *terris , magnitudine & quodammodo etiam figura varians , testa laevi , rarius , & tunc quidem subtilissime , striata , valva altera brevi , medio quam maxime convexa , ad latera depressa , altera longiore plana vulvae faciem referente in rostrum longiusculum terminata.*

biloba. 25. A. testa biloba æquali striata.
*Habitat - - - modo fossilis.* Pennant.

Pla-

Placenta. 26. A. testa orbiculata plana pellucida: cardinum callis linearibus binis testæ interne adnatis.
*Mus. Lud. Ulr.* 536. *n.* 126. *
*List. Conch. t.* 225. *f.* 60. & *t.* 226. *f.* 61.
*Seb. mus.* 3. *t.* 90. *fig. var.*
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 79. *f.* 716.
*Habitat frequens in* Oceano indico, *testa* 5 *pollices longa lataque, & adhuc majore, alba, intus nitente argentea, tenera, pellucida, tenui, fragili, striis subtilissimis longitudinalibus rugas transversas arcuatas decussantibus, valva superiore penitus complanata.*

Sella. 27. A. testa subquadrangula convexa arctissime clausa ænea margine repanda.
*Bonann. mus. Kirch.* 2. *f.* 135?
*Seb. mus.* 3. *t.* 90. *fig. med.*
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 18. *f.* 2. & 5. *t.* 29. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 79. *f.* 714.
β) Sella minor, altera valva alba.
*Rumpf mus. t.* 47. *f.* B.
*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 3.
*Gualt. test. t.* 104. *f.* B.
*Seb. mus.* 3. *t.* 90. *f. plur.*
*Habitat in* Oceano indico, *placentae proxime affinis, testa lamellata intus nitente nonnunquam ultra* 7 *pollices longa lataque, radiis nonnullis dilute spadiceis, striisque innumeris longitudinalibus, ad marginem iridis coloribus ludente, cardinis callis* 2 *ad umbonem convergentibus.*

Spinosa. 29. A. testa spinis longitudine testæ.
*Habitat - - - hactenus modo fossilis reperta in* Anglia. Solander.

Aculeata. 30. A. testa subrotunda aculeata: vertice lævi posterius recurvo. *Mull. zool. dan. prodr.* 3005.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 77. *f.* 702.
*Habitat in* maris Norwegici fucis & zoophytis; *valva inferiori plana, laevi ad verticem perforata.*

muricata. 31. A. testa hyalina ventricosa: vertice dextrorsum flexo, valva superiore longitudinaliter striata: striis in squamas spinasque cavas desinentibus.
*Chemn. Conch.* 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* A. B.
β) *Chemn. Conch.* 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* C. D.
*Habitat ad* Guineam, *testa nivea, in* β) *majore minusque convexa, valva inferiore plana tenuissima; foraminis ambitu elevato; dente laterali.*

squama. 32. A. testa oblonga margine rotundata: valva altera plana, tenera lævi; apicis foramine amplo ovato, altera convexiuscula longitudinaliter striata.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 77. *f.* 697.
*Habitat in* mari Norwegico, *squamula major, testa fragili, valva plana aliis corporibus adhaerente.*

punctata. 33. A. testa orbiculata hyalina tenui punctata: valva planiore apice perforata: punctis exterius impressis.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 77. *f.* 698.
*Habitat ad* insulam Feroe, *testa exigua fragili, punctis in valva convexa extrinsecus elevatis.*

undulata. 34. A. testae margine crenato, valva planiore tenuissima lævi: foramine ovali amplo pertuso, convexae striis transversis arcuatis longitudinalibus undulatas decussantibus.
*Mull. zool. dan. prodr.* 3003 ? Anomia testa subovata pellucida, supra striis transversis undulatis.

*Chemnitz*

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 77. *f.* 699.
*Habitat in* mari ſeptentrionali & mediterraneo, *teſta interdum rubella.*

capenſis. 35. A. teſta longitudinaliter ſtriata ſubtruncata margine rotundato crenata; valvæ planioris coſta infra biſpinoſa.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 77. *f.* 703. a. b. c.
*Habitat ad* caput bonæ ſpei, *teſta nunc rubella, nunc alba.*

detruncata. 36. A. teſta truncata orbiculata longitudinaliter ſtriata: valva planiore coſtis intus tribus, altera intus longitudinaliter ſtriata ſepto medio bipartita.
*Gualt. teſt. t.* 96. *f.* C.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 705. a. b. c. d.
*Habitat in* mari mediterraneo, *coralliis adhaerens, teſta parva: vertice perforato.*

ſanguinolenta. 37. A. teſta cornea lævi utrinque convexa: valva ſuperiore emarginata ad latera radiata; dorſo elevato ſanguineo, apiceque prominente perforato.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 706.
*Habitat in* India, *teſta pellucida.*

vitrea. 38. A. teſta ovata ventricoſa hyalina tenuiſſima: cardinis præter dentes laterales in valva inferiore radiis duobus oſſeis, valvæ ſuperioris apice prominente perforato.
*Argenv. zoomorph. t.* 12. *f.* E.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 30. *f.* 4.
*Walch Naturf.* 3. *t.* 3. *f.* 5.
*Andr. Br. v. d. Schw. t.* 2. *f.* a. b.
*Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 116. *vign.*
*Spengl. catal. raiſ. t.* 4. *f.* 1. 2.
*Schroet. Journ.* 3. *t.* 2. *f.* 1.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 707-709.
*Habitat rarior in* mari mediterraneo, *testa intus nitente*, 1½ *pollicem circiter longa, & ultra pollicem lata.*

Cranium. 39. A. testa lævi ventricosa transversim subtiliter striata.
*Mull. zool. dan. prodr.* 3006. Terebratula Cranium.
*Schroet. Journ.* 3. *t.* 2. *f.* 2.
*Habitat in* mari Norwegico, *testa ¾ pollicis lata, & paulo longiori, planiore & breviore, quam in vitrea tenuissima, sub epidermide sordide fuscescente niveo pellucida, striis subtilissimis transversis in valva longiore apice perforata alias subtilissimas undulatas confertas decussantibus.*

dorsata. 40. A. testa cordata solida annulis rugisque arcuatis transversis striis sulcisque longitudinalibus inæquali, valvæ convexæ apice perforato dorsoque elevato.
*Gunther Naturf.* 3. *t.* 3. *f.* 1-3.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 710. 711.
*Habitat in* freto magellanico, *frequentius fossilis, testa cinerea: margine repando cinereo.*

pisitacea. 41. A. testa cornea subtilissime longitudinaliter striata: valva breviore gibba, longioris convexiplanatæ apice incurvato perforato; foramine triangulari.
*List. Conch. t.* 211. *f.* 46.
*Argenv. Conch. t.* 23. *f.* O.
*Klein ostr. t.* 12. *f.* 84. 85.
*Spengl. cat. rais. t.* 4. *f.* 8.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 78. *f.* 713. a. b. c.
*Habitat rarissima in* mari Groenlandiam *alluente: testa satis magna pellucida: margine acuto laeve angulato.*

tri-

tridentata. 42. A. testa flavescente pellucida tenui subtilissime transversim striata tricuspide: cuspidibus tubulosis, valvis connatis.
*Forsk. Fn. arab. p.* 124. *n.* 63.
*Chemn. Conch.*8. *p.*65. *vign.*13. *f.* a. b. c. d. F.G.
*Habitat rarior in* mari mediterraneo, *plicis in latere ampliore sulcisque quatuor longitudinalibus, vertice obtuso semiorbiculato.*

spondylodes. 43. A. testa ovali antiquata: rostro obtuso canaliculato.
*List. Conch. t.* 211. *f.* 45.
*Klein ostr. t.* 12. *f.* 82. 83.
*Habitat* - - -

ventricosa. 44. A. testa subovata solida, rostro canaliculato.
*Schroet. Journ.* 2. *t.* 2. *f.* 3.
*Habitat* - - - *madreporae proliferae adhaerens, an vitreae affinis, testa sordide ochroleuca, apicis foramine amplo, altero latere longiore.*

gryphoides. 45. A. testa ovali laevi solida opaca: valvae majoris rostro rectiusculo obtuso truncato.
*Schroet. Journ.* 4. *t.* 2. *f.* 8.
*Habitat* - - - *grypho affinis, testa exalbida.*

flexuosa. 46. A. testa tenuissima lamellata: medio sellae instar excavato, valva superiore plana, inferiore verticem versus convexa: foramine orbiculari infra verticem perforata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 418. *t.* 9. *f.* 11.
*Habitat in* mari norwegico, *madreporae proliferae adhaerens, testa quasi infumata, vulvae inferioris parte convexa argentea.* ru-

---

*An dissimilae hujus generis species, quas* Bonanni *recr.* 2. *f.* 50. *et mus. Kirch.* 2. *f.* 49. *et ea, quam* Martini *Berlin. Samml.* 3. *t.* 5. *f.* 12. *delineatas dedit? Nonne huc referenda etiam protypa* peridiolithorum, *in Eifalia potissimum obviorum?*

rugosa. 47. A. testa obovata : valva superiore plurimam partem convexa confertim subtilissime rugosa, inferioris tenuissimæ lævis foramine reniformi.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 12.
*Habitat in* mari norwegico, *madreporae proliferae affixa, testa exalbida : margine acutissimo.*

cylindrica. 48. A. testa tenuissima cylindrica extrorsum angustata : valva superiore gibba, inferiore excavata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 13.
*Habitat in* mari norwegico, *echini cidaridis aculeis adhaerens.*

Nucleus. 49. A. testa glabra ovali longitudinaliter sulcata.
*Mull. zool. dan. prodr.* 3008. Terebratula Nucleus.
*Habitat in* mari norwegico.

avenacea 50. A. testa pyriformi versus cardines protracta subcompressa. *Mull. zool. dan. prodr.* 3004.
*Habitat in* Oceano septentrionali.

fandalium. 51. A. testa turbinata dorso plana cavitate striata, operculo plano hemisphærico. *Mart.* 2. *p.* 547.
*Habitat - - - inter fossilia modo, potissimum Eiffaliae reperta, madreporae turbinatae quodammodo figura testa solida crassa, magnitudine extimi pollicis, operculo concentrice striato.*

315. MYTILUS. *Animal* Aſcidia ?

*Teſta* bivalvis, rudis, ſæpius affixa byſſo, utplurimum craſſiori.

*Cardo* ( in plurimis ) edentulus, diſtinctus, (paucis exceptis) linea ſubulata excavata longitudinali.

* Paraſitici, *unguibus affixis.*

Criſta galli. 1. M. teſta plicata ſpinoſa : labro utroque ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 128.

*Rumpf muſ. t.*47. *f.* D. Oſtreum plicatum minus.

*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* D. Auris porci ſ. Criſta galli.

*Pet. aq. amb. t.* 20. *f.* 2.

*Gualt. teſt. t.* 104. *f.* E.

*Knorr del. t.* B. IV. *f.* 8.

*Vergn.* 4. *t.*10. *f.*3-5. 5. *t.* 16. *f.* 1. & *t.*17. *f.* 1-3.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 75. *f.* 683. 684.

β) *Gualt. teſt. t.* 104. *f.* D.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 73. *f.* 675.

γ) *Davil. catal. ſyſtem.* 1. *p.* 288. *t.* 19. *f.* 10 ?

δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 998.

*Habitat gregaria in* Oceano indico, β) maris rubri, *potiſſimum gorgoniis, teſta ex purpura ſubviolacea, dilute cinnamomea, vel badia punctis elevatis aſpera intus glabra mellea, ſubaequivalvi, clauſa, plicis acutis* 5-8-10 *obliquis vel rectis, foveola ad cardinem trigona.*

Hyo-

Mytili *paraſitici potiori jure oſtreis accenſendi, quibuſcum cardinis quoque foveola conveniunt; an ad hanc mytilorum tribum etiam ſpectant tanquam diſtinctæ ſpecies conchæ ab* Argenvill. *conch. t.* 20. *f.* C. *et altero f.* H. *et a* Knorrio *Vergn.* 1, *t.* 29. *f.* 2. *delineatæ ?*

Hyotis. 2. M. testa plicata imbricata squamis compressis patulis, labro utroque lævi. *Mus. Lud. Ulr.* 548. *n.* 129. *.

*Gualt. test. t.* 103. *f.* A.

*Argenv. zoomorph. t.* 12. *f.* F.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 75. *f.* 685.

*Habitat rario in* pelagi gorgoniis, *testa rugosa sordida ex virescente lutea, lamellata, plicis hinc illuc curvatis, nucleis cavis canaliculatis obsessis.*

Frons. 3. M. testa plicata læviuscula, labro altero scabro. *Mus. Lud. Ulr.* 537. *n.* 127. *

*Argenv. Conch. t.* 19. *f.* D. Cratium s. Folium.

*List. Conch. t.* 197. *f.* 32. *t.* 198. *f.* 32. a?

*Gualt. test. t.* 104. *f.* C.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 8. *f.* 3.

*v. Born mus. Caes. Vindob. test. p.* 121. *vign. f.* b.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 75. *f.* 686.

*Habitat in* Oceani americani gorgoniis, *testa rubella, caerulescente, fusca, utplurimum ovali, margine utrinque plicato, denticulato, valva inferiore glabra medio canaliculata, superiore ad marginem punctis elevatis scabra: costa media elevata.*

** Plani *s. compressi ut plani appareant & subauriti.*

margaritiferus. 4. M. testa compresso plana suborbiculata basi transversa imbricata tunicis dentatis. *Mus. Lud. Ulr.* 538. *n.* 130. *

*Imper. hist. nat.* 905. Concha margaritifera.

*Rumpf mus. t.* 47. *f.* F. Matrix perlarum.

*Argenv. Conch. t.* 20. *f.* A. Gallina guttata.

*List. Conch. t.* 221. *f.* 56. *t.* 223. *f.* 57. *& t.* 224. *f.* 58.

*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 2. *f.* 1.

*Petiv. amb. aq. t.* 20. *f.* 4. 7.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 84. *f.* E. F. G.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 25. *f.* 1-3. & 4 *t.* 18. *f.* 1.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 121. *vign. f.* a.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 8. *f.*717-721. a. b.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *teſta ſolida, ad* 8 *pollices longa & adhuc latiori, intus margaritacea (hinc matrix perlarum potiſſimum) exterius nunc unicolore, praeſertim ſmaragdina, nunc ſpadicea, aut perſici florum ad inſtar tincta radiis albis, vel albida radiis viridibus: juniorum teſta altera altero latere aurita, uti pecten, cardine rectiſſimo, longitudine totius teſtae; ex ligamento cardinis androdamas, ex verme incola teſtaque lacſa uniones.*

Unguis. 5. M. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata pellucida ſubaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 131.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta tenerrima hyalina, ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata, magnitudine unguis humani; nonne ad oſtreas pertinet?*

**** ventricoſiuſculi.*

Litho-phagus. 6. M. teſta cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 132. *
*Rondel. aq.* 2. *p.* 49. Pholas.
*Rumpf muſ. t.* 46. *f.* F. Pholas.
*Argenv. Conch. t.* 26. *f.* K. Dactylus.
*zoomorph. t.* 7. *f.* 5.
*Jonſt. exſang. t.* 15. *f.* 18. 19.
*Liſt. Conch. t.* 427. *f.* 268. & *t.* 437. *f. alt.*
*Bonann. recr.* 2. *f.* 27-29?
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 27. 28?
*Petiv. amb. aq. t.* 19. *f.* 13.
*Gualt. teſt. t.* 90 *f.* D.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 132.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 7. *f.* 4.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 729. 730.

ε) Mytilus cinnameus. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 732.

*Habitat in* mari mediterraneo, indico, americano, *in coralliis teſtaceis, ſaxis ſaepe duriſſimis foveas pro habitaculo excavans laeviſſimas, teſta nonnunquam pollicem lata & ultra 3 longa, maris mediterranei fragili, indici coriacea, ſtriis transverſis arcuatis exarata, nigra, badia aut virescente, intus opalino-caeruleſcente, albido-argentea, aut margaritacea.*

rugoſus. 7. M. teſta rhomboideo-ovali rugoſa obtuſa antiquata. *Mull. zool. dan. prodr* 3011. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 429. *t.* 9. *f.* 14. *a. b.*

*Habitat in* Norwegiae lacuſtribus *ad* oſtia maris, *teſta magnitudine vix ultimi articuli minimi digiti, ovali: utroque tamen fine obtuſiſſima, colore triſti cano, intus dimidiato caerulea & albo, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas transverſas confertas decuſſantibus.*

bilocularis. 8. M. teſta caerulea ſtriata: umbonibus fornicatis, diſſepimento albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 133. *

*Spengl. catal. raiſ. t.* 6. *f.* 3-5.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 736. *a. β. f.* 737. 1-3.

*Habitat rarus ad* inſulas Nicobaricas, *teſta ovali anterius plana medioque excavata & foramine ovali hiante, poſterius convexa, epidermide virescente tecta.*

exuſtus. 9. M. teſta ſtriata: ventre angulato, margine crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 134. *

*Liſt. Conch. t.* 365. *f.* 205.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 754.

*Habitat in* Oceano americano & mari rubro, *teſta* 1½ *pollicem longa, ferruginea, albida flavescente, aut fuſca, intus caeruleſcente, dentibus bar- ad latera cardinis* 4-5.

barbatus. 10. M. testa lævіusсula ferruginea exterius apice barbata. *Fn. suec.* 2157. *Mull. zool. dan. prodr.* 3012.
*Ginann. adr.* 2. *p.* 36. *t.* 27. *f.* 169. Musculus obscurus pilosus.
*Gualt. test. t.* 91. *f.* H. 2 ?
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 749.
*Habitat in* mari mediterraneo, norwegico, *lithophytis adhaerens, testa ad ¾ pollicis longa, sub epidermide ferruginea ex rubello caerulea aut albida.*

edulis, 11. M. testa lævіusсula violacea: valvis anterius subcarinatis posterius retusis, natibus acuminatis. *Fn. suec.* 2156. *Must. Lud. Ulr.* 541. *n.* 135.* *It. oel.* 43. *It. wgoth.* 170. *Mull. zool. dan. prodr.* 3013. *Brunn. spol. mar. adr. p.* 108. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 417. *n.* 417.
*Gesn. aq.* 277. Mytulus.
*Bell. aq.* 397. Mytulus.
*Mery act. par.* 1711. *t.* 3. *f.* 4. 5.
*Rondel. aq.* 2. *p.* 46.
*Aldrov. exsang.* 512.
*List. Conch. t.* 362. *f.* 200.
*anim. angl. t.* 4. *f.* 28.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 30.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 29.
*Ginann. adr.* 2. *p.* 36. *t.* 13. *f.* 168.
*Bast. op. subs.* 3. *p.* 101. *t.* 11. *f.* 9-11.
*Heyda anat. mytal.* 1683. 8.
*Argenv. zoomorph. t.* 5. *f.* D. E. F.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 4. *f.* 5. 6. 4. *t.* 15. *f.* 1. & 5. *t.* 25. *f.* 1.
*Regenf.* 1. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 11. *f.* 58. & *t.* 12. *f.* 71. 72.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 750. 751. 755.

6)

* Huc referendi quoque *lithophago affines, truncatus, cordatus, curvirostrus & donacinus*, a Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XV. XVI. *memorati.*

β) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 201.
γ) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 202.
δ) *Liſt. Conch. t.* 363. *f.* 204.
ε) *Gualt. teſt. t.* 7. *f.* A ?
*Habitat in* mari caſpio, balthico, mediterraneo, oceano europæo & indico, *intra tropicos utplurimum maximus, intra arcticum minimus, teſta ſubtrigona ſub epidermide ſubfuſca aut virescente nitidiſſime violacea, rarius fuſca, flavicante, aut radiata, ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, pinnae mart byſſo exſerendo inſtructa; incola plebejis edulis, concoctu difficillimus, etiam cepis additis, certis anni temporibus, an ab uſteria ophiuro comeſta? venenatus.*

ungulatus. 12. M. teſta lævi ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 136. *
*Liſt. Conch. t.* 360. *f.* 199. & *t.* 364. *f.* 203 ?
*Gualt. teſt. t.* 91. *f.* E.
*Regenf. Conch. t.* 4. *f.* 47.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. 756.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. 747.
*Habitat in* mari mediterraneo & *ad* caput bonæ ſpei, γ) *ad* novam Seelandiam, *eduli affinis, ſed teſta majore ultra* 5 *pollices longa,* & $2\frac{1}{2}$ *lata, viridi, caeruleſcente, aut virore intermixta, nigra, annulata natibus diſtantibus acutis, cardinis apice dentibus* 6 *ſulco crenis ad* 100 *notatis, valvis valde convexis pecorum ungulas referentibus.*

bidens. 13. M. teſta ſtriata ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato.
*Liſt. Conch. t.* 356. *f.* 139. *t.* 358. *f.* 196. & ? *t.* 366. *f.* 206.
*Klein oſtr. t.* 9. *f.* 24.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 30. *f.* 3. 5. *t.* 13. *f.* 6 ? & 6. *Chemn. t.* 4. *f.* 3.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 83. *f.* 742. 743.

*Habitat in* mari mediterraneo, æthiopico, atlantico, freto magellanico, *angulato affinis, pollicis transversi magnitudine, at testa longitudinaliter striata, sub epidermide cinerea, fusca, caerulea aut nigra pulcerrime tincta.*

Modiolus. 14. M. testa lævi: margine anteriori carinato. natibus gibbis, cardine sublaterali. *Mus. Lud. Ulr.* 542. *n.* 137. * *Mull. zool. dan.* 2. *t.* 53. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 3-6. *prodr* 3014.

*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* C. Musculus papuanus.

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 1. Lulat.

*List. Conch. t.* 356. *f.* 195. & *t.* 359. *f.* 198.

*Rumpf mus. t.* 46. *f.* B. C ? E ?

*Petiv. amb. aq. t.* 19. *f.* 2 ? 10. 12 ?

*Gualt. test. t.* 91. *f.* H. 1.

*Klein ostr. t.* 9. *f.* 25. & ? *t.* 11. *f.* 67.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 15. *f.* 3.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 85. *f.* 757-760.

ε) *List. Conch. t.* 356. *f.* 194.

*Klein ostr. t.* 12. *f.* 78. 79.

ζ) *List. Conch. t.* 1057. *f.* 5.

*Habitat in* mari mediterraneo, oceano septentrionali, indico, americano, *fucis, testaceis, zoophytis adhaerens, testa ad ½ pedem longa,* & 2¼ *pollicem lata, sub epidermide nigra, cinerea aut fulva, caeruleſcente aut admiſto candore caerulea, aut alba vel flavicante radiis rubris, aut dimidiato ſpadicea & alba, umbonibus tumidis oblongis, natibus retrorſum prominentibus, vulvae regione recurvato ſtriata, parte poſteriore ultra nates protuberante, cardine ante nates cartilagineo, incola ipſo rubro & aurantio eduli.*

cygneus. 15. M. testa ovata anterius compreſſiuſcula fragiliſſima, cardine laterali.

*Mull. verm. terr. & fluviat.* 2. *p.* 208. *n.* 394.

*zool. dan. prodr* 3010. Mytilus testa ovata antice convena natibus integris.
*List. Conch. t.* 156. *f.* 11.
*au. angl. app. p.* 146. *t.* 2. *f.* 29.
*Gualt. test. t.* 7. *f.* F.
*Argenv. Conch.* 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 5. 6. 7. 11.
*zoomorph. t.* 8. *f.* 12.
*Schroet. Flusconch. t.* 3. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 85. *f.* 762.
ε) Mytilus ( radiatus ) testa ovali antice compressiuscula postice radiata. *Mull. hist. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 209. *n.* 395.
*List. Conch. t.* 155. *f.* 10.
*Ginann. adriat.* 2. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 15.
ζ) *List. Conch. t.* 150. *f.* 5 ?
*Habitat frequens in* Europæ lacubus & *ad* fluvio-rum ostia, *testa ad* 12 *lineis ad* 6 *pollices lata, ad* 20 *lineis ad* 3½ *pollices longa hiante sub epidermide transversim rugosa saepe nitida, anteriori interdum ochroleuca: radiis viridibus, intus albo opaca natibus minutis retroversis, conniventibus.*

anatinus. 16. M. testa ovali compressiuscula fragilissima margine membranaceo, natibus decorticatis.
*Fn. suec.* 2158.
*Mull. hist. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 207. *n.* 393.
*zool. dan. prodr.* 3009. Mytilus testa ovali antice compressa, natibus decorticatis.
*List. conch. t.* 153. *f.* 8.
*Klein ostr. t.* 9. *f.* 26.
*Gualt. test. t.* 7. *f.* E.
*Argenv. Conch.* 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 1. 2.
*zoomorph. t.* 8. *f.* 8. 11.
*Rondel. pisc. p.* 214.
*Gesn. aq. p.* 281.
*Petiv. gazoph. t.* 93. *f.* 8. 9.
*Schroet. Flusconch. t.* 1. *f.* 2. 3.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 86. *f.* 763. ε)

α) *List. Conch. t.* 154. *f.* 9.
β) *List. Conch. t.* 151. *f.* 6?
*Habitat in* Europæ aquis dulcibus, *frequentius in stagnantibus, a mya pictorum fragilitate & cardine distinctissimus, mytilo cygneo similior, an vere distinctus? anatum cibus, testa tenerrima pellucida*, 8-30 *lineas lata*, 11-54 *longa, utrinque rotundata, virideſcente nitida, striis apertura parallelis subtilissimis strigisque paucis nigricantibus notata, intus glabra, nitida, alba, caerulea, vel caeruleſcente, lutcoque varia, & iridis coloribus micante.*

viridis. 17. M. teſta lævi ovata membranacea pellucida, cardine terminali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.*138.*
*Habitat in* Oceano meridionali, *teſta viridi, tenerrima, ungue minuti.*

ruber. 18. M. teſta rugoſa: valvis obliquis anterius dilatatis, margine cardinali apicem æquante. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 139. *
*Habitat in* Oceano magis auſtrali, *teſta rubra, minuta, convexa: cardinis dente breviſſimo compreſſo.*

albus. 19. M. teſta transverſim ſtriata, natibus gibbis, cardine laterali. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.*177.
*Habitat frequens ad* littus Chilenſe, *teſta* 6 *circiter pollices longa, & ad* $3\frac{1}{2}$ *lata ſub caerulea epidermide nivea caeruleo tincta, verme incola albo ſapidiſſimo.*

ater. 20. M. teſta ſulcata poſterius ſquamoſa. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
*Habitat ad littus* Chilenſe, *albo minor, teſta pinnae more aſpera, obſcure caerulea, incola nigro non eduli.*

diſ-

discors. 21. M. testa ovali cornea subdiaphana anterius longitudinaliter posterius transversaliter striata. *Mull. zool. dan. prodr.* 3014. *O. Fabr. Fn. groenl.* 418.

*Hermann Naturf.* 17. *t.* 3. *f.* 5-8.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. p.* 121. *vign.*

*Chemn. Naturf.* 10. *t.* 1. *f.* 8.

*Conch.* 8. *t.* 86. *f.* 764-768.

*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 444. *t.* 9. *f.* 15.

*Habitat in* Oceano septentrionali & australi, *fere pulis byssi interventu affixa, anatum cibus, testa* $2\frac{1}{2}$-22 *lineas longa,* $1\frac{2}{3}$-$13\frac{1}{2}$ *lata, cornea, plerumam partem fusca, viredine potissimum ad marginem intermista, intus caeruleiscente cum rubore aut ex viridi albicante, in* 3 *quasi areas divisa, quarum media strias vix conspicuas transversas aut nullas habet; incolae non edulis, pes albus, labia fulva, branchiae & aperturae anteriores brunneae, dorsum fuscum.*

Hirundo. 22. M. testa laevi: valvis bilobis; lobo cardinali longiore tenuioreque. *Mus. Lud. Ulr.* 545. *n.* 140. *

*Adans. Senég.* 1. *t.* 15. *f.* 6. Chanon.

*Rumpf mus. t.* 46. *f.* G. Avicula.

*Argenv. Conch. t.* 19. *f.* E. Avicula s. Hirundo.

*List. Conch. t.* 220. *f.* 55. & *t.* 224. *f.* 59.

*Bonann. recr.* 2. *f.* 58.

*mus. Kirch.* 2. *f.* 57.

*Petiv. aq. amb. t.* 19. *f.* 9.

*Gualt. test. t.* 94. *f.* B.

*Klein ostr. t.* 8. *f.* [illegible]. & *t.* 9. *f.* 38.

*Knorr delic. t.* B. IV. *f.* 7.

*Vergn.* 4. *t.* 8. *f.* 5. & 5. *t.* 10. *f.* 1. 2.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 724-725.

β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 726.

γ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 727.

a) *Gualt. teſt. t.* 94. *f.* A ?
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 2.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 728.
b) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 7. Eſſan.
c) *Chem. Conch.* 10. *t.* 171. *f.* 1672.
*Habitat in* Oceano indico, americano, atlantico, mediterraneo, *teſta magnitudine, craſſitie, formi, colore, pictura varia, ſubtiliſſime & confertim tranſverſe rugoſa, intus margaritacea, baſi contracta.*

pholadis. 23. M. teſta oblonga anterius obtuſiore rudi tranſverſaliter rugoſa. *Mant.* 2. *p.* 548. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 22. *Mull. zool. dan.* 3. *p.* 11. *t.* 87. *f.* 1-3.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 735.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *in coralliis & ſaxis pholadis more habitaculum ſibi excavans, teſta magnitudine fabae ½ pollicem longa, 1¼ lata, vix utroque fine clauſili, inconſpicua, cardine edentulo, aut denticulo obſoleto.*

ſtriatulus. 24. M. teſta ſubtiliſſime ſtriata: cardine terminali unidentato. *Mant.* 2. *p.* 548.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 7. *f.* 5 ?
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 83. *f.* 744. a ? b ?
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 449. *t.* 9. *f.* 16.
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali & indico, *teſta 1¼ pollicem longa, & ½ lata, formae ſemilunatae, qua potiſſimum ab exuſto diſcrepat, anterius dilatata, ſubdiaphana ſpadicea: margine extrorſum ſubtiliſſime crenato.*

vulgaris. 25. M. teſta altero latere planiuſcula inflexa: natibus incurvis convergentibus, cardine unidentato.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 732.

*Habitat frequens in* Oceano americano, *testa intus dilute margaritacea: epidermide fusca.*

plicatus. 26. M. testa rhombea inæquilatera tenuissima transversim striata rugosaque, natibus incurvis posterioribus.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 733.

*Habitat ad* insulas Nicobaricas, *testa hyalina, fragilissima, intus dilute argentea, altero latere rotundata, altero dilatata angulosa.*

niveus. 27. M. testa ovata subdiaphana subtilissime longitudinaliter striata: margine acuto, cardine bidentato.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 734.

*Habitat rarissimus ad* insulas Nicobaricas, *testa nivea, intus glaberrima.*

afer. 28. M. testa subtrigona anterius dilatata posterius planiuscula hiante: natibus acuminatis retrorsum versis, margine acutissimo.

*v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 7. *f.* 6. 7.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 15. *f.* 5?

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 83. *f.* 739-741.

*Habitat in* maris mediterranei australioribus, & *ad* Africæ littus, *testa ad* 4 *pollices longa, ex lata, intus ochroleuca iridis coloribus varia, exterius straminea, aut ex virente & flavicante mista lineisque angularibus rubellis picta; an myae Pernae varietas?*

smaragdinus. 29. M. testa subtrigona planiuscula: cardine in altera valva bidentato, in altera unidentato.

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 83. *f.* 745.

β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 746.

*Habitat ad* Tranquebariæ littora, *testa viridi intus submargaritacea,* β) *ad* Guineam *habitans, tes-*

*testa fusca, margine, interdum quoque maculis disci viridibus.*

versicolor. 30. M. testa subtrigona planiuscula: cardine unidentato, margine glabro acutissimo.

*Argenv. Conch. t. 22. f. Q.*

*Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 748.*

*Habitat in* Guineæ *littore, afro affinis, testa ad 3 pollices longa & ultra 2 lata, sub epidermide fusca, striis transversis confertis fasciisque 2 obscure viridibus, utrisque arcuatis notata ex violaceo, albo & spadiceo varia; an ad myam pernam referendus?*

corallio-phagus. 31. M. testa medio carinata margine crenata: umbone obtuso.

*Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 752.*

*Habitat in* Oceano indico & americano, *corallifero, scopulos pholadis instar perforans, testa ¾ pollicis circiter longa.*

lineatus. 32. M. testa trigona extrorsum dilatata: lineis angulatis decussantibus & confluentibus, cardine bidentato.

*Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 753.*

*Habitat - - - testa minuta ex flavo sordide virescente, intus dilute argentea.*

Faba. 33. M. testa ovali rufa striata: margine crenulato. *Müll. zool. dan. prodr. 3015. O. Fabr. Fn. groenl. 419.*

*Chemn. Conch. 8. t. 85. f. 761.*

*Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis scopulis, bysso aeneo se affigens, anatis hiemalis & histrionicae cibus, testa inflata semipellucida, laevigata, sub epidermide rufa alba, intus glaberrima, margaritacea.*

fluviatilis. 34. M. testa tenui subcuneata intus rubescente: natibus recurvis magnis.
*List. Conch. t.* 157. *f.* 12.
*Habitat in* Europæ aquis dulcibus, *anatino affinis*; *an vere distincta hujus generis species?*

fuscus. 35. M. testa oblonga angusta subtiliter transversim striata, altero latere emarginata, altero rotundata: natibus prominulis curvis.
*List. Conch. t.* 359. *f.* 197.
*Habitat* - - - *testa minuta, fusca.*

mammarius. 36. M. testa lata brevi retrorsum rotundata: natibus mammarum instar protuberantibus.
*List. Conch. t.* 361. *f.* 199. b.
*Klein ostr. p.* 129. *t.* 9. *f.* 27.
*Habitat* - - -

persicus. 37. M. testa lata sub cortice aspero rugoso luteo intus lactea.
*Bonann. recr. & mus. Kirck.* 2. *f.* 17.
*Habitat in* mari Persico, *testa duplo latiori, quam longa.*

pictus. 38. M. testa lata lævissima flammea vel rosea albo fasciata: natibus obtusis.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 35.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 34.
*Habitat in* mari Lusitanico, *testa triplo latiore, quam longa.*

undatus. 39. M. testa lata utrinque rotundata vinosa: striis undulatis virescentibus & cærulescentibus, margine serrato.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 36.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 35.
*Habitat in* mari Lusitanico, *testa, quam picti longiore.*

te-

fascia-tus. 40. M. testa pellucida nitente cæruleſcente : fascia vinosa & carnea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 352.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 106.
*Habitat in* mari Brasiliam *alluente*, *testa ſemipalmam lata*, *at dimidio breviore.*

purpu-reus. 41. M. testa posterius rotundata dilutius incarnata intus purpurea : margine denticulato.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 384.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 116.
*Habitat frequens in* Brasiliæ *littore.*

faxa-tilis. 42. M. testa auriformi exterius rugosa granulata : margine barbato, externo dilatato rotundato.
*Rumpf muſ. t.* 46. *f.* D.
*Habitat ad* Amboinam, *ſcopulis praeſertim duriori-bus affixus*, *anatum ſuumque cibus*, *articulo digiti latior*, *ſed brevior.*

argen-teus. 43. M. testa transversim striata utrinque rotundata fusca intus argentea, natibus rotundatis.
*Gualt. teſt. t.* 7. *f.* D.
*Habitat* - - -

fulgi-dus. 44. M. testa angustata nitente aurorea ad latera violaceo-maculata : natibus rotundatis dilatatis.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* D.
*Habitat in* freto magellanico, *testa matris perlarum inſtar nitida.*

azu-reus. 45. M. testa gibba azurea subtus flavicanti striata : natibus obtusis.
*Argenv. Conch. i.* 22. *f.* H.
*Habitat* - - - *testa pollicem circiter lata*, $1\frac{3}{4}$ *longa* : *margine inferiori anguſtato.*

mu-

murinus. 46. M. testa murina violaceo maculata margine lato rotundato rosea : natibus acuminatis rectis.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* K.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 9. *f.* 32.
*Habitat ad* Guineam.

testaceus. 47. M. testa elongata angustata sub epidermide testacea nitente ex argenteo, cæruleo, rubello, flavo, fuscoque varia.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 15. *f.* 4.
*Habitat - - - modiolo affinis, at testa majore & pulchriore.*

virgatus. 48. M. testa extrorsum dilatata ex viridi flava : virgis roseis, natibus obtusis curvis.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 2.
*Habitat - - - rubro affinis.*

cordatus. 49. M. testa oblonga tenuissima alba obsolete striata posterius hiante : hiatu cordato.
*Spengl. Besch. berl. naturf. Ges.* 2. *t.* 9. A. *f.* 3-5.
*Catal. rais. t.* 5. *f.* 13-17. *coll. s.* 12.
*Martini Besch. berl. naturf. Ges.* 2. *t.* 12. *f.* 1.
β) Heart muscæ. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 77.
*Habitat in* Oceano *potissimum* indico, β) australi, *coralliis & testaceis adhaerens, nonnunquam inhaerens, cardine omnino mytili ; an distinctum genus ?*

stagnalis. 50. M. testa ovali planiuscula transversim costata.
*Schroet. Flusconch. t.* 1. *f.* 1.
*Habitat in* Schwansee, *stagno* ducatus Isenacensis, *cygneo affinis, at testa longe majore ad* 8 *pollices lata, &* 4¼ *longa, minusque convexa, vi-*

---

*An distinctae a reliquis species, quas* Listerus Conch. *t.* 1055. *f.* 9. *& t.* 357. *f.* 195. b. *& ex eo* [illegible] *t.* 12. *f.* 76. [illegible] *an a* Mullero *zool. dan. prodr.* 3016. memoratus mytilus testa ovata, oblonga planiuscula ?

*virescente radiis obscurius viridibus picta & marginem versus ex luteo fusca distinctus.*

zellensis. 51. M. testa ovali convexa posterius rotundata anterius elongata & obtuse acuminata, natibus exoletis.

*Schroet. Flusconch. t. 2. f. 1.*

*Habitat in* fossa, *moenia* urbis Cellensis *circumdante, cygneo affinis, at testa majore, 7 pollices lata, 3 longa, ex virescente flava.*

roseus. 52. M. testa suborbiculata: sulcis 15 triangularibus cristatis & dentibus triangularibus alternis.

*Adans. Seneg. 1. t. 14. f. 4.* Fojet.

*Habitat ad* Africæ littus occidentale, *testa rosea intus alba ad marginem purpurea, 3 pollices lata, & paulo breviore; an hujus generis & tribus?*

puniceus. 53. M. testa gibba acuminata: sulcis quindecim, margine dentato.

*Adans. Seneg. 1. t. 15. f. 2.* Aber.

*Habitat ad* Africæ littus occidentale, *testa 14 lineas longa & dimidio angustiori, sub epidermide fulva violacea aut purpurea, interdum fusco viridique intermisto; cardinis dentibus 4 minimis.*

niger. 54. M. testa complanata tenui subtilissime sulcata sub epidermide nigra nitidissime lactea.

*Adans. Seneg. 1. t. 15. f. 3.* Dotel.

*Habitat ad* Africæ *medium littus occidentale, testa tenerrima pollicem longa sulcis circiter 100 exaratis, cardinis dente 1-2 minimis.*

lævigatus. 55. M. testa complanata lævi sub epidermide crassa fulva rosea: margine integerrimo.

*Adans. Seneg. 1. t. 15. f. 4.* Fonet.

*Habitat in* Africæ littore occidentali, *testa 2½ pol-*

*pollicem longa & dimidio angustiore intus margaritacea, epidermidi interdum virore intermisto, cardinis dentibus 2-3.*

dubius. 56. M. testa transversim rugosa, utrinque obtusa fulva intus margaritacea: natibus exoletis, cardine edentulo.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 21. Mutal.
*Habitat in* Africæ mediæ aquis dulcibus, *testa ad 5 pollices lata, 2 longa; an hujus generis?*

polymorphus. 57. M. testa quinqueloculari: valvis carinatis latere incumbente planiusculis, natibus acutis deorsum inflexis. *Prll. it.* 1. *app. n.* 85.
*Habitat in* mari *nuclei pruni magnitudine, quadruplo major in* aquis dulcibus Ruſſiæ, *glomeratim penicillis radiatis lapidibus & testaceis adhaerens, testa subfusca, loculorum dissepimentis brevissimis.*

Canaliculus. 58. M. testa læviuscula brunnea intus versicolore, scrobiculo cardinis canaliculato. *Martyn. univers. conchol.* 2. *t.* 78.
*Habitat ad* novam Seelandiam.

316. PINNA. *Animal* Limax.
*Testa* subbivalvis fragilis erecta hians, emittens barbam byssinam.
*Cardo* edentulus coalitis in unam valvis.

rudis. 1. P. testa sulcata: squamis fornicatis per series digestis. *Mus. Lud. Ulr.* 544. *n.* 41. *
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 5. Apan.
*List. Conch. t.* 373. *f.* 214.
*Ginann. adr.* 2. *t.* 25. *f.* 166.
*Gualt. test. t.* 79. *f.* C.

*Chemn.*

*Chemn. Conch.* 8. *t.* 88. *f.* 773.
ε) *Rumpf muſ. t.* 46. *f.* 11. Pinna lata.
*Pet. amb. aq. t.* 19. *f.* 6.
*Gualt. teſt. t.* 81. *f.* A.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 88. *f.* 774.
*Habitat varior in* Oceano americano & atlantico, ε) *in* indico & mari rubro, *teſta* 12-16 *pollices longa*, 4½-8 *lata*, *rubra ſulcis* 6-8 *exarata*, ζ) *nigra ſulcis vix conſpicuis.*

pectinata. 2. P. teſta dimidia longitudinaliter ſtriata: latere altero tranſverſe ſubrugoſo. *Gualt. teſt. t.* 79. *f.* A.
*Argenv. zoomorph. t.* 5. *f.* N?
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 87. *f.* 770.
ε) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 87. *f.* 771.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta triangulari cornea*, 3 *pollices longa*, & 4 *lata*, ε) *minore*, *tenuiore*, *rariore*, 4 *pollices* & 5 *lineas longa*, 2. *p.* & 5 *lineas lata.*

nobilis. 3. P. teſta ſtriata: ſquamis canaliculato-tubuloſis ſubimbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 142.
*Bonann. recr.* 2. *f.* 24.
*muſ. Kirch.* 2. *f.* 26.
*Gualt. teſt. t.* 78. *f.* B.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 3.
*Knorr. del. t.* B. V. *f.* 3.
*Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 89. *f.* 775. 776.
ε) *Liſt. Conch. t* 372. *f.* 213?
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 89. *f.* 777.
ζ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 2.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 92. *f.* 785.
η) *Argenv. Conch. t.* 22. *f.* F.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 86. *f.* 769.
*Habitat in* mari mediterraneo, adriatico, americano, *teſta ſubfuſca*, *margine externo rotunda-*
*ta*,

*ta, $7\frac{1}{2}$ pollices longa, & $3\frac{1}{2}$ lata, squamis extrorsum majoribus ad $\frac{1}{2}$ pollicem longis, rectis: valvarum parte dimidia costata, altera transversim rugosa: rugis partem latiorem versus striis decussantibus. Tendo graecis in deliciis.*

muricata. 4. P. testa striata: squamis concavis ovatis acutis.
*Mus. Lud. Ulr.* 545. *n.* 143. *
*Hasselq. it.* 447. *n.* 137. Concha Pinna.
*List. Conch. t.* 370. *f.* 210. Pinna tenuis striata muricata.
*Rumpf. mus. t.* 46. *f.* M. Pinna lata altera.
*Pet. amb. aq. t.* 19. *f.* 14.
*Gualt. test. t.* 79. *f.* D.
*Seb. mus.* 3. *t.* 92. *ser.* 1. *f. prim. & ult.*
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 20. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 91. *f.* 781.
*Habitat in* Oceano indico, *testa tenui, pellucida, cornea, ultra 5 pollices longa, & 3 fere lata: striis alternis echinatis.*

rotundata. 5. P. testa squamis obsoletis: margine rotundata.
*Mus. Lud. Ulr.* 545. *n.* 144. *
*Gualt. test. t.* 80. *f.* A. B.
*Seb. mus.* 3. *t.* 91. *f.* 1.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 93. *f.* 79.
*Habitat in* maris mediterranei *sinubus tranquillis: testa oblonga, albida, non raro ultra 2 pedes longa: rugis perpendicularibus undulatis, parallelis: squamis in latiori parte subtilissimis concavis, acutis, rarioribus.*

squa-

*Byssus, quam pinnae largiter praebent, sericis instar operibus textilibus in Italia meridionali inserunt, [illegible] potius, [illegible] pinnae [illegible] in sinubus [illegible] tranquillis maris [illegible] utplurimum gregatim [illegible], neque a sepia [illegible], neque a cancro [illegible] versus hostem defensae, caro vermis incolae multis deliciosa.*

squamosa. 6. P. testa squamis subtilissimis undulatis rugisque flexuosis latis : infra acuminata nuda.
*List. Conch. t.* 374. *f.* 215.
*Gualt. test. t.* 78. *f.* A.
*Argenv. Conch. t.* 22. *f.* B
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 92. *f.* 784.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa* 13 *fere pollices longa & 6 lata, infra albida, supra subspadicea, margine externo angulato.*

carnea. 7. P. testa tenui carnea nuda longitudinaliter sulcata : margine externo acuto subrotundato.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 1.
*Habitat* - - - *maculis interdum albis varia.*

laccata. 8. P. testa lævi laccata erectiuscula subfastigiata.
*Mus. Lud. Ulr.* 546. *n.* 145. *
*Rumpf mus. t.* 46. *f.* N. Pinna alba.
*Petiv. amb. aq. t.* 19. *f.* 7.
*List. Conch. t.* 370. *f.* 211. ? & *t.* 371. *f.* 212 ?
*Gualt. test. t.* 79. *f.* F.
*Chemn. Conch.* 8. *t.* 90. *f.* 779 ?
*Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 481. *t.* 9. *f.* 17.
*Habitat rarissima in* mari mediterraneo & indico, *testa tenui inferius albida, superne rubella,* 5¾ *pollices longa,* 2¾ *lata, superius plana margine rotundata, inferius gibba, squamis nuda, striis* 10 *extrorsum latescentibus longitudinalibus.*

digitiformis. 9. P. testa lævi tubulosa digitiformi incurva margine summo membranacea. *Mus. Lud. Ulr.* 546. *n.* 146. *
*Habitat in* Oceano indico, *testa planiuscula, oblonga, pellucida.*

lobata. 10. P. testa nuda lobata. *Mus. Lud. Ulr.* 547. *n.* 147. *
*Habitat in* Oceano indico, *testa straminea, striis pur-*

*purpureis picta, membranacea, dum valvae explicantur, obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus, a cardine ad lobos nervus; a nervo lineae laterales ductae.*

vitrea. 11. P. testa hyalina longitudinaliter subundulatim striata: striis rarius squamatis striis ad marginem transversas decussantibus.
*Gualt. test. t. 78. f. C. & t. 79. f. E.*
*Chemn. Conch. 8. t. 87. f. 772.*
*Habitat rarissima in* Oceano indico.

incurva. 12. P. testa angustata elongata nuda carinata: rugis transversis undulatis.
*Bonann. recr. 2. f. 23.*
*muf. Kirch. 2. f. 25.*
*Rumpf muf. t. 46. f. I. K.*
*Petiv. amb. aq. t. 19. f. 4. 5.*
*Klein oftr. t. 11. f. 71.*
*Chemn. Conch. 8. t. 90. f. 778.*
*Habitat in* Oceano indico, *testa spectabili, dilute cornea, ad cardinem curvata, striis paucis longitudinalibus notata.*

bicolor. 13. P. testa tenui ad marginem lateralem inflexa flavicante: radiis ex atro fubfuscis; striis paucis longitudinalibus.
*Chemn. Conch. 8. t. 90. f. 780.*
*Habitat rarior in* mari rubro, *testa cornea elongata, striis ad marginem curvatum nonnullis transversis arcuatis, margine supremo rotundato.*

exusta. 14. P. testa planiuscula cornea nigricante radiata maculata & nebulosa: striis multis laevibus, paucioribus spinosis: squamis canaliculatis.
*Seb. muf. 3. t. 91. f. 2.*
*Chemn. Conch. 8. t. 91. f. 782.*
*Habitat rarior in* Oceano indico australi. Ve-

Vexillum. 15. P. testa truncata extrorsum: dilatata nuda cornea hinc inde nigro nebulosa anterius longitudinaliter striata, posterius transversim rugosa.
v. *Born mus. Caes. Vind. test. t. 7. f. 8.*
*Chemn. Conch. 8. t. 91. f. 783.*
*Habitat rarissima in* India, *testa quasi alata, margine laterali curvo.*

papyracea. 16. P. testa tenuissima cornea fragili longitudinaliter costata: margine extremo subrotundato.
*Chemn. Conch. 8. t. 93. f. 786.*
*Habitat in* Oceano indico, *dorso costarum rarius squamato, in testae medio macula ex violaceo subfusca, & ad marginem lateralem rugis nonnullis transversis.*

sanguinea. 17. P. testa planiuscula subincurva sanguinea: striis perpendicularibus raris lævibus.
*Gualt. test. t. 79. f. B.*
*Habitat - - - testa 3 pollices longa; an distincta species?*

bullata. 18. P. testa rectissima tenui perpendiculariter striata: rugis ad marginem inferiorem transversis spinosis.
*Gualt. test. t. 79. f. C.*
*Habitat - - - an distincta a reliquis species?*

317. ARGONAUTA. *Animal* Sepia, *aut* Clio.
*Testa* univalvis spiralis involuta membranacea unilocularis.

Argo. 1. A. carina utrinque subdentata. *Mus. Lud. Ulr.* 548. *n.* 148. *
*Bellon. aq. t.* 380. Nautilus.
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 1. f.* 13. Nautilus s. Naupilius.

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 18. *f.* 1. 4. A. B. Nautilus tenuis.
*Gualt. teſt. t.* 11. *f.* A. B. & *t.* 12. *f.* A. B. C. Cymbium.
*Olear. muſ. p.* 66. *t.* 32. *f.* 4. Nautilus.
*Teſſin epiſt.* 1. *n.* 28. Cymbium.
*Klein oſtr t.* 1. *f.* 3. Nautilus ſulcatus.
*Argenv. Conch. t.* 5. *f.* A. B. C. Nautilus papyraceus.
*zoomorph. t.* 2. *f.* 2. 3.
*Liſt. Conch. t.* 554. 555.
*Lochn. muſ. Besler. t.* 19.
*Muſ. Gottwald. t.* 40. *f.* 272-274.
*Leſſer teſtaceoth. t.* 1. *n.* 6.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 84. *f.* 4-12.
*Ginann. adr.* 2. *t.* 3. *f.* 29.
*Murray teſtac. t.* 1. *f.* 8.
*Knorr del. t.* B. I. *f.* 3. 4.
*Vergn.* 1. *t.* 2. *f.* 1. 2. 4. *t.* 99. *f.* 1. & 6. *t.* 31.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 156.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 157.
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 158. 159.
ε) *Martin. Conch.* 1. *t.* 18. *f.* 160.
ζ) *Martin. Conch.* 1. *vign.* 8. *f.* 2.
*Habitat in* Pelago, mari indico, mediterraneo, *teſta alba interdum flaveſcente ſtriis coſtisve laevibus vel noduloſis, non raro bifurcis, carina utplurimum fuſceſcente: Incola navigat emiſſa aqua exonerata ſentina ſupinus in ſumma aquarum, membranam mirae tenuitatis extendit; brachia duo retorquens, caeteris ſubremigans, vaſificat, demum hauſta ſe mergens aqua.* Plinius IX. 29.

vitreus. 2. A. carina medio dentata.
*Argenv. zoom. t.* 10. *f.* B.
*Martin. Conch.* 1. *p.* 239. *t.* 18. *f.* 163.

Ha-

*Habitat - - - rariſſimus teſta conica transverſim coſtata carina convexa, apertura ovali.*

Cymbium. 3. A. carina rugoſa mutica.
*Gualt. teſt. t. 12. f. D.*
*Mart. Conch. 1. t. 18. f. 161.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta vix minimae arvenſae magnitudine, depreſſa, tenera, rugoſa: rugis ſtrias ſubtiles longitudinales decuſſantibus.*

Cornu. 4. A. carina annulis quatuor lævibus elevatis.
*Spengl. Beſch. berl. Naturf. 2. p. 458. t. 13. f. 3-5.*
*Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1271-1273.*
*Favann. Conch. t. 5. f. 1.*
*Habitat ad caput bonae ſpei, teſta lineam alta, 5 lata, tenera, pellucida, ſtriis flexuoſis notata, ſpirae anfractibus omnibus exterius conſpicuis disjunctis, aperiura parallelogramma.*

Arctica. 5. A. perforata, carina integra. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 386. n. 364.*
*Pallas ſpic. zool. 10. p. 38.* Clio helicina.
*Habitat frequens, vere potiſſimum & auctumno, in ſuperficie* maris Groenlandiam *alluentis, teſta fragiliſſima diametri 3½ linearum alba, ſubtiliter ſulcata, umbilico perforato.*

318. NAUTILUS. *Animal (Rumpf muſ. t.17. f.B.)*
*Teſta* univalvis iſthmis perforatis concamerata, polythalamia.

* *ſpirales rotundati.*
† *anfractibus contiguis.*

Pompilius. 1. N. teſtæ apertura cordata, anfractibus obtuſis lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 549. *n.* 149. *
*Rondel. aq. p.* 97. Cochlea margaritifera.
*Bellon. aq. t.* 382. Nautilus alter.
*Rumpf muſ. t.* 17. *f.* A. C. Nautilus major craſſus.
*Jonſt. aq. t.* 10. *f.* 1. 2. 7.
*Liſt. Conch. t.* 550. *f.* 1. 3. *t.* 551.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 1. *f.* 1. 2.
*Gualt. teſt. t.* 17. A. *f.* A. B. *t.* 17. B. & 18.
*Argenv. Conch. t.* 5. *f.* E. F.
*Pet. amb. aq. t.* 3. *f.* 7.
*gazoph. t.* 99. *f.* D.
*Breyn. polyth.* 14.
*Klein oſtr. t.* 1. *f.* 1.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 84. *f.* 1-3.
*Besl. gazoph. t.* 22. *f. prim. & ult.*
*Lochner muſ. Besler. t.* 19. *f.* 5. 6.
*Muſ. Gottwald. t.* 40. *f.* 271. aa. b. *t.* 41. *f.* 276.
*Leſſer teſtaceoth. t.* 2. *f.* 11.
*Chemn. Beytr. z. Teſtaceoth. tit.*
*Knorr delic. t.* B. *f.* 1. 2. & *t.* B. I. *f.* 1. 2. & 4.
*Vergn.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. & *t.* 2. *f.* 3.
*t.* 22. *f.* 1. 2?
*Martin. Conch.* 1. *p.* 226. *vign.* 10. *t.* 18. *f.* 164. B, 167.

---

Nautili *plurimi etiamnum in pelagi abyſſo latent, & noti hactenus, Pompilio, Spirula, Orthocerate et foſſilibus exceptis, tam exiles, ut armato oculo examinari penitius debeant.*

*a) Liſt. Conch. t. 552. f. 4.*
*Knorr del. nat. ſel. t. B. 3. f. 1.*
*Favann. Conch. t. 7. f. D. 3.*
*catul. raiſ. t. 2.*
*Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1274. 1275.*
*Habitat in* Indico & africano Oceano, *teſta ſaepius grandi, ſolida, ſub cortice albo, maculis virgatis fuſcis ſtriis flexuoſis ſpectabili matris perlarum teſtae nitente, hinc ſaepius decorticata & pulchra pictura elaborata, ad pocula aquae potatorum orientalium praeparatur.*

Calcar. 2. N. teſtae apertura lineari, anfractuum geniculis elevatis.
*Planc. Conch. 12. t. 1. f. 3. 4.*
*Gualt. teſt. t. 19. f. B. C.*
*Lederm. microſc. t. 8. f. c. d.*
*Martin. Conch. 1. t. 19. f. 168. 169.*
*Habitat in* mari adriatico, *minutus; an vere diſtincta a reliquis ſpecies?*

criſpus. 3. N. teſtae apertura ſemicordata anfractuum geniculis crenatis.
*Planc. Conch. 10. t. 1. f. 2.*
*Gualt. teſt. t. 19. f. A. D.*
*Ginann. adr. t. 14. f. 112.*
*Lederm. microſc. t. 8. f. 6.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta minuta utrinque umbilicata, granulata, ſtriata: ſtriis flexuoſis, dorſo carinato, ſiphone centrali, cameris medio pauliſper inflexis.*

Beccarii. 4. N. teſtae apertura obovata, anfractibus tortuoſis: geniculis inſculptis.
*Planc. Conch. 8. t. 1. f. 1.*
*Gualt. teſt. t. 19. f. H. H. I.*
*Ginann. adr. 2. t. 14. f. 111.*
*Lederm. microſc. 16. t. 8. f. a. & t. 4. f. B.*

*Murray teſtac. t. 1. f. 16.*
*Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. f. 3.*
*Martin. Conch. 1. t. 19. f. 178. 179. & t. 20. f. 175-177.*

ammonoides. ε) Nautilus teſta compreſſa: apertura lineari: anfractibus contiguis: ſtriis elevatis multiradiata.
*Gronov. zooph. t. 19. f. 5. 6.*
*Habitat in* mari mediterraneo & adriatico, *inter prototypos cornuum ammonis foſſilium princeps, teſta ſubdepreſſa, minuta.*

balthicus. 5. N. teſta alba convexa: apertura lineari, anfractuum primo reliquos longe ſuperante.
*Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 20. t. 1. f. 2.*
*Naturf. 17. p. 120.*
*Habitat in* mari balthico, *fucorum radicibus adhaerens, n. Beccarii affinis, teſta nunc opaca, nunc nitente, ſaepius pellucida, anfractibus nunc laevibus, nunc ſtriatis, nunc coſtatis, nunc tuberculatis.*

Helicites. 6. N. anfractibus occultis.
*Schroet. Einl. in Stein. 4. t. 10. f. 2.*
*Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus in monte* S. Petri *ad* Moſæ Trajectum, *lentis utplurimum magnitudine, teſta nunc convexiuſcula, nunc depreſſa, nunc laevi, nunc ſtriata.*

rugoſus. 7. N. teſtæ apertura lineari, anfractibus compreſſis incraſſato-marginatis.
*Habitat in* Oceano auſtrali, *minutus, teſta alba, depreſſo-plana: diſſepimentis internis extrinſecus prominulis, ſ. rugis tranſverſis ſecundum diſſepimenta.*

umbilicatus. 8. N. teſtæ apertura compreſſo-lineari, anfractibus compreſſis, umbilico concavo.
*Column. phytob. 2. t. 38. f. E.*

*Ha-*

*Habitat* Liburni, *minutus, testa praesertim ad carinam, sulcis transversis secundum dissepimenta oblique articulata.*

†† *anfractibus disjunctis.*

Spicula. 9. N. testæ apertura orbiculari, anfractibus cylindricis. *Mus. Lud. Ulr.* 549. *n.* 150. *
*Schammerd. biol. nat.* 1. *t.* 7. *f.* 7. 8.
*Lin. Conch. t.* 550. 2.
*Bonann. mus. Kirch.* 1. *f.* 39.
*Rumpf mus. t.* 20. *f.* 1.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 5. *f.* G. G.
*Breyn. polyth.* 21. *f.* 2.
*Klein ostr. t.* 1. *f.* 6.
*Scheuchz. Schweiz. Naturg.* 3. *f.* 15.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 49.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 2. *f.* 6.
*Martin. Conch.* 1. *p.* 254. *vign.* 11. *f.* 1-3. *& t.* 20. *f.* 184. 185.
*Habitat in* Oceano americano & indico, *testa pollicem circiter magna, exalbida, intus nitris perlarum instar nitente orbiculari, anfractibus introrsum sensim decrescentibus, primo prominulo rectiusculo, siphone testae parietibus contiguo; an protypus lituitarum?*

Spengleri. 10. N. testa lævi: tuberculis quatuor conicis.
*Spengl. Schr. daenish. Ges.* 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. b. c.
*Habitat in* arena buccinorum callideorum Indiæ, *testa minima.*

unguiculatus. 11. N. testa diaphana: septis intermedis extorius protuberantibus, tuberculis conicis sex.
*Spengl. Schr. daen. Ges.* 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. d.
*Habitat in* arena buccinorum callideorum Indiæ, *testa minuta, tenera, nitida, alba, subcostata.*

** elongati *rectiusculi.*

Semilituus. 12. N. testæ apice incurvato-spirali, anfractibus contiguis.
*Column. phytob.* 2. *t.* 38. *f.* D. Semilituus.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 20. *f.* 186. 187.
*Habitat* Liburni, *ad littus, testa minima convexiuscula, dissepimentis extrinsecus per incisuras conspicuis, non raro umbilicata.*

Lituus. 13. N. testa subconica: articulis globosis sensim decrescentibus, apice incurvato spirali.
*Spengl. Schr. duen. Ges.* 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. d. g.
*Klein Danz. naturf. Ges. Schr.* 2. *p.* 47. *t.* 1. *litt.* a.
*Habitat rarior in* mari rubro, *frequentior inter fossilia.*

obliquus. 14. N. testa recto-subarcuata: articulis oblique striatis.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* N.
*Martin. Conch. vign.* 1. *f.* H. h.
*Habitat in* mari adriatico & mediterraneo, *testa minuta ambitu crenata; siphone centrali: an prototypus orthoceratitarum incurvorum?*

Raphanistrum. 15. N. testa subcylindrica: articulis torosis; striis elevatis duodenis, siphone centrali regulari.
*Lederm. microsc. t.* 4. *f.* X. *poster.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *unguis magnitudine, raphano major; an prototypus orthoceratitarum cylindrici?*

Raphanus. 16. N. testa articulata: articulis torosis; striis elevatis sedenis, siphone sublaterali obliquo.
*Planc. Conch. t.* 1. *f.* 6.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* L. L L. M.
*Lederm. microsc. t.* 4. *f.* X. *prior*, & *t.* 8. *f.* F.

Ha-

*Habitat in* mari adriatico & mediterraneo, *minutus*; *an protypus orthoceratitae conici?*

Granum. 17. N. testa ovato-oblonga: articulis torosis; striis elevatis octonis interruptis, siphone obliquo.
*Habitat in* mari mediterraneo, *minutus*, *striis ad articulorum genicula admodum contractis a ruphano distinctus.*

Radicula. 18. N. testa oblongo-ovata: articulis torosis glabris.
*Planc. Conch.* 14. *t.* 1. *f.* 5.
*Lederm. microsc. t.* 8. *f.* e. & *t.* 4. *f.* 1. f.
*Habitat rarissimus in* mari adriatico, *minutus*, *siphone sublaterali.*

Fascia. 19. N. testæ articulis striatis: geniculis lævibus elevatis.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* O.
*Mart. Conch.* 1. *vign.* 1. *f.* DD.
*Habitat in* mari adriatico, *minutus*, *testa conica*, *confertim striata*, *apice obtusa*, *margine denticulata*: *siphone centrali.*

inæqualis. 20. N. testa cylindrica: articulis octo, secundo, tertioque brevissimis, apertura marginata.
*Spengl. daen. Ges. Schr.* 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. a. b. c.
*Habitat in* maris rubri arena, *testacea replente*, *testa minuta nivea.*

Siphunculus. 21. N. testa lævi: articulis cylindricis remotis: geniculis attenuatis cylindricis.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* R. S.
*Martini Conch.* 1. *vign.* 1. *f. f.* F. FF.
*Habitat in* freto siculo, *rupi coralliferae adhaerens*, *testa minuta*, *articulis* 11, *alternatim angustioribus & latioribus.*

Le-

Legumen. 22. N. testa compressa articulata, hinc marginata: siphone laterali. *Pianc. Conch.* 8. *t.* 1. *f.* 7.
*Gualt. test. t.* 19. *f.* P.
*Lederm. microsc. t.* 8. *f.* g.
*Martin. Conch.* 1. *vign.* 1. *f.* e. E. I.
*Habitat in* mari adriatico, *testa minuta subconica, apice ad alterum latus culirato, ad alterum leviter arcuato.*

Orthocera. 23. N. testæ anfractibus carinato striatis. *It. sel.* 140.
*Mus. Tessin.* 86. Nautilus rectus.
*Scheuchz. helv.* 7. *t.* 8. *diluv.* 938. Alveolus.
*Gmelin act. Petrop.* 3. *p.* 246.
*Gron. lap.* 71.
*Habitat in* alto pelago, *frequenter fossilis; an distincta a reliquis species prototypus?*

Polemnita. 24. N. testa æquabili lævi conica acuta.
*Habitat* - - - *frequens inter fossilia omnis Europæ, nonne potius hujus generis, quam alcyonii?*

319. CONUS. *Animal* Limax.
*Testa* univalvis, convoluta, turbinata.
*Apertura* effusa, longitudinalis, linearis, edentula, basi integra.
*Columella* lævis.

* Truncati *f. spira fere truncata.*

marmoreus. 1. C. testa conica fusca: maculis ovatis albis, spiræ anfractibus canaliculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 550. *n.* 151.
*Olear. mus. t.* 31. *f.* 2.
*Mus. Gottwald. t.* 14. *f.* 104. a. 104. b.
*List. Conch. t.* 787. *f.* 39.

Ba-

*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 123.
*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* N. & 1.
*Valent. Abh. t.* 3. *f.* 25. *t.*5. *f.*43. & *t.*7. *f.*65. A.
*Petiv. gazoph. t.* 47. *f.* 11.
*Gualt. teſt. t.* 22. *f.* D.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* M. O.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 46. *f.* 1-4. 13-19. & *t.* 47. *f.*1-4. & *t.* 22. *f.* 2. 3.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 4. & *t.* 15. *f.* 2. & 4. *t.* 17. *f.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 53.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 685. 686.
β) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 10. & *t.* 5. *f.* 44.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 4.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 46. *f.* 5-12.
*Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 687. 688.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1279.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1292.
*Habitat in* Alia, ε) *rarior, teſta ſubtiliter ſtriata, interdum atra aut fulva, maculis ſubtrigonis in* ϐ) *pauciioribus & in faſcias confluentibus; ſpirae paulo elatioris anfractibus emarginatis tuberculato ſpinoſis.*

imperialis. 2. C. teſta albida: faſciis longitudinalibus lividis cingulisque linearibus albo fuſcoque articulatis.
*Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 152. *
*Rumpf muſ. t.* 34. *f.* H. I. Kroon hoorn.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* E. F. Corona imperialis.
*Liſt. Conch. t.* 766. *f.* 15.
*Valent. Abh. t.* 3. *f.* 26.
*Gualt. teſt. t.* 22. *f.* A.
*Klein. oſtr. t.* 4. *f.* 84.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 47. *f.* 18-21.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 11. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 35.
*Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 690-692.
ϐ) *Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 693 ?

γ)

γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1289.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1290. 1291.
*Habitat rarior - - - testa satis magna alba, fasciis utplurimum 2 luteis, cingulisque pluribus cæruleis interruptis albis fusciisque conjunctis. Spira plana, magis minusve emarginata, virgisque undulatis fuscis picta.*

littera-tus. 3. C. testa conica alba: punctis fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.
*Rumpf. mus. t.* 31. *f.* D. Voluta musicalis.
*List. Conch. t.* 773. *f.* 19 ? *t.* 774. *f.* 20.
*Bonann. rec.* 3. *f.* 132 ? 363.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 357.
*Gualt. test. t.* 21. *f.* G. O.
*Seb. mus.* 3. *t.* 45. *f.* 1-5.
*Mus. Gottwald. t.* 14. *f.* 101. c. 101. d.
*Knorr delic. t.* B. III. *f.* 4.
*Vergn.* 1. *t.* 16. *f.* 3. 3. *t.* 3. *f.* 2. & 4. *t.* 26. *f.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 29. & *t.* 4. *f.* 46.
*Martini Conch.* 2. *t.* 60. *f.* 666-668.
ε) *Gualt. test. t.* 22. *f.* B. C.
*Seb. mus.* 3. *t.* 44. *f.* 5. 7. *t.* 45. *f.* 8. 9. 12-15. & *t.* 47. *f.* 25.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 4. & 5. *t.* 24. *f.* 5.
*Martini Concl.* 2. *t.* 669
*Habitat in* Oceano asiatico, *testa interdum rubella aut flavescente, punctis s. potius maculis subcostalibus, in series digestis: fasciis nonnunquam obsoletis flavis interstitis, aut in* ε) *lineis spadiceis, spira maculis virgatis fuscis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.*

Gene-ralis. 4. C. testa conica nitida: spira plana muricata; anfractibus canaliculatis.
*List. Conch. t.* 786. *f.* 35.
*Rumpf mus. t.* 33. *f.* Y.

pr-

*Petiv. gazoph. t. 27. f. 11.*
*Valent. Abh. t. 1. f. 9.*
*Gualt. teſt. t. 20. f. G.*
*Argenv. Conch. t. 12. f. T.*
*zoomorph. t. 3. f. F.*
*Seb. muſ. 3. t. 54. f. 11-13.*
*Muſ. Gottwald. t. 13. f. 100. 100. a.*
*Olear. muſ. t. 31. f. 5.*
*Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 3. 2. t. 5. f. 2. & 3. t. 17. f. 4. 5. & t. 18. f. 3. 4.*
*Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 65.*
*Martin. Conch. 2. t. 58. f. 645-652.*
ε) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1301-1303.*
*Habitat paulo rarior in* India, *teſta pulla, lutea, flava vel aurantia, nunc latiore nunc anguſtiore: fuſciis 2-4 albis, maculis virgatis pictis; ſpira albida, maculis virgatis undatis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. C. teſta conica: baſi cæruleſcente. *Muſ. Lud. Ulr. 551. n. 153* *
*Liſt. Conch. t. 753. f. 1. t. 754. f. 2. & t. 758. f. 3.*
*Rumpf muſ. t. 31. f. E.*
*Gualt. teſt. t. 20. f. B.*
*Bonann recr. 3. f. 365.*
*muſ. Kirch. 3. f. 356.*
*Klein oſtr. t. 4. f. 83.*
*Seb. muſ. 3. t. 47 f. 8. 9.*
*Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1.*
*Muſ. Gottwald. t. 13. f. 99. h. & t. 14. f. 105. a. 105. b.*
*Martin. Conch. 2. t. 53. f. 585-589.*
ε) *Knorr Vergn. 4. t. 16. f. 5.*
*Martin. Conch. 2. t. 63. f. 701. 702.*
ζ) *Liſt. Conch. t. 767. f. 17.*
*Valent. Abh. t. 6. f. 52. & t. 8. f. 73.*
*Gualt. teſt. t. 21. f. H.*
*Seb. muſ. 3. t. 55. f. 4-9.*

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 2. *t.* 12. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 19.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 59. *f.* 653. 654.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 4 ?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1281.
*Habitat in* Oceano africano, *testa laevi flavicante, frequentius nivea, in* γ) *alba rubroque tessellata, in* ζ) *alba: fascia straminea, spira caerulea, aut caerulea: spira alba; fascia ochroleuca.*

Capitaneus. 6. C. testa conica glabra basi fusca: spira convexiuscula. *Mus. Lud. Ulr.* 552. *n.* 155. *
*List. Conch. t.* 780. *f.* 27. *t.* 781. *f.* 28 ?
*Valent. Abh. t.* 3. *f.* 22. 23. & *t.* 6. *f.* 40.
*Mus. Gottw. t.* 12. *f.* 85. b. c. & *t.* 13. *f.* 99. c-g.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 6. & *t.* 15. *f.* 3. 2. *t.* 6. *f.* 3. & 5. *t.* 16. *f.* 2.
*Martini Conch.* 2. *t.* 59. *f.* 660-662.
β) *Gualt. test. t.* 20. *f.* I.
γ) *Rumpf mus. t.* 33. *f.* X.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* K.
*Gualt. test. t.* 22. *f.* M.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 7.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 361.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 354.
*Seb. mus.* 3. *t.* 42. *f.* 26-36.
ε) *Bonann. recr.* & *mus. Kirch.* 3. *f.* 139.
ζ) *Valent. Abh. t.* 5. *f.* 47.
*Gualt. test. t.* 20. *f.* Q.
*Seb. mus.* 3. *t.* 42. *f.* 40. 41.
*Martini Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 630. 631.
η) *Favann. Conch.* 2. *t.* 15. *f.* A ?
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1280.
ϑ) *Gualt. test. t.* 25. *f.* F.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1298.
ι) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* a. b.
κ) *Kaemm. Cab. Rudolst. t.* 7. *f.* 4.

Ha-

*Habitat in* Asia, *testa olivacea, lutea, fusca, spadicea aut intermedia, varius unicolore, frequentius fascia aut 2 albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis variis, & praeterea crebro punctorum maculiformiue seriebus picta, spira varius plana, utplurimum maculis virgatis varia.*

Tribunus. 7. C. testa alba: fasciis tribus flavicantibus spadiceo maculatis, spira convexiuscula, basi transversim striata.
*Martin. Conch. 2. t. 59. f. 655.*
*Habitat* - - - *testa lineis spadiceis undulatis rariusculis picta.*

Miles. 8. C. testa conica rudi: basi fusca, spira convexa.
*Argenv. Conch. t. 12. f. L. Pseudo-Architalassus.*
*List. Conch. t. 786. f. 34.*
*Rumpf mus. t. 33. f. W.*
*Gualt. test. t. 20. f. N.*
*Seb. mus. 3. t. 42. f. 23-25.*
*Mus. Gottwald. t. 13. f. 99. a. 99. b.*
*Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 4. & 3. t. 1. f. 2. 3.*
*Martini Conch. 2. t. 59. f. 663. 664.*
*Habitat in* India, *testa albida aut flavescente lineis longitudinalibus undulatis notata, basi transversim striata, fascia spiram fusco maculatam versus fusca.*

Cingulum. 72. C. testa conica ex luteo flavicante: cingulo medio elevato solitario, spira acuta. *Mant. univ. Conch. 1. t. 39.*
*Habitat ad* insulas amicas.

** pyriformes, *basi rotundata subcylindrica sesquilongiore, quam spira.*

Princeps. 9. C. testa flava: lineis fusco purpureis longitudina-

nalibus ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 156.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 138 ?
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 30. *t.* 1. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 779. *f.* 26.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* Q.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* B.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 47. *f.* 30. 31.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 2.
*Martini Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 699. 700.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. 1276.
*Habitat - - - tea 2½ polliices longa : faſciis duabus albis hinc inde fuſco maculatis, ſpira obtuſa ſubtiliſſime transverſim ſtriata, maculis ſubliveis, ſuperne atris varia ; teſta in* ε) *breviore ex atro fuſca.*

Ammiralis. larvatus. americanus.

10. C. teſta baſi punctato-ſcabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 553. *n.* 157. ?
ε) faſciis nullis.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 635. a.
ζ) faſciis irregularibus.
a) teſta fuſca albo nebuloſa maculataque.
*Rumpf muſ. t.* 34. *f.* E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 46. *f.* 20.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 640.
b) teſta ſpadiceo reticulata nebuloſaque, faſciis interdum alba.
*Rumpf muſ. t.* 34. *f.* F. Proarchithalaſſus.
*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* K. L. V.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 11. 12. 20. 23.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 24. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 638. 639.
c) teſta alba fuſco maculata, guttata, nebuloſa punctata.
*Liſt. Conch. t.* 759. *f.* 4. & *t.* 777. *f.* 24.
*Gualt. teſt. t.* 21. *f.* L.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 13. *f.* 5.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 678.

d)

d) testa alba, fasciis aurantio lineatis.
*Argenv. zoom. t.* 10. *f.* G.
*Seb. mus.* 3. *t.* 44. *f.* 6.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 590.
e) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1297.
f) fasciis regularibus.

anglicus. a) fascia unica, *a*) cingulis pluribus punctatis albis, testa rubra, spira fusco maculata.
*Gualt. test. t.* 20. *f.* P.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 17. *f.* 5. & *t.* 24. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 680.

coronatus. b) cingulo punctorum rubellorum, lineisque transversis elevatis.
*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* M.
*Martin. Conch.* 2. *p.* 275. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 1.
c) fascia flava media, cingulisque punctatis pluribus.
*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* N.
*Martin. Conch.* 2. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 2.
d) testa fusca, fascia alba, serieque macularum albarum obliqua.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 25. *f.* 3.

regius. a) fasciis duabus, *a*) fasciis aurantiis obscurius lineatis: interstitiis albis, punctis maculisque undulatis aurantiis.
*Seb. mus.* 3. *t.* 46. *f.* 22. 23.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 677.
b) fasciis albo fuscoque variis, testa alba: maculis undatis fuscis.
*Martin, Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 684.
c) fasciis flavicantibus trifariam fusco lineatis, testa alba fusco striata. *Knorr*

---

Coni *paucissimi europæi, multi parum, si patriam nativamque formam species, noti, &, si in nullo alio genere, in hoc certe, difficillimum ex iconibus et in museis asservatis speciminibus certo determinare, quid species sit, quid varietas, quantum arti in exornando exemplo debeatur:* Ammiralium *10. et varietates nitidas, turbinis scalaris et ostreæ* Mullei *æmulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit, quam patiuntur opes, stultitia, emtitavit barbara luxuria.*

*Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 3.

d) fasciis fulcis granulato striatis, testa albo fusco-que nebulosa.

*Martin. Naturgesch.* 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.

ordinarius. e) fasciis tribus.

a) testa testacea albo maculata, fasciis albis subreticulatis: media cingulo articulato.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 1.

*Rumpf mus. t.* 34. *f.* C. Admiral.

guineensis. b) testa straminea: fascia media lineis angulatis aurorae modo tinctis picta.

*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* Q. *

*Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* i. k.

fusinamaculosus. c) testa badia, fasciis maculatis: infima fusco alboque punctata, cingulis punctato articulatus pluribus.

*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* R.

*Martin. Conch.* 2. *p.* 282. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 5.

† *Chemn. Conch.* 10. *t.* 133. *f.* 1293.

d) testa fusca: maculis cordatis albis, fasciis albis: media maculis duabus quadratis.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 1.

*d*) fasciis quatuor.

fummus. a) testa ferruginea maculis albis sparsis: fasciis flavis tenuissime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.

*Rumpf mus. t.* 34. *f.* B. Upper admiral.

*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* N. Archithalassus primus.

*Petiv. gazoph. t.* 28. *f.* 4. (male).

*amb. t.* 15. *f.* 18.

*Seb. mus.* 3. *t.* 48. *f.* 5. 6.

*Knorr delic. t.* B. V. *f.* 6.

*Vergn.* 1. *t.* 8. *f.* 2.

*Regenf. Conch.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

*Favann. Conch. t.* 17. *f.* I[1].

*Spengl. selt. Conch. t.* 1. *f.* E.

*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 7. *f.* 11. *Mar-*

*Martin. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 634.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1308.

occidentalis. ††) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1309.
b) testa testacea albo maculata : fasciis flavis reticulatis, cingulo articulato.
c) fasciis quinque & pluribus.
*Argenv. zoom. t.* 10. *f.* O. P.
*Seba muf.* 3. *t.* 48. *f.* 4.

Cedo nulli. *Martin. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 635.
β) cingulis punctato-articulatis.
a) testa flava rubro picta, cingulis lacteis 11.
*Argenv. zoom. t.* 10. *f.* H.
*Seb. muf.* 3. *t.* 48. *f.* 8.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 1. *f.* 1.
*Martini Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 633.
b) testa aurantia lineis elevatis interruptis spadiceis confertis.
*Spengl. Beſch. herl. Naturf.* 1. *t.* 9. *f.* 6.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1306.
*Habitat in* Oceano, Americam australem *alluente, varietate fere infinita, pretiosus.*

Vicarius. 11. C. testa testacea albo maculata : fasciis quatuor flavis immaculatis ; secunda angulo divisa.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* H. Archithalassus secundus.
*Rumpf muf. t.* 34. *f.* D.
*Petiv. amb. t.* 15. *f.* 11.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 1.
*Favann. Conch. t.* 17. *f.* I⁵.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1307.
*Habitat* - - -

Senator. 12. C. testa conica lævi glabra : spiræ anfractibus obtusis scriptis.
*List. Conch. t.* 784. *f.* 31 ?
*Valent. Abh. t.* 6. *f.* 50 ?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 59. *f.* 659.

*Ha-*

*Habitat - - - testa flava albo maculata striisque transversis albo-fuscoque articulatis numerosissimis notata.*

nobilis. 13. C. testa subcylindrica lævi glabra. *Mus. Lud. Ulr.* 554. *n.* 158. *
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* M ? Tigris lutea.
*Valent. Abh. t.* 3. *f.* 21.
*Seb. mus.* 3. *t.* 43. *f.* 13 ? 14 ?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 689.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 4.
*Favann. Conch. t.* 14. *f.* E²
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1312.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1313. 1314.
*Habitat - - - testa nitidissima flava, aut fusca, aliquando in olivaceum vergente, albo maculata, striis transversis obsoletis subtiliter punctatis.*

genuanus. 14. C. cingulis linearibus albo fuscoque articulatis. *Mus. Lud. Ulr.* 554. *n.* 159.
*Rumpf mus. t.* 34. *f.* G. Geneleleche Toot.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 1. Jamar.
*List. Conch. t.* 767. *f.* 16. & *t.* 769. *f.* 17. b ?
*Clear. mus. t.* 32. *f.* 3.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 337.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 336.
*Gualt. test. t.* 22. *f.* G. H.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* Q.
*Seb. mus.* 3. *t.* 48. *f.* 1-3.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 1. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 624. 625.
Papilio. ε) *Argenv. Conch. t.* 12. *f.* V. Ala papilionis.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 623.
*Habitat ad* Guineæ littora, *testa rubra: fasciis alternatim, fusco rubroque tessellatis.*

glaucus. 15. C. testa basi emarginata striata: spiræ inermis anfractibus contiguis. *Mus. Lud. Ulr.* 555. *Rumpf n.* 160. *

*Rumpf muſ. t.* 33. *f.* GG. Botervegie van Boer.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 128.
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 84.
*Gualt. teſt. t.* 22. *f.* F.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 45. *f.* 6. *t.* 55. *f.* 10. *& tres ic. inter* 20. *& tres inter* 23.
*Muſ. Gottwald. t.* 14. *f.* 101. c. x. c. H. c. o. d. ⊙ d. x. *& f.* 103.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 17. *f.* 4. *&* 2. *t.* 7. *f.* 1.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 670-674.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1277. 1278.
*Habitat in* India *&* Africa, *teſta maculis fuſcis, ſpadiceis, rubris, utplurimum ſeriatis varia, ſpira transverſim ſtriata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.*

Monachus. 16. C. teſta gibba fuſco cæruleſcente nebulata acuta baſi ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.*161.*
*Rumpf muſ. t.* 33. *f.* CC. Capucinus ſ. Anicula.
*Liſt. Conch. t.* 756. *f.* 8.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* M ?
*Seb. muſ.* 3. *t.* 47. *f.* 27. *& t.* 48. *f.* 46. 47.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 27. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 55. *f.* 612. a-d.
*β) Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1319. 1320.
*Habitat in* India ? *teſta nonnunquam ſeriatim punctata.*

minimus. 17. C. teſta cineraſcente punctis oblongis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 556 *n.* 162.*
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 25. *f.* 5. *&* 6. *t.* 1. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 55. *f.* 613.
*Habitat* - - -

Ruſticus. 18. C. teſta ovata baſi rugoſa muricatoque ſcabra: ſpira conico-convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 163.*

α) fascia nulla.
*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* R. Voluta cinerea.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 43. *f.* 32?
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* R.
*Martin. Conch.* 2. *t* 52. *f.* 578.
ε) fascia albido nebulata.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 37-39.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* D.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 13. *f.* 3.
*Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 86. b?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 694. 695.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* e. f?
*Habitat in* Africa, *teſta livida* : β) *lineis punctisque nigricantibus varia.*

Mercator. 19. C. teſta ovata alba : fasciis reticulatis flavis. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 164. *
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 3. Tilin.
*Liſt. Conch. t.* 788. *f.* 41.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 136.
*Valent. Abh. t.* 7. *f.* 65. B.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* P.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 54.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 4.
*Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 92. a.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 619. 620. 621?
*Habitat ad* Africæ *littus occidentale* ; *teſta mediae magnitudinis interdum flavicante* : *fasciis nonnunquam fuſcis aut ſpadiceis.*

betulinus. 20. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa : ſpira planiuſcula mucronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 165. *
*Liſt. Conch. t.* 762. *f.* 11.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 131.
*Rumpf muſ. t.* 31. *f.* C.
*Gualt. teſt. t.* 21. *f.* B.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 1-4. & *t.* 45. *f.* 7. 10. 11.

*Muſ.*

*Muſ. Gottwald. t.* 13. *f.* 101. a. b.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 11. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 60. *f.* 665.
Medu- ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 675 ?
ſa. ϛ) *Knorr Delic.* 1. *t.* B. III. *f.* 5 ?
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1321.
*Habitat in* India, *teſta ſatis magna, flava, utplurimum ochroleuca, faſciis teſſellatim maculatis lineisque intermediis fuſcis aut luteſcentibus varia; in* ε) *alba ſeriebus tribus characterum violaceorum, in* ϛ) *alba faſciis, maculis punctisque fuſcis varia.*

ſigulinus. 21. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira acuminata, anfractibus planiuſculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 166. *
*Rumpf muſ. t.* 31. *f.* V. & *t.* 33. *f.* 1. Voluta filoſa.
*Liſt. Conch. t.* 785. *f.* 32.
*Valent. Abh. t.* 4. *f.* 34.
*Gualt. teſt. t.* 20. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 54. *f.* 1-4. 8.
*Muſ. Gottwald. t.* 13. *f.* 98. a-f.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 11. *f.* 2. & 5. *t.* 25. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 47.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 59. *f.* 656-658.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 15. *f.* 2 ?
ϗ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 27. *t.* 138. *f.* 1285.
*Habitat paulo rarior in* India, *teſta ad* 3 *pollices longa, fuſca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis & ſpira obſcurioribus, intus utplurimum alba, faſcia interdum* 1-2 *flava, vel alba; in* ε) *teſta magis elongata, aurantia lineis obſcurioribus faſciisque duabus flavicantibus varia, ſpira rubella nigro maculata.*

ebræus. 22. C. teſta ovata alba: faſciis nigris ex macu-

lis transversis. *Mus. Lud. Ulr.* 558. *n.* 167.
*Rumpf mus. t.* 33. *f.* BB. Musica rusticorum.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* G. Hebraica.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 5. Coupet.
*List. Conch. t.* 779. *f.* 25.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. *f.* 122.
*Gualt. test. t.* 25. *f.* T.
*Valent. Abh. t.* 11. *f.* 94.
*Petiv. gaz.* 99. *f.* 12.
*Seb. mus.* 3. *t.* 47. *f.* 28. 29.
*Mus. Gottwald. t.* 14. *f.* 101. e. *f.* 104. c. d.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 617.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* q. r.
*Habitat in* India, *testa minore, interdum rubella, maculis parallelogrammis nonnunquam spadiceis.*

Stercus muscarum. 23. C. testa basi emarginata striata : spiræ anfractibus canaliculatis. *Mus. Lud. Ulr.* 559. *n.* 168. *
*Rumpf mus. t.* 33. *f.* Z. Voluta arcuata.
*List. Conch. t.* 757 *f.* 9.
*Bonann. mus. Kirch.* 3. *f.* 408.
*Gualt. test. t.* 25. *f.* N. O.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* E.
*Petiv. gazoph. t.* 75. *f.* 1.
*Seb. mus.* 3. *t.* 55. *f.* 1.
*Knorr delic. t.* B. V. *f.* 7.
*Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 5. & 6. *t.* 16. *f.* 4.
*Mus. Gottwald. t.* 12. *f.* 88. a. b. c.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 64. *f.* 711-713.
ε) *Rumpf mus. t.* 33. *f.* 2?
*Seb. mus.* 3. *t.* 55. *f.* 23?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f* 698. 699. a?
ϑ) *List. Conch. t.* 761. *f.* 10.
*Rumpf mus. t.* 33. *f.* AA.
*Gualt. test. t.* 25. *f.* P.

*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 12.*
*Martin. Conch. 2. t. 63. f. 696. 697.*
*δ) Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1294 ?*
*ε) Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1295 ?*
*Habitat in* Aſia, *teſta longa, anguſta alba punctis nigris aut rubris ſparſis, interdum glomeratis, rarius in faſcias aggregatis, anfractibus obtuſis, in β) & γ) coronatis.*

varius. 24. C. teſta elongata muricata: ſpira coronata acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 169. *
*Liſt. Conch. t. 775. f. 21.*
*Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 129.*
*Rumpf muſ. t. 34. f. L.*
*Gualt. teſt. t. 20. f. F.*
*Argenv. Conch. t. 12. f. R.*
*zoomorph. t. 10. f. X.*
*Seb. muſ. 3. t. 44. f. 19-22. & t. 48. f. 14-17. 24. 25.*
*Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 4. & t. 24. f. 5.*
*Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 9. 10.*
*Martin. Conch. 2. t. 61. f. 679. & t. 62. f. 682.*
*β) Seb. muſ. 3. t. 48. f. 26. 28.*
*Favann. Conch. t. 16. f. E³.*
*Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1284.*
*Habitat in* Oceano indico, *teſta alba, fuſco, ſpadiceo luteove nebuloſa: ſ. iis granulatis per totam ſuperficiem decurrentibus.*

achati- nus. 25. C. teſta elongata ſubtiliter tranſverſim ſtriata varie nebuloſa albo punctata: ſpira brevi fuſco maculata; apice rubro.
*Seb. muſ. 3. t. 44. f. 30.*
*Muſ. Gottwald. t. 12. f. 89. b. 90.*
*Martin. Conch. 2. t. 52. f. 579. 580.*
*β) Seb. muſ. 3. t. 44. f. 29.*
*γ) Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1296 ?*
*δ) Chemn. Conch. t. 142. f. 1317.*
*Habitat in* Oceano americano.

ra-

radiatus. 26. C. testa radiis fasciisque albis.
*Valent. Abh. t. 6. f. 51.*
*Martin. Conch. 2 t. 53. f. 584.*
*Habitat - - - testa fusca, lutea aut cinerea.*

leoninus. 27. C. testa luteo vel spadiceo maculata: fasciis saepius transversis albis luteisve ex granis aut maculis.
*List. Conch. t. 772. f. 18. & t. 777. f. 23.*
*Rumpf mus. t. 34. f. M.*
*Valent. Abh. t. 6. f. 48.*
*Bonann. recr. 3. f. 130. 364.*
*mus. Kirch. 3. f. 130. 358.*
*Gualt. test. t. 21. f. N.*
*Seb. mus. 3. t. 42. f. 10. 11. 12. & t. 44. f. 13-15.*
*Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 37.*
*Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603. 604. 606. 607.*
β) *Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 4. & 5. t. 22. f. 2.*
*Regenf. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.*
*Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.*
γ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 608.*
δ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 609-611.*

---

Coronatae *testae vocantur, quarum anfractus superne tantum notantur tu-*
*culis f. mucronibus; inter testas coronatas & calvas nulla datur diffe-*
*tia specialis. An ad cones referendae cochleae a* Lister *t. 776. f. 32.*
*t. 778. f. 24. b. a.* Bonanni *mus. Kirch. 3. f. 391. ab* Argenville
*morph. t 11. f. D. et in mus.* Gottwald. *t. 12. f. 85. II. III. f. 87.*
*a. t. 13. f. 97. b. c. f. 100. b. f. 101. e. x. et f. 102. delineatae*
*distinctae species, et si, cuinam tribui inferendae sint* Listerus *Conch. t.*
*f. 39. t. 765. f. 14. t. 768. f. 17. a. t. 771. f. 17. d. t. 778. f. 24.*
*t. 782. f. 29. t. 785. f. 33. t. 786. f. 36. et 37. t. 789. f. 42. et t.*
*f. 43.* Bonanni *recr. et mus. Kircher. 3. f. 124. 125. a. b. f. 127.*
*3. f. 318. mus. Kirch. 3. f. 314. et 407. Rumpf. mus. t 33. f. DD.*
*test. t. 20. f. C. D. t. 21. f.* A. C. I. *Q. t. 22. f.* E. I.. *t. 25. f.*
*et t. 26. f. A ab* Argenville *Conch. t. 12. f. I. S. Seb. mus. 3. t. 42.*
*13. t. 43. f. 15. 16. 17. 18. 19. 23-28. 33. 34. 35. t. 44. f. 10. 17.*
*t. 47. f. 5. 6. 7. 26. t. 48. f. 9 15. 18. 19. 21. 29. t 52. 34. 37. 38.*
*35. 36. 39. 40. 43 ) 41 44. 42. 45. t. 54. f. 5. 6. 9. 12. t. 55. f.*
*Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6. t. 5. f. 3. 5. t. 19. f. 2. t. 27. f. 5. 5.*
*f. 3. 6. t. 1. f. 5. Mus. Gottwald. t. 12. f. 80. a. et t. 13. f. 100. a.*
*lineatas fistunt?*

ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 43. *f.* 29. 30.
ζ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 7.
η) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 6.
θ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 5?
ι) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 1. *f.* 3?
κ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 1. *f.* 4.
λ) *Gualt. teſt. t.* 21. *f.* D.
*Favann. Conch.* 2. *t.* 14. *f.* C1.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1299.
μ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1300.
*Habitat in* Oceano indico, *ſpira parum acuta.*

jaſpideus. 28. C. teſta ſubolivacea, punctis multifariis faſciaque obliqua albis.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 55. *f.* 612.
ε) *Muſ. Gottwald. t.* 13. *f.* 97. a.
*Habitat* - - - *teſta oblonga, parva.*

nebulosus. 29. C. teſta fuſca cæruleo nebuloſa alboque maculata.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* R.
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 74.
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kircher* 3. *f.* 126.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 16. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 68.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 55. *f.* 614.
*Habitat* - - - *teſta anguſta, ſpiram verſus convexiuſcula; an varietas minimi?*

oculatus. 30. C. teſta conica flava: ocellis faſciaque albis, baſi oblique ſtriata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 616.
*Habitat* - - - *ſpira parum prominente, an hujus tribus?*

coffeæ. 31. C. teſta brevi fuſca: faſciis duabus albis; ſpiræ propiore fuſco maculata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 618.

*Ha-*

*Habitat - - - testa mediae magnitudinis.*

Amadis. 32. C. testa dilute fusca : fascia lata cingulisque supra i fraque articulatis ; spira acuta coronata subtiliter transversim striata.
*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* S.
*Conch. t.* 1. *f.* 5.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 3 ?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 58. *f.* 642. 643.
*Favann. Conch. t.* 15. *f.* M.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1322. 1323.
*Habitat - - - testa nunc angustiori, nunc magis ventricosa.*

fulmineus. 33. C. spira acuta labioque spadiceo maculatis ; virgis spadiceis per totam testam decurrentibus, basi acuta oblique striata.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 58. *f.* 644.
*Habitat - - - an hujus tribus ?*

acachnoideus. 34. C. testa spadicco reticulata : fasciis duabus tribusve obscurioribus, spira coronata acuta.
*Argenv. zoomorph. t.* 10. *f.* T.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 4. *f.* 4.
*Spengl. selt. Conch. t.* 1. *f.* D.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 676.
*β) Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* c. d.
*Habitat pretiosus - - - an hujus tribus ?*

costatus. 35. C. testa fusca : fascia alba rebello undulata striis crassis latisque, spira noduloſa ; fascia granulata.
*Gualt. test. t.* 20. *f.* O.
*Habitat - - -*

leucostictus. 36. C. testa alba fusco nebulosa virgata & maculata : punctorum alborum & fuscorum seriebus pluribus, spira coronata.

*Lisk.*

*Liſt. Conch. t.* 759. *f.* 4. & *t.* 777. *f.* 24.
*Gualt. t.* 21. *f.* L.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 13. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 678.
α) *Martin. Naturg.* 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.
β) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* L ?
γ) *Gualt. teſt. t.* 21. *f.* M ?
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 36. 37.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1305.
*Habitat in* Oceano americano, *ſpira utplurimum acuta.*

citrinus. 37. C. teſta citrina lineis nigris interruptis inferne varia, ſpira coronata baſique albis.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 681.
*Habitat ad* Curacas.

inſularis. 38. C. teſta alba ſpadiceo nebuloſa maculata punctataque, ſpira acuta.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 683.
*Habitat* - - -

coronatus. 39. C. teſta cingulis articulatis maculisque teſſellatis alternis: ſpira coronata.
*Gualt. teſt. t.* 20. *f.* R.
*Valent. Abh. t.* 3. *f.* 24.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 134 ?
*Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 91. a ? b ? *f.* 92. b. *f.* 93. a. b. d. e.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 709.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 710.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1286.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 128. *t.* 1288.
*Habitat* - - - *teſta minuta varietate innumera, faſcia ſaepius alba.*

punctatus. 40. C. teſta faſciis duabus lineisque pluribus punctorum ex luteo fuſcorum: ſpira punctis lineisque luteis varia. *Knorr*

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 13. *f.* 6.
*Habitat - - - rarior.*

zeylanicus. 41. C. testa nivea roseo fuscoque nebulosa : cingulis pluribus articulatis maculisque albo spadiceoque variis, spira acuminata.
*Martin. neueſt. Manigfält.* 1. *p.* 445. *t.* 2. *f.* 20.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1318.
*Habitat - - - baſi oblique ſulcata.*

ſolidus. 69. C. testa conica crassa : transversim striata albo fuscoque nebulosa : fascia lata spiraque pyramidali albis ; anfractibus canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 59. *t.* 141. *f.* 1310.
*Habitat - - -*

*** elongati, *baſi rotundata, cylindro duplo longiore, quam ſpira.*

Clavus. 42. C. testa striis convexis lævibus : basi cæruleſcente.
*Liſt. Conch. t.* 744. *f.* 34.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 11. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 570.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1327.
*Habitat rariſſimus in* mari indico, *testa anguſta, longa, flava, maculis albis, majoribus ſpadiceis marginatis reticulata : faſciis 2 ſaturatioribus albo maculatis, ſpira maculata ſenſim in mucronem obtuſum deſinente.*

Nuſſatella. 43. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis scabra.
*Rumpf muſ. t.* 33. *f.* EE. Terebellum granulatum.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* L.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* P.
*Muſ. Gottwald. t.* 13. *f.* 96. a. b. c. & *t.* 43. *f.* 52. a. *Knorr*

*Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 7.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 567.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1329.
*Habitat rarior ad* Aſiæ inſulam Nuſſatello, *teſta pallida rubro nebuloſa maculataque, rarius tota alba, granulis ſtriarum tranſverſarum ex luteo fuſcis, ſpira in mucronem obtuſum abeunte.*

Terebellium. 44. C. teſta alba cæruleo obumbrata ſubcylindrica annulato-ſtriata: faſciis flavis.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 577.
ε) *Liſt. Conch. t.* 745. *f.* 36.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1330.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 1.
*Habitat in* mari indico.

Fuſus. 45. C. teſta fuſiformi alba tranſverſim ſtriata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 576.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* 2.
*Habitat - - - teſta* ε) *punctorum fuſcorum ordinibus varia.*

coccineus. 46. C. teſta rubra: lineis tranſverſis nigro punctatis, faſcia ſpiraque albis ſanguineo maculatis.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 24. *f.* 2.
*Habitat - - -* β) *faſciis* 2, *cingulisque pluribus articulatis albis.*

lætus. 47. C. teſta ſubcylindrica annulato coſtata rubra obſcurius nebuloſa albo faſciata: ſpira maculata.
*Liſt. Conch. t.* 760. *f.* 5.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
*Habitat - - - an ad granulatum ſpectat?*

ochroleucus. 48. C. teſta ſubcylindrica flava: faſcia prope baſin obliquе ſtriatam alba, ſpira acuminata virgatim maculata. *Mar-*

*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 573.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 12.
*Habitat* - - - *teſta in* ε) *flavo ſpadiceoque maculata : ſtriis rubro punctatis decuſſantibus varia.*

Lævis. 49. C. teſta rufa maculis ſtriisque tranſverſis fulcis varia : ſpira flavo maculata, baſi oblique ſtriata.
*Valent. Abh. t.* 8. *f.* 70.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 572.
*Habitat* - - -

affinis. 50. C. teſta ex cæruleſcente alba : faſciis quatuor fulveſcente lineatis ; punctis liturisve obſcure purpureis intermediis.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 52. *f.* 571,
ε) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 11. *p.* 140.
*Habitat* - - - *araufiaco affinis , ſpira maculata maculis in* ε) *virgatis.*

violaceus. 51. C. teſta alba violaceo nebuloſa : faſciis violaceis , radiis dilute fuſcis.
*Martin. neueſt. Manigf.* 1. *p.* 444. *t.* 2. *f.* 18. 19.
*Habitat* - - - *ſpira pyramidali anfractuum* 6.

granulatus. 52. C. teſta ſcabra inermis ſtriis fulcatis lævibus.
*Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 170. *
*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* T. Voluta granulata.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* H.
*Pet. aquat. t.* 15. *f.* 1.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
*Liſt. Conch. t.* 763. *f.* 12 ? *t.* 760. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 632 ? *t.* 52. *f.* 574. 575.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26.
*Habitat in Oceano africano , teſta laetius rubra & magis fulcata , quam congenerum : faſciis albis , ſtriarumque punctis purpureis.*

polyzonias. 53. C. teſta intus alba , extrinſecus ex fuſco lutea

tea lineis granulorum subtiliſſimis aſpera, faſcia ad ſpiram alba, inferius denticulata, altera ad baſin dilutius tincta pluribusque filiformibus.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. f. 13.*
*Habitat - - - ſpira complanata: virgis ſpadiceis varia, baſi exterius obſcura, intus violacea; an bujus tribus?*

bifaſciatus. 54. C. teſta alba lineis angulatis ſpadiceis faſciisque duabus aurantiis varia: ſpira prominula, baſi lineis aurantiis cincta: maculis teſſellatis intermediis.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 10.*
*Habitat - - -*

niveus. 55. C. teſta conica nivea: ſpira prominula coronata, apertura ampla.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 9.*
*Habitat - - - an bujus tribus?*

araufiacus. 56. C. teſta incornata lævi: faſciis albidis, anfractuum ſummis canaliculatis.
*Rumpf muſ. t. 34. f.* A. Oranjen Admiraal.
*Valent. Alb. t. 12. f. 100.*
*Pet. amb. t. 7. f. 7.*
*Argenv. zoomorph. t. 10. f.* I.
*Seb. muſ. 3. t. 48. f. 7.*
*Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 3. & 5. t. 24. f. 1.*
*Spengl. ſelt. Conch. t. 2. f.* E.
*Martin. Conch. 2. t. 57. f. 636. 637.*
ε) *Chemn. Conch. 10. t. 144.* A. *f.* 1.
*Habitat rarus in* India, *teſta alba; faſciis 2-3 aurantiis lineisque albis: maculis teſſellatis pullis, ſpira maculis oblongis rubris, albis fuſcisque varia.*

Magus. 57. C. teſta ſubcylindrica: faſciis longitudinalibus albo-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr. 560. n. 171.**

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* Q. Voluta maculoſa.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 362 ?
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 355.
*Gualt. teſt. t.* 20. *f.* F ?
*Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 27.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 5 ? & *t.* 1. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 58. *f.* 641.
*Habitat in* India, *teſta alba, lineis punctatis maculisque oblongis ſpadiceis luteis, flavis, fuſcis varia, ſpira acuta maculata.*

ſtriatus. 58. C. teſta ovato-oblonga gibba nebuloſa: ſtriis tenuiſſimis parallelis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *p.* 172.
*Rumpf muſ. t.* 31. *f.* F. Voluta tigerina.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 2. Melar.
*Liſt. Conch. t.* 755. *f.* 7. & *t.* 760. *f.* 6.
*Gualt. teſt. t.* 26. *f.* D.
*Valent. Abh. t.* 7. *f.* 60. 61.
*Pet. gaz. t.* 98. *f.* 9.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 5-9. & *t.* 47. *f.* 22. 23.
*Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 83. a-g.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 18. *f.* 1. & 3. *t.* 12. *f.* 5. *t.* 21. *f.* 1. & *t.* 22. *f.* 4.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 13.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 64. *f* 714-716.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1311.
*Habitat ad* Africæ *littus occidentale frequens, teſta ad* 4 *pollices longa, nivea, ſtriis interdum rubellis aut flaveſcentibus, baſi emarginata, transverſe ſtriata.*

Textile. 59. C. teſta venis reticulatis luteis: maculis luteis fuſcisque. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *n.* 173. *
*Conch. t.* 13. *f.* F. I. Pannus aureus.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 7. Loman. *Liſt.*

*Liſt. Conch. t.* 788. *f.* 40.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 135.
*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* O. P.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* I. AA.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 43. *f.* 6-12. *& t.* 47. *f.* 13-17.
*Olear. muſ. t.* 31. *f.* 1. 3.
*Muſ. Gottwald. t.* 13. *f.* 85. a. b. c. *f.* 94. a. b. d-h. *& f.* 95. *α. β.*
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 18. *f.* 6. *&* 2. *t.* 8. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 6. *f.* 62.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 598-600.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 602.
*Chemn. Beſch. berl. naturf. Geſ.* 3. *t.* 8. *f.* A. *Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1324. 1325.
*ε) Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. a.
*γ) Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. b. c.
*Habitat ad* Bandam Aſiæ, *teſta alba, in γ) perſici florum colore tincta, faſciis tribus aurantiis, in in β) faſciis* 2 *obſcurioribus varia.*

aulicus. 60. C. teſta venis reticulatis faſciisque longitudinalibus fuſcis interruptis. *Muſ. Lud. Ulr.* 562. *n.* 174. *
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* D. G. Nigella.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 133.
*Rumpf muſ. t.* 33. *f.* 3. 4.
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 75.
*Gualt. teſt. t.* 25. *f.* V. X. Z.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 43. *f.* 1-5. *& t.* 47. *f.* 10-12.
*Olear. muſ. t.* 31. *f.* 4. 5.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 1-3. *&* 3. *t.* 19. *f.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 8. *f.* 25.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 7. *f.* 14.
*Favann Conch.* 2. *t.* 18. *f.* C⁶. C⁷.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1328.
*α) Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 591. 593. 594.
*β) Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 592. 595. *t.* 54. *f.* 596.

*γ)*

γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 597.
δ) testa ex luteo fusca : maculis reticulatis cordatis perpendicularibus.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 601.
*Seb. mus.* 3. *t.* 47. *f.* 3 ?
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 18. *f.* 2.
*Habitat in* Asia, *an specie distinctus a textili.*

Thomæ. 70. C. testa lævi alba characteribus punctisque seriatis badiis, cingulis tribus maculisque albis varia apice rubicunda, spira conica : anfractibus canalicularis.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 590.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 2.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1282. 1283.
*Habitat in* mari indico.

**** *testa medio ventricosa, utrinque angustata.*

sinensis. 61. C. testa medio ventricosa flava : ocellis albis, basi transversim striata.
*Regens. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 66.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 615.
*Habitat* - - -

***** Laxi *ventricosi in dorsum disjecti super mensam tinnitantes.*

Spectrum. 62. C. testa cærulescente flava nebulosa : punctis striisque albo-luteis. *Mus. Lud. Ulr.* 562. *n.* 175. *
*Rumpf mus. t.* 32. *f.* S. Voluta spectrorum.
*List. Conch. t.* 783. *f.* 30.
*Valent. Abh. t.* 5. *f.* 39.
*Gualt. test. t.* 25. *f.* S.
*Seb. mus.* 3. *t.* 47. *f.* 24.
*Mus. Gottwald. t.* 14. *f.* 101. f? *t.* 12. *f.* 84. a-d. & *f.* 85. a. d.

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 2. *t.* 8. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 581-583.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1304.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* g. h.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* o. p.
θ) *Kaemm. Cab. Rudolft. p.* 79. *n.* 18. *t.* 6. *f.* 2?
*Habitat in* Oceano Aſiæ auſtrali *rarior*, *ſpira ſatis acuta.*

bullatus. 63. C. teſta flava albo nebuloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 563. *n.* 176. *
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Potan.
*Liſt. Conch. t.* 741. *f.* 37. *t.* 742. *f.* 38. *t.* 748. *f.* 42. 43. & *t.* 749. *f.* 44. 45.
*Gualt. teſt. t.* 26. *f.* C.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* H.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 14. 15. & *t.* 43. *f.* 15. 16.
*Muſ. Gottwald. t.* 10. *f.* 65. a-f. & *t.* 66. a. b.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 8. *f.* 2. 3. & *t.* 11. *f.* 4.
*Regenf. Conch.* 2. *t.* 11. *f.* 45.
*Favann. Conch.* 2. *t.* 18. *f.* C[8].
*Martini Conch.* 2. *t.* 65. *f.* 725-732.
*Schroet. inn. Beu. Conch. t.* 4. *f.* 1.
*u. Litterat.* 3. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 10. 11.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1315. 1316.
*Habitat* - - - *teſta tenui, nunc unicolore, frequentius maculata, nebuloſa, faſciata, nunc magis nunc minus ventricoſa, apertura utplurimum ampla, caeruleſcente, ſpira nunc plana, nunc acuta.*

Tulipa. 64. C. teſta oblonga gibba lævi: apertura dehiſcente.
*Agenv. Conch. t.* 13. *f.* B. Tulipa.
*Liſt. Conch. t.* 764. *f.* 13.
*Bonann. muſ. Kircher* 3. *f.* 411.
*Rumpf muſ. t.* 34. *f.* K.
*Valent. Abh. t.* 10. *f.* 89.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 16-21. *t.* 43. *f.* 20. 21. 22. 36?

*Knorr Vergn.* 3. *t.* 11. *f.* 4. & 5. *t.* 20. *f.* 1. 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 20.
*Martini Conch.* 2. *t.* 64. 65. *f.* 718-721.
*Habitat in* India, Africa & *meridionali* America, *geographo affinis, at teſta non coronata, alba hinc inde caeruleſcente fuſco, luteo rubroque nebulaſa, lineisque ſpadiceis interruptis picta, apertura caeruleſcente, baſi obſolete oblique ſtriata, ſpira acuta, laevi, maculata, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata.*

Geographus. 65. C. teſta oblonga gibba coronata, apertura dehiſcente.
*Rumpf muſ. t.* 31. *f.* G. Nubecula.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* A. Textile fericum.
*Klein oſtr. t.* 5. *f.* 90. Nubecula, tulipa gallorum.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 6. *f.* 8. Salar.
*Leſſ. Conch. t.* 747. *f.* 41.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 319.
*Gualt. teſt. t.* 26. *f.* E.
*Pet. gaz. t.* 98. *f.* 8.
*Seb. muſ. t.* 42. *f.* 1. 4.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 21. *f.* 2. & 6. *t.* 17. *f.* 3.
*Muſ Gottwald. t.* 12. *f.* 85. 1.
*Martini Conch.* 2. *t.* 64. *f.* 717.
*Habitat rarior in* Oceano indico & africano, *teſta ſubcylindrica ad baſin rugoſam paulo anguſtiore, pellucida, alba, fuſco maculata nebuloſaque, apertura alba, ſpira interdum roſea.*

Nubecula. 66. C. teſta alba aurantio nebuloſa & maculata; punctis ſparſis albis, ſpira prominente acuta.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 14. 15.
*Martini Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 622.
ε) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* H.
*Habitat* - - -

ſpurius. 67. C. teſta alba: macularum ſpadicearum aut nig-

nigrarum irregularium seriebus fasciisque punctatis interruptis alternis.
*Gualt. test. t.* 21. *f.* D. F.
*Argenv. Conch. t.* 12. *f.* C.
*Seb. mus.* 3. *t.* 44. *f.* 24. 25. 28. & *t.* 46. *f.* 24-29.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 18. *f.* 5. & 5. *t.* 9. *f.* 6. & *t.* 22. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 56. *f.* 626-628.
*Habitat* - - - -

Vexillum. 68. C. testa fusca albo obumbrata : fascia alba interrupta.
*Rumpf mus. t.* 31. *f.* S.
*Gualt. test. t.* 20. *f.* M. & *t.* 21. *f.* E.
*Seb. mus.* 3. *t.* 44. *f.* 8-11. & *t.* 45. *f.* 16. 17.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 57. *f.* 629.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* m. n.
*Habitat* - - - *testa interdum satis magna, fasciis nonnunquam cruciata.*

Ventricolus. 71. C. testa fusca albo fasciata inferne angustata cæruleascente obumbrata lævi, spira conica exserta. *Kaemm. Cab. Rudolst. p.* 91. *n.* 46. *t.* 6. *f.* 3. 4.
*Habitat* - - - -

320. CYPRÆA. *Animal* Limax.
*Testa* univalvis, involuta, subovata, obtusa, lævis.
*Apertura* utrinque effusa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

Exanthema. 1. C. testa subturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis adspersa : linea longitudinali subramosa.
*List. Conch. t.* 698. *f.* 45. & *t.* 699. *f.* 46.

*Bonann. recr.* 3. *f.* 257.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 256.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* O.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 6.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 4. 5. 16. 18.
*Muſ. Gottwald. t.* 3. *f.* 14? & *t.* 14. *f.* a. b. c. d. e. f.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 6. *f.* 63. & *t.* 10. *f.* 38.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 289. *t.* 29. *f.* 298-300.
β) *Liſt. Conch. t.* 697. *f.* 44.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 145. *f.* 1343.
*Habitat in* Oceano americano, atlantico, *mappæ affinis, teſta ſubtus pallida immaculata, dentibus aperturae fuſcis, ſupra oculis guttisve pallidis, nunc majoribus, nunc minoribus, detrita fuſca fasciata aut teſſellata, aut caerulea.*

Mappa. 2. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta linea longitudinali ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 565. *n.* 179.
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* B. Porcellana montoſa.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* B. Carte geographique.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 3. 13.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 6.
*amb. aq. t.* 16. *f.* 2.
*Knorr delic. t.* B. IV. *f.* 5.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 26. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 25. *f.* 245. 246.
*Habitat in* Oceano indico & africano, *rarior teſta breviore, ventricoſa ad latera laevi, pallida immaculata ab exanthemate diſcernenda; teſta fuſca ex fuſco lutea, hinc inde ocellis albis varia, ſubtus laevi ſubincarnata: maculis dilute fuſcis, aperturae dentibus flavis.*

arabica. 3. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta macula longitudinali ſimplici. *Muſ. Lud. Ulr.* 566. *n.* 180. *

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* M. Porcellana literata ſ. arabica.
*Barrel. rar. t.* 1325. *f.* 20.
*Liſt. Conch. t.* 658. *f.* 3.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* V.
*Lochn. muſ. Besler. t.* 21. *f.* 8.
*Muſ. Gottwald. t.* 2. *f.* 7. a-d. & *f.* 8. b.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 2. & *t.* 12. *f.* 2. & 6. *t.* 20. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 328-330.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 3. *f.* 5.
ε) *Liſt. Conch. t.* 659. *f.* 3. a.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 260.
*Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 259.
*Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* I.
*Muſ. Gottwald. t.* 2. *f.* 8. a.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 331.
ϛ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 304.
*Habitat in* India, *teſta ad* 3 *pollices longa, ſupra albida aut caerulescente, ad latera incraſſata fuſco aut atro maculata, intus violacea, aperturae labiis planis ex rubello cinereis; detrita teſta nunc caerulescente fuſco faſciata, nunc badia hinc inde albido nebulosa, nunc dilutius tincta: maculis virgatis lineisque angularibus obſcurioribus, nunc fuſca violaceo miſta, nunc ex caerulescente rubella caeruleo miſta, nunc alba caeruleo obumbrata.*

Argus. 4. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica adſperſa ocellis, ſubtus maculis quatuor fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 181. *
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* D. Argus.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* D. Argus magnus.
*Liſt. Conch. t.* 705. *f.* 54.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 263.
*Barrel. rar. t.* 1325. *f.* 25.

*Pet*

*Pet. gaz. t.* 97. *f.* 6.
*Valent. Abh. t.* 10. *f.* 86.
*Gualt. test. t.* 16. *f.* T.
*Klein ostr. t.* 6. *f.* 101.
*Lesser testaceoth. f.* 28.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 11. *f.* 5.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 57.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 285. 286.
ε) *Favann. Cat. rais. t.* 2.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 145. *f.* 1344. 1345.
*Habitat in* Oceano indico & atlantico, *testa ad* [illegible] *pollices longa, angusta, supra grisea aut flavescente: fasciis tribus fuscis, ocellis rarius concatenatis, maculis subtus sinistris majoribus, labiis stramineis, dentibus fuscis.*

testudinaria. 5. C. testa obtusa subcylindrica: extremitatibus depressis. *Mus. Lud. Ulr.* 567. *n.* 182. *
*Rumpf mus. t.* 38. *f.* C. Testudinaria.
*Pet. amb. aq. t.* 8. *f.* 7.
*List. Conch. t.* 689. *f.* 36.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 27. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 271. 272.
ε) *List. Conch. t.* 748. *f.* 42. 43. Larva?
*Habitat in* sinu persico & Oceano indico, *testa quam congenerum omnium, majore, exalbida, pullo nebulosa, maculis hinc inde magnis nigris quasi farina conspersis interdum quoque albis.*

stercoraria. 6. C. testa subturbinata gibba livido testaceoque maculata utrinque marginata subtus plana.
*List. Conch. t.* 687. *f.* 34?
*Gualt. test. t.* 15. *f.* T?
*Column. aq. t.* 69. *f.* 1. 2.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 7. 8.
*Barrel. ic. t.* 1321. *f.* 23. & *t.* 1322. *f.* 4.
*Mus. Gottwald. t.* 3. *f.* 10. a. b.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 13. *f.* 1.

*Adans.*

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 1. A.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 5.
α) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* L ?
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. *f.* 1332.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. *f.* 1333.
*Habitat frequens ad* Guineam, *teſta ſubovata undato glauca, anterius juxta ſpiram macula fuſca, poſterius depreſſe marginata deflexa, labro interiore poſterius valde retuſo, apertura anterius valde gibba, dentibus albis, ſulcis intermediis fuſcis; teſta ſub epidermide nunc ex viridescente caerulea hinc inde maculata, nunc faſciis translucentibus ornata, nunc maculis fuſcis faſciaque caerulea varia, nunc viridescente: faſciis 5-6 fuſcis aut faſciis 2 rectis, 2 undulatis, aut altero latere livida, altero viridescente, aut nigra: maculis 2 albis, aut caerulea maculis hinc inde rubellis, aut dilute caerulea rubedine translucente varia.*

Carneola. 7. C. teſta ſubturbinata pallida: faſciis incarnatis, ore violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 183. *
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* K. Carneola.
*Pet. gaz. t.* 30. *f.* 8.
*Liſt. Conch. t.* 665. *f.* 9 ?
*Gualt. teſt. t.* 13. *f.* H.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* O.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 16. a ? b ?
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 4.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 8. *f.* 2.
*Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 14.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 287. 288.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 23 ?
*Habitat in* Oceano Aſiæ auſtrali, *teſta tenui, anguſta,* 2½ *pollices longa, intus ſubtusque alba, exterius & ſupra interdum cinerea: faſciis fuſcis.*

Zebra. 8. C. teſta turbinata cinerea: faſciis fuſcis.
*Liſt. Conch. t.* 669. *f.* 15.

*Bo-*

*Bonann. recr.* 3. *f.* 266.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 265.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* G.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 101. *t.* 1. *f.* 6.
*Habitat rarior in* India, *carneolae affinis, at teſta duplo majore, ſpira magis prominente, ſubtus ocellis obſoletis dentibusque aperturae fuſcis diſtincta.*

Talpa. 9. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica teſtacea; faſciis pallidis, ſubtus incraſſata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 184. *
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* H. Talpa.
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* I. Talpa.
*Pet. amb. aq. t.* 16. *f.* 1.
*Valent. Abh. t.* 2. *f.* 13 ?
*Barrel. rar. t.* 1325. *f.* 19.
*Liſt. Conch. t.* 668. *f.* 14.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* N.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 23. a ?
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 27. *f.* 2. 3.
*Regenf. Concl.* 1. *t.* 10. *f.* 37.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 273. 274.
*Habitat in* India, *teſta ad* 3 *pollices longa nitidiſſima, ſupra nunc hepatica, nunc cinerea, nunc albida, frequentiſſime ex fuſco lutea: faſciis* 3 *diluvioribus, intus alba, dentibus infra fuſcis: interſtitiis canis.*

amethyſtea. 10. C. teſta ſubturbinata: lateribus gibbis coronatis, dorſo violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 185. *
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* Q. Achatina.
*Pet. gaz. t.* 32. *f.* 10.
*Liſt. Conch. t.* 662. *f.* 6.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 32.
*Muſ. Gottwald. t.* 3. *f.* 13. a. b. *t.* 5. *f.* 18. c. & *t.* 7. *f.* 33. h.

Knorr

*Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 25. *f.* 247-249.
*e) Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 24?
*Habitat in* Madagaſcar, *teſta tenui, faſciis ſupra* 4 *fuſceſcentibus nebuloſis, ad alterutrum latus characteribus exornata, intus caerulea, ampliore, quam in Zebra, ſpiraque minus prominente.*

lurida. 11. C. teſta ſubturbinata lurida ſubfaſciata: extremitatibus luteis nigro bimaculatis.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* C. Souris.
*Liſt. Conch. t.* 671. *f.* 17. & *t.* 673. *f.* 19.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 251.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 250.
*Gualt. teſt. t.* 13. *f.* E. I.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 16. c.
*Adanſ. Senez.* 1. *t.* 5. *f.* 1. D.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 315.
*Habitat in* mari mediterraneo, americano, *frequentius in* atlantico & æthiopico, *teſta ad* 2 *pollices longa, elongata anguſta, ſubtus alba, ſupra nunc murina obſcurius faſciata, nunc vireſcente aut rubella: faſciis caeruleſcentibus, nunc ſubfuſca: faſciis rubellis, & anfractuum margine interdum nigro, nunc dilutius fuſca: faſciis exalbidis, nunc badia: faſciis obſoletis, aut caeruleſcentibus, nunc ex fuſco lutea, nunc lata hinc inde albo nebuloſa, nunc ſpadicea: faſcia flava, alteraque alba.*

Venelli. 12. C. teſta ſubturbinata maculata punctis luteſcentibus; extremitatibus fuſco maculatis, fauce rufa. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 186. *
*Pet. gaz. t.* 95. *f.* 13.
*Habitat* - - - -

lota. 13. C. teſta ſubturbinata alba: denticulis ſubulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 187. *

*Bo-*

*Bonann. recr.* 3. *f.* 245.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 244.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 20. a. b. c.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 4. 5.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 322.
β) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* C?
*Habitat in* mari ſiculo, *teſta lacteа nitidiſſima, translucente inter dentes ſiniſtri labii rubore.*

fragilis. 14. C. teſta turbinata ovata glauca teſtaceo-undata ſubfaſciata. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 188.
*Rondel. aq.* 2. *p.* 102.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* Q.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſtae ſtructura arabicae, at magis tenui undis longitudinalibus faſciisque pallidis, ab amethyſtea colore potius in cinereum vergente, diſcernenda.*

guttata. 15. C. teſta tenui gibba fulva albo-guttata: linea media horizontali, ſubtus alba: dentibus flavis.
*Liſt. Conch. t.* 676. *f.* 23.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* I.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 25. *f.* 252. 253.
*Habitat* - - - -

cinerea. 16. C. teſta tenui ventricoſa ex rubello cinerea: faſciis dilutioribus, ore albo.
*Liſt. Conch. t.* 667. *f.* 11. *t.* 668. *f.* 13. a. b. & *t.* 670. *f.* 16.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* H. L. M.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 25. *f.* 254. 255.
*Habitat* - - - *teſta brevi, faſcia* 1-4.

plumbea. 17. C. teſta ſubturbinata tenui; dorſo plumbeo; faſciis quatuor cæruleo fuſcoque variis fuſcescente undulatis ad marginem cæruleo fuſcoque lineatis.

*Mar-*

*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 256.
*Habitat rarior ad* Guineam, *exanthemati affinis.*

oculata. 18. C. testa subturbinata pulla albo ocellata: dorso fulciis tribus pallidioribus.
*Mant.* 2. *p.* 546. Cypræa Cervus ?
*List. Conch. t.* 697. *f.* 44.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 267.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 266.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 5. *f.* 3. 4.
*Martin Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 257. 258.
ε) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 83.
ζ) *Seb. mus.* 3. *t.* 76. *f.* 20.
*Habitat in* Oceano americano, *testa satis grandi, coffeae colore tincta.*

Histrio. 120. C. testa ovata subturbinata sublivido ocellata, subtus plana alba, ad latera incrassata atra fusco maculata, linea dorsali livida, fauce violacea.
*Chemn. Conch.* 10. *p.* 110. *t.* 145. *f.* 1346. 1347.
*List. Conch. t.* 659. *f.* 32.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
*Martyn Conchol. t.* 15.
*Habitat in* mari indico.

Aurantium. 121. C. testa subturbinata aurantia margine alba immaculata, fauce rutila. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 59..
*Habitat ad* insulas amicas.

ferrugi-nosa. 19. C. testa tenui elongata flavescente aut caerulescente: maculis ferrugineis, intus caerulea.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 260-262.
*Habitat* - - - *testa detrita caerulea.*

livida. 20. C. testa tenui elongata unicolore straminea, lutea aut rubella, subtus fusco punctata, dentibus subulatis. *List.*

*Liſt. Conch. t.* 656. *f.* 1.
*Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 405.
*Habitat* - - - -

gibba. 21. C. teſta tenui gibba : dorſo nebuloſo transverſim faſciato.
*Liſt. Conch. t.* 663. *f.* 7.
*Habitat* - - - *amethyſtinae affinis.*

turbinata. 22. C. teſta turbinata ovata glauca : maculis angulatis pallidis. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 6.
ε) *Liſt. Conch. t.* 675. *f.* 22.
*Habitat* - - - *fragili affinis*, ε) *teſta fuſca liſſaſciata.*

venerea. 23. C. teſta oblonga fuſca : maculis aureis virgatis, intus cærulea.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 262.
*Habitat* - - - *bullis affinis.*

purpurascens. 24. C. teſta oblonga purpuraſcente : ſubtus linea alba cincta.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* A,
ε) *Gualt. teſt. t.* 16. *f.* B.
*Habitat* - - - -

albida. 25. C. teſta oblonga albida : labiorum fine fulvo-maculato.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* C.
*Habitat* - - - -

rufescens. 26. C. teſta oblongo ex fuſco rufeſcente, ſubtus albida.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* D.
*Habitat* - - - *teſta* 1¼ *pollicis longa.*

translucens. 27. C. teſta cylindrica cinerea : faſciis translucentibus. *Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* G.
*Habitat* - - - -

punctulata. 28. C. teſta cylindrica fragili alba : faſciis punctorum rubellorum transverſis.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* P.
ε) *Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 23. e.
*Habitat* - - - -

tigrina. 29. C. teſta obtuſa ovata ſubturbinata ; linea longitudinali teſtacea.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 12.
*Habitat* - - - *C. tigridi affinis, at ſpira manifeſta guttisque longe rarioribus diſtincta.*

dubia. 30. C. teſta oblonga ferruginea : faſciis dilutioribus.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 15.
*Habitat* - - - *C. Exanthemati affinis.*

trifaſciata. 31. C. teſta turbinata tenui ex cæruleſcente fuſca : utroque fine faſciisque tribus flaveſcentibus fuſco variis.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 2.
*Habitat* - - - *pretioſa, rara.*

con-.

---

*An diſtinctæ hujus primæ tribus ſpecies ſunt* cypræa *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 22. 26-29. 31. *a* Lyſtero *Conch. t.* 656. *f.* 1. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 415. *ac diſtinctæ ſpecies in muſ. Gottwald. t.* 4. *f.* 14. g. *t.* 5. *f.* 16. d. *t.* 7. *f.* 37. b. d. *f.* 17. a-e. *f.* 18. g. h. *f.* 19. d. e. *f.* k. *f.* 20. d. *f.* 21. d. b. *f.* 22. d. e. h. *t.* 8. *f.* 23. b. c. *f.* 24. a b. *t.* 7. *f.* 32. b. *f.* 33. m. *f.* 35. a-c. *f.* 38. *f.* 39 *f.* 40. b. e. *&* *f.* 41. a. b. *delineatæ? cui tribui aeconſonde ſunt ſpecies ab* Argenville *conchyl. t.* 18. *f.* 2 *a* Gualtiero *teſt. t.* 15. *f.* G. *t.* 16. *f.* D. F. G. Q. V. X. Z. *a* Lyſtero *t.* 710. *f.* 62. *et t.* 655. *f.* 32. *et a* Knorr. *Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 6. *depictæ? An propriam conſtituit tribum* cypræa oblonga alba teſt. *t.* 13. *f.* C. *a* Gualtiero *adumbrata? Cyprææ non ex mari extractæ nitore et colorum elegantia utpluriumum praeeminent, deinde fugax, aliisque artibus nativa varietate aucta in muſeis aſſervatæ, et in catalogis memoratæ.*

conſpurcata. 32. C. teſta turbinata ex cæruleſcente alba fuſco guttata nebuloſaque.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 1.* Cypræa ſtercoraria.
*Habitat - - - ſtercorariae affinis.*

bifaſciata. 33. C. teſta oblonga purpuraſcente obumbrata: faſcia ſtraminea alteraque anguſtiore alba, limboque fuſco.
*v. Born muſ. Caeſ Vindob. teſt. t. 8. f. 3.* Cypræa Zebra.
*Habitat - - - teſta 4 fere pollices longa.*

cylindrica. 34. C. teſta cylindrica ſupra dilute amethyſtina ad latera fuſceſcenti maculata; ad utrumque finem maculis duabus fuſcis.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 10.*
*Habitat rarior - - - labiis albis, faſciis dorſi interdum 3 ſubfuſcis.*

teres. 35. C. teſta cylindrica lactea altero latere limbata lituriſque anguſtis luteis rarioribus varia: dorſo faſciis undatis tribus fuſceſcentibus.
*Schroet Einl. in Conch. 1. p. 161. t. 1. f. 7.*
*Habitat - - - -*

ovata. 36. C. teſta ovata depreſſiuſcula altero latere ſublimbata: dorſo albido confertim ex luteo fuſco punctato & undulato: faſciis tribus obſcurioribus obſoletis.
*Schroet Einl. in Conch. 1. p. 165 n. 120.*
*Habitat - - - teſta tenuiſſima fragili, anguſta, ½ lata, ſubtus & ad latera alba, 1½ pollices longa, ¾ lata, lineis 2 infra ſpiram fuſcis, dentibus alterius ſubulatis.*

minuta. 37. C. teſta oblonga unicolore perſici florum colore tincta ſubtus albo punctulata: limbo alterius

rius lateris dentibusque labii albis, utroque fine supra flavo, spiræ apice nigro.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 165. *n.* 121.
*Habitat* - - - -

sanguinolenta. 38. C. testa tenui oblonga fusco-fasciata, ad latera sanguineo-punctata.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 234.
*Muſ. Gottwald. t.* 4. *f.* 14. g. 3. & *t.* 6. *f.* 23. d.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 265. 266.
*Habitat* - - - -

faſciata. 116. C. testa turbinata glauca marginata supra gibba: faſciis fuscescentibus transversis, fauce glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 100. *t.* 144. *f.* 1334.
*Habitat ad* Guineæ littora.

Regina. 117. C. testa gibba ex glauco fusca, maculis trigonis testaceis albidisque faſciisque tribus transversis picta, fauce nigro-glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 101. *t.* 144. *f.* 1335. 1336.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *ſer.* 5. *n.* 3.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 6.
*Mart. Conch.* 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
*Habitat* - - - -

undulata. 118. C. testa turbinata fusceſcente undulata ochroleuco-nebuloſa: faſciis saturatioribs. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 102. *t.* 144. *f.* 1337.
*Habitat rara ad* insulam S. Mauritii.

** *obtuſae absque ſpira manifeſta.*

Caput ſerpentis. 39. C. testa triquetro gibba posterius obtusiuscula.
*Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 189. *
*Liſt. Conch. t.* 702. *f.* 50. Concha veneris maculis quaſi reticulatis.
*Rumpf. muſ. t.* 38. *f.* F. Caput ſerpentis minus.

*Bi-*

*Bonann. recr.* 3. *f.* 258.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 257.
*Rondel. aq.* 2. *p.* 103. *f.* 3.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 9.
*amb. aq. t.* 12. *f.* 7.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* I. O.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 31. a. d. *& f.* 32. a.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 316.
*Habitat frequens ad* inſulam Mauritii, Lauriqué & Nuſſatelo, *teſta ad* 1½ *pollicem longa, fuſca, albo maculata, ſubtus alba, intus violacea.*

Reticulum. 40. C. teſta ſubrotunda gibba fuſca: ocellis in reticulum confluentibus, lineaque dorſi media horizontali albis, ſubtus alba.
*Liſt. Conch. t.* 701. *f.* 49.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 259.
β) *Liſt. Conch. t.* 704. *f.* 53.
*Habitat - - - capiti ſerpentis affinis.*

mauritiana. 41. C. teſta triquetro-gibba poſterius deprelſo acuta, ſubtus nigra. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 190.*
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* E. Caput ſerpentis majus.
*Valent. Abh. t.* 4. *f.* 31.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 8.
*Liſt. Conch. t.* 703. *f.* 52.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 261.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* S.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 19.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 29. a. b. *f.* 30. a. b. *t.* [illegible] *f.* 34.?
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 13. *f.* 1. 2. 2. *t.* 27. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 317-319.
*Habitat ad* inſulam S. Mauritii, Javam & Nuſſatello, *teſta ſatis magna, fuſca maculata.*

Vi

Vitellus. 42. C. testa livida : maculis albis. *Mus. Lud. Ulr.* 572. *n.* 191. *

*Rumpf mus. p.* 115. *t.* 38. *f.* L. Porcellana salita.
*Pet. gaz. t.* 80. *f.* 2.
*List. Conch. t.* 692. 693. *f.* 39. 40.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 254.
*Gualt. test. t.* 13. *f.* T. V.
*Mus. Gottwald. t.* 2. *f.* 9. a. d.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 20. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 228. 229.
*Habitat in* Oceano indico, *testa ad* 2½ *pollices longa subvitellina, fasciis* 3 *obsoletis translucentibus, maculis rotundis, intus caerulea, ad latera cinereo punctata maculataque.*

Mus. 43. C. testa retusa gibba cinerea : fascia longitudinali fusca, denticulis nigricantibus. *Mus. Lud. Ulr.* 572. *n.* 192. *

*List. Conch. t.* 657. *f.* 2.
*Rumpf mus. t.* 39. *f.* S.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* E.
*Seb. mus.* 3. *t.* 76. *f.* 33. 34.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 12. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 222. 223.
*Habitat in* mari mediterraneo & americano, *testa solida, vix gibba, ad latera subtusque alba, dorsi maculis dilute fuscis.*

Tigris. 44. C. testa ovata posterius obtusa anterius rotundata : linea longitudinali testacea. *Mus. Lud. Ulr.* 573. *n.* 193. *

*Rumpf mus. t.* 38. *f.* A. Porcellana guttata.
*Pet. gaz. t.* 96. *f.* 17.
*Barrel. rar. t.* 1325. *f.* 23. & *t.* 1326. *f.* 4.
*List. Conch. t.* 681. 682. *f.* 28. 29.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 231. 232. 256. 264. 265.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 231. 232. 255. 264. 265.

*Valent. Abh. t.* 1. *f.* 3. & *t.* 3. *f.* 29.
*Gualt. test. t.* 14. *f.* G. H. I. L.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* F.
*Seb. mus.* 3. *t.* 76. *f.* 7. 9. 14.
*Olear. mus. t.* 30. *f.* 3.
*Bytem. app. t.* 12. *f.* 55. a.
*Mus. Gottwald. t.* 1. *f.* a. b. *f.* 2. a. b. *f.* 3. a. *f.* 4. *t.* 1. *f.* C. *t.* 2. *f.* 6. a. c. d.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 26. *f.* 4. & 6. *t.* 21. *f.* 4. 5.
*v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t.* 8. *f.* 7.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 232-236.
*Habitat frequens in* Oceano indico & mari adriatico, *testa ad* 4½ *pollices longa*, & 2½ *alta alvidus flavicante aut caerulescente, guttis numerosis saepius confluentibus varia, ad latera subtusque alba, linea dorsi obliqua, crebro undulata, Cairi ad laevigandos pannos adhibita.*

flammea. 45. C. testa ovata posterius obtusa anterius rotundata maculis flavis undatis varia.
*Valent. Abh. t.* 4. *f.* 30.
*Habitat rarissima - - - tigridi proxime affinis.*

olivacea. 46. C. testa ovata olivacea flavo nebulosa fuscoque maculata, subtus plana dilute fusca, intus cærulescente, labii denticulis albis.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 332.
*Habitat - - - tigridi affinis, at testa minore, mediae magnitudinis.*

feminea. 47. C. testa ovata tenuissima alba guttis ex viridi flavis seriatis varia, intus violacea.
*List. Conch. t.* 672. *f.* 18.
*Gualt. test. t.* 16. *f.* S.
*Seb. mus.* 3. *t.* 76. *f.* 1. 2. 8.
*Mus. Gottwald. t.* 3. *f.* 11. a. b. & *f.* 12.
*Habitat - - - tigridi affinis.*

Lynx.

Lynx. 48. C. testa oblongo ovata, punctis fuscis lineaque flavescente, posterius acutiuscula: ore rufo. *Mus. Lud. Ulr.* 573. *n.* 194. *
*List. Conch. t.* 683. *f.* 30.
*Rumpf mus. t.* 38. *f.* N.
*Pet. gaz. t.* 97. *f.* 17.
*Gualt. test. t.* 13. *f.* Z. & *t.* 14. *f.* B. C. D.
*Seb. mus.* 3. *t.* 55. *ic. nonn. ad nr.* 20.
*Mus. Gottwald. t.* 1. *f.* 5. *f.* c. *t.* 5. *f.* 18. a. b. c.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 6. & 6. *t.* 23. *f.* 6.
*Murray testac. t.* 1. *f.* 10.
*v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t.* 8. *f.* 8. 9.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 230. 231.
*β) Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 7 ?
*Habitat ad* insulam Madagascar, S. Mauritii, & *in* Oceano indico, *testa vix* 2 *pollices longa albida, caeruleſcente aut flava, ad latera ſubtusque alba, labiis inter dentes rufis.*

Isabella. 49. C. testa subcylindrica: extremitatibus luteis. *Mus. Lud Ulr.* 574. *n.* 195. *
*Rumpf mus. t.* 39. *f.* G. Isabella.
*Pet. amb. aq.* 16. *f.* 16.
*gaz. t.* 97. *f.* 16.
*List. Conch. t.* 660. *f.* 4.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* P.
*Mus. Gottwald. t.* 7. *f.* 36.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 275.
*Habitat ad* insulam S. Mauritii & Madagascar, *testa vix* $1\frac{1}{2}$ *pollices longa angusta, alba vel grisea nigroque punctata, interdum fasciata, labiorum denticulis albis.*

ambigua. 50. C. testa pyriformi obscura dilutius nebulosa maculataque.
*Seb. mus.* 3. *t.* 76. *f.* 30.
*Habitat* - - - *an distincta species?*

Scurra. 122. C. testa ovato oblonga subtus plana lutescente : guttis virescentibus lividisve confluentibus, ad latera punctis fuscis sparsis varia. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 103. *t.* 144. *f.* 1338. a. b.
*Mart. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 276. 277.
*Habitat in* mari indico, *an eadem cum indica?*

*** Umbilicatæ.

Onyx. 51. C. testa subtus fusca supra albida. *Mus. Lud. Ulr.* 574. *n.* 196. *
*Rumpf mus. t.* 38. *f.* G. Porcellana cærulea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 255.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 254.
*Gualt. test. t.* 15. *f.* N.
*Chemn. Conch.* 10. *p.* 106. *t.* 145. *f.* 1341.
*List. Conch. t.* 657. *f.* 2.
*Habitat in* Asia, *testa pollicis magnitudine, supra ochroleuca, ceterum capiti serpentis similis, an mutata? an hujus tribus?*

clandestina. 52. C. testa lineis transversis subtilissimis flavescentibus passim concurrentibus.
*Habitat in* India, *testa laevi, livida, magnitudine c. aselli, subtus alba immaculata, supra fascia una alterave pallida obsoleta notata, striis lateis oculo nudo vix conspicuis.* Zoega.

succincta. 53. C. labio interiori utraque extremitate rotundato. *Mus. Lud. Ulr.* 575. *n.* 197. *
*Habitat* - - - -

Ziczac. 54. C. testa subtus lutea punctis fuscis : extremitatibus maculis duabus fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 575. *n.* 198. *
*List. Conch. t.* 661. *f.* 5. Concha venerea undatim depicta.
*Pet. gaz. t.* 12. *f.* 7.

Ar-

*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* N. R.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 2. 3. 11.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 18. i. k.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 224-227.
*Habitat - - - teſta ſupra dilute incarnata, faſciis* 3 *albis obſoletis lineisque angulatis rubellis vel flavicantibus varia, ſubtus lutea nigro maculata; interdum pulla faſciis* 2 *albis fuſco undulatis, ſubtus alba, aut alba lineis longitudinalibus muſtelinis undulatis, ſubtus lutea fuſco punctata, aut cana, lineis angulatis paulo obſcurioribus confertis, ſubtus tota nivea.*

Hirundo. 55. C. teſta ſupra cæruleſcente: extreminantibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 576. *n.* 199. *
*Liſt. Conch. t.* 674. *f.* 20. 21.
*Pet. gaz. t.* 30. *f.* 3.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 235.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 8. 9.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 25. *n.* b. c.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 25. *f.* 4.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 11.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 282.
*Habitat ad* inſulas Maldivas, *c. aſello affinis, teſta anguſta elongata, ſubtus alba, ad marginem punctata, ſupra ſæpius fuſco punctata, aut maculata: faſciis* 2 *transverſis albis.*

Aſellus. 56. C. teſta alba: faſciis tribus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 200. *
*Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* M. Aſellus.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* T. Aſellus.
*Liſt. Conch. t.* 666. *f.* 10.
*Pet. gaz. t.* 97. *f.* 11.
*amb. aq. t.* 16. *f.* 18.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 236.
*Barrel. rar. t.* 1326. *f.* 27.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* M. CC. DD.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 26. a. b. c.
*Bytem. app. t.* 12. *f.* 56. 58.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* H.
*Knorr. Vergn.* 4. *t.* 25. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 280. 281.
*Habitat frequens ad* inſulas Maldivas, *teſta oblonga, minuta, faſciis flavo marginatis, interdum rubellis.*

erronea. 57. C. teſta macula teſtacea æquali. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 202.
*Habitat - - - macula ſolitaria a ſtellida diſtincta.*

Urſellus. 58. C. teſta oblonga alba, ſupra lævi fuſco varia; punctis ad umbilicum duobus fuſcis.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* O.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* L.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 241.
*Habitat rarior - - - teſta minuta.*

Pyrum. 59. C. teſta dilute fuſca: faſciis dilutioribus maculisque ochroleucis, ſubtus & ad latera fulva, intus cærulea.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* E.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 267. 268.
α) *Liſt. Conch. t.* 667. *f.* 12 ?
γ) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. i. k.
*Habitat - - - labii dentibus albis.*

maculoſa. 60. C. teſta anguſta elongata ſupra maculis carneis, pallidis fulvis glaucisque varia, ad latera ſpadicea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 259.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 259.
*Habitat - - -*

pulla. 61. C. teſta tenui ad latera pulla, ſupra alba aut di-

dilute fuſca, faſciis transverſis lineave horizontali dilutiori notata.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 269. 270.
*Habitat rarior* - - -

indica. 62. C. teſta cylindrica ſupra characteribus, ocellis lineaque horizontali dilutiore notata ad latera rubella atro guttata, labii denticulis fuſcis.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* H.
*Habitat rarior in* India, *arabicae affinis, inter primam tertiamque tribum quaſi media, lateribus perfici florum colore tinctis.*

Ovum. 65. C. teſta oblonga tenui olivacea: maculis ferrugineis ſparſis, ſubtus alba.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 19. g. h. i. *& f.* 22. b.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 27. *f.* 278. 279.
*Habitat* - - - *teſta anguſta, detrita faſciis ſupra* 3 *caeruleſcentibus, denticulorum in labiis interſtitiis ſubfuſcis.*

felina. 66. C. teſta oblonga anguſta plumbea: punctis maculisque ferrugineis, faſciisque dilutioribus: maculis ad utrumque finem duabus fuſcis.
*Liſt. Conch. t.* 680. *f.* 27.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 7.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 283. 284.
*Habitat* - - - *inter c. hirundinem & aſellum media, teſta detrita ſupra caeruleſcente.*

atomaria. 67. C. teſta oblonga nivea fuſco punctato ad utrumque finem obſcuro biguttata.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 290. 291.
*Habitat* - - *teſta ½ circiter pollicem longa.*

nebulosa. 68. C. teſta oblonga gibba fuſca ſpadicco maculoſa.
*Liſt. Conch. t.* 688. *f.* 35.
*Habitat* - - - *olivaceae affinis.*

ochro-

ochroleuca. 69. C. testa tenui ochroleuca; maculis dilutioribus.
*Bonann. recr. 3. f. 244.*
*muſ. Kircher. 3. f. 243.*
*Habitat - - -*

ſtellata. 70. C. testa tenui cinerea fuſco punctata: ſtriis transverſis elevatis.
*Bonann. recr. 3. f. 248.*
*muſ. Kircher. 3. f. 247.*
*Habitat - - -*

ſubflava. 71. C. testa oblongiuſcula gibba lævi ſubflava.
*Gualt. teſt. t. 13. f. D.*
*Habitat - - - an diſtincta vere ſpecies?*

leucogaſter. 72. C. testa oblonga purpurea ſubtus alba.
*Gualt. teſt. t. 13. f. F.*
*Habitat - - - an vere diſtincta ſpecies?*

variolaſa. 73. C. testa oblonga obſcura: faſciis dorſi duabus maculisque albidis.
*Gualt. teſt. t. 13. f. M.*
*β) Gualt. teſt. t. 13. f. N. O.*
*γ) Gualt. teſt. t. 13. f. P.*
*δ) Gualt. teſt. t. 13. f. Q.*
*ε) Gualt. teſt. t. 13. f. TT.*
*Habitat - - -*

fulva. 74. C. testa ſolida oblonga fulva: maculis fuſcis ſeriatis faſciisque duabus obſcuris, ad latera ſubtusque crocea.
*Gualt. teſt. t. 13. f. S.*
*Habitat - - -*

leucoſtoma. 75. C. testa oblonga gibba fuſco cæruleoque nebuloſa ad latera nigro-maculata, ore albo.
*Gualt. teſt. t. 14. f. A.*
*Habitat - - -*

lineata. 76. C. testa ovata supra lineata : limbo maculato.
*Mus. Gottwald. t. 2. f. 7. f.*
*g) Mus. Gottwald. t. 4. f. 14. g. 1.*
*Habitat - - -*

cancellata. 77. C. testa ovata gibba cancellatim maculata : linea supra horizontali.
*Mus. Gottwald. t. 5. f. 18. l. m. n. & f. 19. a. b. c. t. 6. f. 31. b. c.*
*Habitat - - -*

lutea. 78. C. testa fuscescente : fasciis duabus albis, subtus lutea fusco punctata. *Gronov. zooph. t. 19. f. 17.*
*Habitat - - - testa oblonga, angusta.*

badia. 79. C. testa oblonga gibba supra badia : punctis fuscis albisque.
*Bytem. appar. t. 12. f. 57.*
*Habitat - - - -*

punctata. 115. C. testa ovata alba : punctis testaceis. *Mant. 2. p. 548.*
*Habitat - - - testa vix marginata, magnitudine C. Ziczac, ore albo.*

zonaria. 119. C. testa ovata lævinscula lutescente : fasciis quatuor lunulis fuscis notatis. *Chemn. Conch. 10. p. 107. t. 141. f. 1342.*
*Habitat rarissima ad* Guineæ *littora.*

conoidea. 121. C. labro intus dentato : tuberculorum ordinibus tribus, labio edentulo. *Scop. del. inf. 2. p. 78. t. 24. f. 3.*

**** *marginatae.*

cribraria. 80. C. testa umbilicata lutea : punctis rotundis albis. *Mus. Lud. Ulr. 577. n. 201.* * *Ar-*

*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* X. Argus minor.
*Pet. gaz. t.* 80. *f.* K. *t.* 8. *f.* 3?
*List. Conch. t.* 695. *f.* 42.
*Mus. Gottwald. t.* 2. *f.* 7. e? *f.* 9. g.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 74.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 336.
*Habitat - - - testa oblonga, angusta, ovi passerini magnitudine, ocellata, subtus tota alba, inter denticulos labii interdum flavo maculata.*

Moneta. 81. C. testa marginato nodosa albida. *Mus. Lud. Ulr.* 578. *n.* 203. *
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* K. Moneta Congo.
*List. Conch. t.* 709. *f.* 50. Moneta nigritarum.
*Rumpf mus. t.* 39. *f.* C. Thoracium vulgare f. cauricum.
*Pet. gaz. t.* 97. *f.* 8. Concha veneris africana f. Moneta nigritarum.
*Pet. amb. aq. t.* 16. *f.* 14.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. *f.* 233.
*Barrel. rar. t.* 1326. *f.* 26.
*Gualt. test. t.* 14. *f.* 3. 5.
*Lesser testaceoth. f.* 26.
*Mus. Gottwald. t.* 7. *f.* 42. a-g.
*Bytem. app. t.* 12. *f.* 59.
*Murray testaceol. t.* 1. *f.* 11.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 24. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 337-340.
*Habitat frequens in* mari mediterraneo, atlantico, æthiopico, indico, *imprimis in insulis* Maldivis *a seminis lecta sub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde transportatur navibus in Bengalam, Siam, Americam, insulasque illi obversas, nigritis loco monetae inserviens.*

Annulus. 82. C. testæ dorso annulo flavo circumdato. *Mus. Lud. Ulr.* 578. *n.* 204. *

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* D. Thoracium quadratum.
*Pet. gaz. t.* 6. *f.* 8.
*Rondel. teſt.* 2. *p.* 103. *f.* 4.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 240. 241.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* 1. 2.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. *f.* g. *f.* 40. c ?
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 4. & *t.* 16. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 239. 240.
*Habitat ad* Amboinam & Alexandriæ *frequens*, *teſta ochroleuca*, *intus caerulea*, *ſubtus planiuſcula.*

caurica. 83. C. teſta margine gibbo inæquali albido fuſco-punctato, dorſo nebulato-teſtaceo.
*Liſt. Conch. t.* 677. *f.* 24. & *t.* 678. *f.* 25.
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* P.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* AA.
*Murray teſtaceol. t.* 1. *f.* 13.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 301. 302.
α) *Rumpf muſ. t.* 38. *f.* O.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 303.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta ſolida ſubtus flaveſcente vel alba*, *faſciis* 4 *ſæpe letis fuſcis.*

eroſa. 84. C. teſta deroſo-marginata flava albo punctata: lateribus macula ſubfuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 205. *
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* A. Thoracium oculatum.
*Pet. gaz. t.* 97. *f.* 19.
*Liſt. Conch. t.* 690. *f.* 37.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* H.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 37. a-c. *f.* 40. a ? d ?
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 20. *f.* 4.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 8. *f.* 13.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 320. 321.
*Habitat ſatis frequens ad* inſulas S. Mauritii & Aſcenſionis, *teſta ad* 1¼ *polycis longa ſupra convexa*, *interdum ſubfuſca aut vireſcente albo punctu-*

*Etaia, nonnunquam subfusco maculata: linea media virescente subobliqua, subtus & ad latera alba.*

derosa. 85. C. testa deroso-marginata carnea: dorso cinerascente rufo punctato: lateribus punctis fuscis. *Gronov. zooph. t. 18. f. 10.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *erosae affinis, supra fusciis 3 obsoletis, subtus laevi rufescente.*

flaveola. 86. C. testa deroso-marginata flavescente alba punctata: lateribus punctis fuscis obsoletis inaequalibus sparsis. *Mus. Lud. Ulr. 581. n. 209.* *
*Habitat - - - punctis vel ocellis albis hinc inde in striis confluentibus; erosae proxime affinis, an vere distincta?*

spurca. 87. C. testa submarginata lutescente luteo irrorata: lateribus fusco punctatis.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa ovata, laevi, interdum livida, immaculata diaphana, edentula, margine supra crenulato, fusco, labio interiori posterius apice reflexo.*

oblonga. 88. C. testa oblongo-ovata supra cærulescente fusco punctata maculataque, subtus & ad latera alba.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 14.*
*Habitat - - - spira manifesta, an hujus tribus?*

stolida. 89. C. testa cinerea testaceo quadrato variegata.
*Mus. Lud. Ulr. 580. n. 207.* *
*Rumpf mus. t. 39. f. E.*
*Argenv. Conch. t. 18. f. Y.*
*Seb. mus. 3. t. 55. n. 19. f. 12. 14.*
*Mus. Gottwald. t. 5. f. 22. a. c. t. 6. f. 28?*
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 8. f. 12? 15?*
*Martin. Conch. 1. t. 28. f. 292. 293.*
*β) Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 237. Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* F.
*Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 27.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 294. 295.
γ) *Gualt. teſt. t.* 16. *f.* E?
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 296. 297 ?
ε) *Liſt. Conch. t.* 679. *f.* 26 ?
*Habitat ad* Amboinam ; *teſta* 1½ *pollicem longa , ſubtus & ad latera alba.*

helvola. 90. C. teſta triquetro-gibba albo-punctata poſterius eroſa ſubtus flava immaculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 579. *n.* 206.
*Liſt. Conch. t.* 691. *f.* 38.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 247.
*muſ. Kircher* 3. *f.* 246.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* B.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* BB.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 27.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 326. 327.
*Habitat in* Oceano indico , *teſta flava , ſupra nunc albo punctata vel ocellata , nunc inter maculas albas vel caeruleſcentes ſtelulis ſpadiceis notata.*

ocellata. 91. C. teſta ſubmarginata lutea : ocellis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 208.
*Liſt. Conch. t.* 696. *f.* 43.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 359.
*Muſ. Kirch.* 3. *f.* 352.
*Pet. gaz. t.* 9. *f.* 7.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 32. c. d. e ?
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 333. 334.
*Habitat varior - - - teſta* ½ *pollicem longa , margine albo fuſco-punctato , dentibus labii albis.*

poraria. 92. C. teſta ſubviolacea albo-punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 210. *
ν. *Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 16 ?
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 324. 325.

ζ)

ε) *Liſt. Conch. t.* 694. *f.* 41.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 5.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. b. c.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 237. 238.
*Habitat - - - teſta puſilla, ſupra interdum livida, lutea, aut ſubfuſca.*

Pediculus. 93. C. teſta transverſim ſulcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 211.
*Adanſ. Senег.* 1. *t.* 5. *f.* 3. Bitou.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* L. Pediculus.
*zoomorph. t.* 3. *f.* I. K.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* P. Pediculus.
*Liſt. anim. angl. p.* 168. *t.* 3. *f.* 17. Concha veneris exigua alba ſtriata.
*Liſt. Conch. t.* 706. 707. *f.* 56. 57.
*Pet. amb. aq. t.* 16. *f.* 22.
*Barrel. rar. t.* 1326. *f.* 28.
*Ginann. adr.* 2. *t.* 15. *f.* 109.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* O. P. *t.* 15. *f.* P. R.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *f.* 22.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 21. c. & *t.* 8. *f.* 45. a-h.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 6.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 309-311.
ε) *Liſt. Conch. t.* 706. *f.* 55.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 239. 250.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 239. 248.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 306-308.
*Habitat in* Oceano Europæo ſeptentrionali, americano, indico, mari mediterraneo, *frequens, teſta minuta, ovata, aliarum nunc albarum, nunc rubellarum, nunc roſearum, nunc maculatarum, nunc immaculatarum dorſo longitudinaliter ſulcato, aliarum rubellarum aut ſubluſcarum non raro maculis rufeſcentibus ſubfuſcis aut cinereis variarum ſulco longitudinali nullo.*

coſtata. 94. C. teſta dilute carnea: dorſo ſtriis elevatis ſubtiliſſimis transverſis aſpero. *Knorr*

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 15. *f.* 7.
*Habitat* - - - *c. pediculo affinis, at teſta magis elongata, ½ pollicem ſuperante.*

Nucleus. 95. C. teſta utrinque marginata ſubroſtrata rugoſa, ſupra punctata tuberculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 212. *

*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* V. Variolæ.
*Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* I. Nux avellana granulata.
*Pet. amb. aq. t.* 16. *f.* 11.
*gaz. t.* 97. *f.* 12.
*Liſt. Conch. t.* 708. *f.* 58.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* Q. R. S.
*Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. a. b.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 17. *f.* 7.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 78.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 17.
*Martini. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 312.
*Habitat frequens ad* inſulam Nuſſatello, *rarior ad littora* Hilæ, *teſta oblonga alba, cinerea aut chalybea, ad plicem usque longa, lateribus transverſim ſulcatis, labiorum dentibus acutis.*

madagaſcarienſis. 96. C. teſta albida utrinque roſtrata: dorſo tuberculato; ſtriis transverſis undulatis.
*Liſt. Conch. t.* 710. *f.* 61.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. c. d.
*Habitat ad* Madagaſcar, *c. nucleo affinis, at teſta latiori.*

ſtaphylæa. 97. C. teſta ſubroſtrata: punctis elevatis ſine ſtriis, extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 213. *

*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* S. Porcellio.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. d? e?
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 16. *f.* 2.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 18.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 313. 314.

*Ha-*

*Habitat - - - testa in ſpadiceum vergente, tuberculis minoribus, quam in c. nucleo, labiorum dentibus ireflexis.*

Cicercula. 98. C. teſta utrinque roſtrata adſperſa punctis elevatis.
*Liſt. Conch. t.* 710. *f.* 60.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 243.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 242.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* K.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* T.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 19.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 243. 244.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *teſta alba vel albida: dorſo convexo.*

Globulus. 99. C. teſta utrinque roſtrata lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 214. *
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* L. N. Globulus.
*Gualt. teſt. t.* 14. *f.* M.
*Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. e. f.
*Murray teſtaceol. t.* 1. *f.* 12.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 20.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 24. *f.* 242.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 21. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 145. *f.* 1349. 1350.
β) *Gualt. teſt. t.* 14. *f.* N.
*Habitat in* Aſia, *potiſſimum ad* Amboinam, *teſta globoſa alba, vel flava, rarius fuſco aut ſanguineo punctata.*

affinis. 100. C. teſta oblonga ſubroſtrata lævi flava: anterius utrinque ocellata.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 12. *f.* 7.
*Habitat - - - c. globulo affinis, at magis oblonga.*

ſqualina. 101. C. teſta tenui oblonga alba: punctis macu-
lisque ferrugineis. *Liſt.*

*Liſt. Conch. t.* 684. *f.* 31. & *t.* 686. *f.* 33.
*Gualt. teſt. t.* 16. *f.* I.
*Muſ. Gottwald. t.* 5. *f.* 18. d. e. f.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 25. *f.* 250. 251.
ε) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. a. 33. l.
*Habitat - - - teſta tenui, maculis interdum confluentibus, margine fuſco maculato, dorſi linea nonnunquam horizontali albida.*

fimbriata. 102. C. teſta alba vel griſea: maculis faſciisque tranſverſis ferrugineis obſoletis, oris labiis violaceo-maculatis.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 26. *f.* 263. 264.
*Habitat - - - teſta detrita rubra.*

cruenta. 103. C. teſta gibba ſupra cæruleſcente rufo punctata ad latera ſubtusque alba; labiis citrinis.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* E.
*Habitat - - - -*

reticulata. 104. C. teſta reticulata, margine maculis virgatis vario.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* R.
*Habitat - - - -*

rubiginoſa. 105. C. teſta oblonga alba, intus violacea dorſi litura ferruginea, utroque fine luteo bimaculato, labiorum dentibus flaveſcentibus.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 305.
*Habitat - - - -*

miliaris. 106. C. teſta tenui brevi ex flavicante viridi lacteo-ocellata: linea laterali horizontali.
*Liſt. Conch. t.* 700. *f.* 47. & *t.* 701. *f.* 48.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 30. *f.* 323.
*Habitat - - - eroſae affinis.*

acicularis. 107. C. testa solida supra flavescente fusco punctata : linea horizontali pallida, subtus lactea, punctis ad marginem impressis.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 31. *f.* 335.
*Habitat* - - - *testa pollicem circiter longa.*

crassa. 108. C. testa crassa subflava : fasciis tribus albidis, ore cærulescente.
*List. Conch. t.* 664. *f.* 8.
*Habitat* - - - *carneolae affinis, testa ultra 4 pollices longa.*

vinosa. 109. C. testa supra ex albo vinosa : ocellis purpurascentibus circulo nigro cinctis lineaque horizontali alba, intus cærulea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 253.
*muf. Kirch.* 3. *f.* 252.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testae margine virescente.*

angustata. 110. C. testa angustata fusca : maculis ad latus rufescentibus.
*Gualt. test. t.* 13. *f.* QQ.
*Habitat* - - - -

similis. 111. C. testa oblonga gibba flavicante albo punctata : macula ad marginem nigricante.
*Gualt. test. t.* 13. *f.* R.
*Habitat* - - - *erosae affinis.*

striata. 112. C. testa convexa ex albo cærulea fusco punctata subtus flava altero latere striata.
*Gualt. test. t.* 14. *f.* F.
*Habitat* - - - *testa mediae magnitudinis.*

chinensis. 113. C. testa oblonga solida variegata : labiis aurantiis.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* Z. pu-
*Habitat* - - - -

Pusilla. 114. C. testa cæruleſcente fuſco maculata trifaſciata.
*Argen. Conch. t.* 18. *f.* 1.
*Habitat* - - - -

321. BULLA. *Animal* Limax.
*Teſta* univalvis, convoluta, inermis.
*Apertura* ſubcoarctata, oblonga, longitudinalis, baſi integerrima.
*Columella* obliqua, lævis.

Ovum. 1. B. teſta ovata obtuſe ſubbiroſtri: labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 218. *
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* A. Ovum.
*Rumpf muſ. t.* 38. *f.* Q. Ovum.
*Valent. Abh. t.* 4. *f.* 32.
*Pet. amb. t.* 8. *f.* 9.
*gazoph. t.* 97. *f.* 7.
*Liſt. Conch. t.* 711. *f.* 65.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 252.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 251.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* A. B.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 6. 10. 11.
*Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 43. a. b. c.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 22.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 33. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 22. *f.* 205. 206.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 3. *f.* 7.
β) Crumpled Cowry. *Martin. univ. Conchol.* 2. *t.* 60.
*Habitat frequens ad* Amboinam, β) *ad* inſulas amicas *media inter cypraeas & bullas, teſta laevi ad* 4 *pollices longa, nivea, ore luteo.*

Volva. 2. B. teſta biroſtri: roſtris elongatis ſtriatis acutis.

tis. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 216. *
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* I. Radius textoris.
*Liſt. Conch. t.* 711. *f.* 63.
*Bonann. muſ. Kircher.* 3. *f.* 390.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 55. *f.* 13-16.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 23.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 1. *f.* 2. 3. & 6. *t.* 32. *f.* 1.
*Spengl. ſelt. Conch. t.* 1. *f.* C.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 217. a. b. & *f.* 218.
*Habitat rariſſima ad* Jamaicam, *teſta tenui* [illegible] *boſa, tranſverſim ſtriata, alba, adu*[illegible] *veſcente cinerea, roſtris rarius ſubcur*[illegible]

biroſtris. 3. B. teſta biroſtri: margine exterius craſſato, roſtris elongatis lævibus.
*Liſt. Conch. t.* 711. *f.* 66.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 20. *f.* 5.
*Habitat rara ad* Javam, *volvae ſimilis, at* [illegible] *minore, fabae magnitudine, anguſtiore,* [illegible] *ex incarnato albida, roſtris aequalibus,* [illegible] *fere longitudine, oblique truncatis: altero* [illegible] *adſcendente, rima ſubaequali verſus roſtrum* [illegible] *ſcendente latiori.*

Spelta. 4. B. teſta oblonga utrinque obtuſiuſcula æquali, labro arcuato: margine intus incraſſato.
*Liſt. Conch. t.* 712. *f.* 68.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* 4.
*Pet. gaz. t.* 66. *f.* 1. 3.
*Ginann. adr.* 2. *t.* 13. *f.* 95.
*Barrel. ic.* 31. 32. 35.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 23. *f.* 215. 216.
*Habitat rara in* mari mediterraneo & adriatico, *teſta alba, laevi, ſemine tritici duplo* [illegible] *vix biroſtri, at magis patula, ſpira externa* [illegible] *la, apertura longitudinali lunata cum dent*[illegible] *obſoleto ad apicem columellae.*

ic.

verru-cosa. 5. B. testa transverse angulata ovata utrinque puncto oblico. *Mus. Lud. Ulr.* 585. *n.* 217. *
*Rumpf mus. t.* 38. *f.* H. Jambos alba.
*Petiv. amb. aq. t.* 16. *f.* 22, 23. Gibba.
*gaz. t.* 99. *f.* 2.
*List. Conch. t.* 712. *f.* 67.
*Gualt. test. t.* 16. *f.* F.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* M.
*Seb. mus.* 3. *t.* 55. *f.* 17.
*Lesser testaceoth. f.* 24.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 26. *f.* 7.
*Martin. Conch.* 1. *t* 23. *f.* 220. 221.
*Habitat rara in* India, *cypraeis affinis, testa tota alba utroque fine rubescente, raro ultra pollicem longa, ovali.*

gibbosa. 6. B. testa angulata: cingulo elevato. *Mus. Lud. Ulr.* 585. *n.* 218. *
*Column. purp. p.* 29. *t.* 30. *f.* 5.
*List. Conch. t.* 711. *f.* 64.
*Pet. gaz. t.* 15. *f.* 5.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 249. 339.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 249. 338. 339.
*Argenv. Conch. t.* 18. *f.* Q.
*Seb. mus.* 3. *t.* 55. *f.* 18.
*Mus. Gottwald. t.* 8. *f.* 46. a.
*Lesser testaceoth. f.* 25.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 14 *f.* 3. 4. & 6. *t.* 32. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 22. *f.* 211-214.
*Habitat frequens ad* Brasiliam, *testa elongata angusta alba, aut aurorae colore tincta supra alba: apertura recta, ventre longiori.*

Nau-sum. 7. B. testa rotundata pellucida transversim substriata utrinque umbilicata. *Mus. Lud. Ulr.* 586. *n.* 219. *
*Rumpf mus. t.* 27. *f.* H. Bulla.
*List. Conch. t.* 714. *f.* 73.

Bo-

*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 4.
*Gualt. teſt. t.* 13. *f.* GG.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* Q.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 45.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 38. *f.* 2. 3.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 22. *f.* 200. 201.
*Habitat in* Oceano africano & indico, *teſta vix ultra pellicem longa, tenui, dorſi medio interdum glaberrimo.*

aperta. 8. B. teſta ſubrotunda pellucida tranſverſim ſubſtriata tota hiante.
*Gualt. teſt. t.* 13. *f.* EE.
*Martin. Conch.* 1. *p.* 266. *vign.* 13. *f.* 3.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 172. *t.* 1. *f.* 8. *a. b.*
*Brit. zool.* 4. *t.* 70. *f.* 85. A.
*da Coſta brit. zool. t.* 2. *f.* 3.
*Favann. Conch. t.* 27. *f.* F⁷.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1354. 1355.
*Habitat rara ad* caput bonæ ſpei, *nauco affinis, at teſta tota hiante vix umbilicata, potius lineata, quam involuta, ſtriis ſemilunaribus utrinque conſpicuis diſcernenda.* Spengler.

Hydatis. 9. B. teſta rotundata pellucida longitudinaliter ſubſtriata: vertice umbilicato.
*Gualt. teſt. t.* 13. *f.* DD.
*Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1019.
*Habitat rara in* mari mediterraneo, *piſi minoris ſaepe magnitudine, apertae affinis.*

Ampulla. 10. B. teſta rotundata opaca: vertice umbilicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 286. *n.* 220. *
*Rumpf muſ. t.* 27. *f.* G Bulla.
*Pet. gaz. t.* 50. *f.* 13. *& t.* 99. *f.* 14.
*Column. aq. t.* 69. *f.* 3.
*Grew muſ. t.* 9. *f.* 7. 8.
*Barrel. rar. t.* 1326. *f.* 37.

Lift

*Liſt. Conch. t.* 713. *f.* 69. *t.* 715. *f.* 74. & *t.* 1056. *f.* 8.
*Gualt. teſt. t.* 12. *f.* E.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 34-44.
*Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 55. a. b. & *f.* 63. f.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 31.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 8. *f.* 1. 5. *t.* 17. *f.* 6. & 6. *t.* 21. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 58. & *t.* 8. *f.* 21.
*Martin Conch.* 1. *t.* 21. *f.* 188-193.
ε) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 1. *f.* 2. Goſſon.
*Liſt. Conch. t.* 714. *f.* 72.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 3. b.
*Gualt. teſt. t.* 12. *f.* F. I.
*Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 54. a. b. *f.* 55. c. d. *f.* 56. a. b. c. *f.* 57. a. b. *f.* 58. 59. 61. *f.* 63. a-e.
*Murray teſtaceoth. t.* 1. *f.* 9.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 22. *f.* 202-204.
*Habitat frequens in* Oceano indico, æthiopico, americano, *teſta ſolidiore ſubpellucida, ad* 3 *pollices longa alba, cinereo, atro, rufeſcente, rubro, caerulefcente maculata nebulaſque, ε) magis oblonga, tota opaca, vix ultra* 1½ *pollicem longa, γ) lineis cinereis atrisque transverſis picta.*

lignaria. 11. B. teſta obovata oblonginſcula transverſe ſtriata: vertice ſubumbilicato.
*Liſt. Conch. t.* 714. *f.* 71.
*Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 406.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 37. *f.* 4. 5.
*Spengl. ſelect. Conch. t.* 3. *f.* H.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 21. *f.* 194. 195.
*Habitat in* mari ſiculo & adriatico, *teſta ampullae fere ſtatura, rarius* 3 *pollices longa, ligni fere colore, intus alba, tenui, columella flexuoſa, ut oculo ad verticem usque pateat.*

Phyſis. 12. B. teſta rotundata glaberrima pellucida lineis criſ-

crispata : spira retusa. *Mus. Lud. Ulr.* 587. *n.* 221. *

*List. Conch. t.* 715. *f.* 75.
*Bonann. mus. Kirch.* 3. *f.* 403.
*Valent. Abh. t.* 2. *f.* 19.
*Gualt. test. t.* 13. *f.* FF.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* I.
*Klein ostr. t.* 5. *f.* 98.
*Seb. mus.* 3. *t.* 38. *f.* 46-50.
*Martin. Conch.* 1. *t.* 21. *f.* 196-198. *vign.* 14. *p.* 274. *f.* 3. 6.
ε) *Kaemm. Cab. Rudolst. p.* 115. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5.
γ) Stripad Bulla. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 11. *Habitat rarior in* India, γ) *in* Oceano australi, *testa tenuissima, lineis rarius fasciis spadiceis aut nigricantibus, interjectis interdum punctis.*

Amplustra. 13. B. testa subrotunda : spira elevata obtusa ; fasciis incarnatis. *Mus. Lud. Ulr.* 587. *n.* 222. *
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1350. 1351.
*Habitat in* Asia, *testa alba.*

Ficus. 14. B. testa obovato-clavata reticulato-striata ; cauda exserta, spira obliterata.
*Mus. Lud. Ulr.* 637. *n.* 314. Murex Ficus.
*Rumpf mus. t.* 27. *f.* K. Ficus.
*Pet. amb. aq. t.* 6. *f.* 9.
*List. Conch. t.* 750. *f.* 46. & *t.* 751. *f.* 46. a.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. *f.* 15.
*Gualt. test. t.* 26. *f.* I. M.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* O.
*Klein ostr. t.* 5. *f.* 93.
*Seb. mus.* 3. *t.* 68. *f.* 1-6.
*Mus. Gottwald. t.* 10. *f.* 70. *f.* 70. a. b.
*Lesser testaceoth. f.* 53.
*Knorr delic. t.* B. II. *f.* 7.
*Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 4. 3. *t.* 23. *f.* 1. & 6. *t.* 27. *f.* 7.

*Mus.*

*Martin. Conch.* 3. *t.* 66. *f.* 733-735.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 2. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 877. *f.* 1.
*Murt. Conch.* 3. *t.* 66. *f.* 736. 737.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 19. 20.
δ) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 27.
*Klein oſtr. t.* 4. *f.* 79. b.
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 10. *f.* 8.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *teſta ad* 3 *pollices longa, cancellatim ſtriata exalbida, maculata, lineata aut punctata, intus alba vel caeruleſcente, apertura ampla, ſemilunari inciſura, cauda intus cava.*

Rapa. 15. B. teſta rotundata turbinata ſubſtriata: cauda curva, ſpira exquiſita.
*Muſ. Lud. Ulr.* 638. *n.* 315. Murex Rapa.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* K. Rapa.
*Rumpf muſ. t.* 27. *f.* F. Rapa.
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 82.
*Pet. amb. aq. t.* 9. *f.* 8.
*Gualt. teſt. t.* 26. *f.* H.
*Klein oſtr. t.* 4. *f.* 80.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 13-24. & *t.* 68. *f.* 7. 8.
*Knorr delic. t.* B. II. *f.* 8.
*Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 68. *f.* 747-649.
*Schroet. Journ.* 5. *f.* 1.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1364-1366.
*Habitat in* Oceano indico, *cauda ſua cum ficu ad murices accedens, teſta* 2-3 *pollices longa, alba aut ſubvireſcente, adultiori evidenter ſtriata.*

canaliculata. 16. B. teſta cylindrica: ſpiræ anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 224. *
*Habitat* - - - *teſta teſtacea pallido nebuloſa.*

conoidea. 17. B. teſta oblonga-turbinata lævi baſi ſubſtriata: futuris crenulatis. *Ha-*

*Habitat - - - - testa ochroleuca, glandis magnitudine; basi emarginata, labio obtuso, columellae plicis 5-6, spira conica testa dimidio breviore: anfractibus tenuibus imbricatis, ad margines punctis quasi crenulatis.*

fontinalis. 18. B. testa ovata pellucida contraria: spira obsoleta, apertura ovato-oblonga. *Fn. fuec.* 2160. * *It. wgoth.* 49.

*Muller verm. aq. & terr.* 2. *p.* 167. Planorbis testa fragili finistrorsa: vertice obtuso, apertura ovata.

*Muller Naturf.* 15. *p.* 1. &c. *t.* 1. *f.* 1-12.

*List. Conch. t.* 134. *f.* 34.

*anim. angl. t.* 2. *f.* 25.

*Gualt. test. t.* 5. *f.* CC.

*Martin. berl. Magaz.* 4. *t.* 11. *f.* 61.

*Geoffr. coq. p.* 103. *n.* 10.

*Schroet. Flusconch. t.* 6. *f.* 16. a. b.

*Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 177. 178.

β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 879. 880.

*Habitat frequentissima in* Danubii littore, Galliae, Angliae, Scandinaviae *fontibus, lacubus, rivis, rarior in aliis* Germaniae *partibus, testa tenera, ¾ pollicem longa, fragili, nitidissima, flavescente, interdum alba: spirae anfractibus 3; ventre ventricoso, incola albo griseove; pallio laciniato.*

hypnorum. 19. B. testa ovata pellucida contraria: spira prominente, apertura ovato-lanceolata. *Fn. fuec.* 2159. *

*Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 882. 883. a. b. c.

*Habitat in* Europae muscis humentibus, *nonne varietas b. fontinalis?*

turrita. 20. B. testa nitida: spira acuminata, apertura oblonga.

*Mull. verm. flav. & terr.* 2. *p.* 169. *n.* 354. Planorbis turritus.

*Habitat in* Saxonia, Danubio, Daniæ foſſis campeſtribus & aquaticis, *teſta* ½-6 *lineas longa ovata-oblonga contraria pellucida fulva, dum limacem nigerrimum (juniorem griſeum) tentaculorum tamen apice albo, continet, nigra, ſpirae anfractibus teretibus* 3-6.

gelatinoſa. 21. B. teſta fragiliſſima ſiniſtrorſa: ſpira depreſſa, apertura caudata.

*Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 170. *n.* 355. Planorbis gelatinus.

*Habitat rariſſima in* Daniæ rivis, *teſta* 2½ *lineas longa, ventricoſa, fulva, diaphana, tenerrima, pluma leviore; ſpira lata; anfractibus, praeter extimum, obſoletis: limace inhabitante griſeo, teſta triplo majore, quam pallio craſſo gelatinoſo involvit.*

Terebellum. 22. B. teſta cylindrica: ſpira ſubulata baſi truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 564. *n.* 178. *

*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* S. Terebellum.
*Pet. amb. aq. t.* 13. *f.* 24.
*Liſt. Conch. t.* 736. *f.* 30. 31.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 57.
*Gualt. teſt. t.* 23. *f.* O.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* G.
*Klein oſtr. t.* 2. *f.* 48. 49.
*Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 53. a. b.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 33.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 4. 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 568. 569.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 2. *f.* 3.
6) *Liſt. Conch. t.* 737. *f.* 32.
*Petiv. amb. t.* 13. *f.* 24.
*Chem. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1362. 1363.

*Habitat in* Oceano indico, *inter conos & bullas media, diſtincti forſan generis, teſta anguſta, ultra* 2 *pollices longa, interdum tranſverſe ſtriata, al-*

*alba, frequentius luteo maculata, punctata aut nebulosa, rarius quadrifasciata.*

Cypræa. 23. B. testa ovata: spira obliterata; apice prominulo, apertura posterius magis dilatata, columella torta.

*Knorr Vergn. 6. t. 4. f. 5? & t. 27. f. 6?*
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 2?*
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa magnitudine glandis & ultra, an vere larva cypraeae spurcae? an cono bullato affinis?*

virginea. 24. B. testa subturrita erecta, columella truncata sanguinea.

*Mus. Lud. Ulr. 612. n. 267.* Buccinum virgineum.
*Mull. verm. fluv. & terr. 2. p. 143. n. 333.* Buccinum testa conico acuminata glabra: fasciis angustis diversicoloribus, apertura purpurea.
*List. Conch. t. 844. f. 72.*
*Gualt. test. t. 45. f. D.*
*Petiv. gaz. t. 22. f. 11.*
*Argenv. zoomorph. t. 10. f. G.*
*Spengl. selt. Conch. t. 1. f. G.*
*Schroet. Flussconch. t. 8. f. 3. 4.*
*inn. Bau Conch. t. 5. f. 7.*
*Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 4.*
*Favann. Conch. t. 65. f. G¹.*
*Chemn. Conch. 9. t. 117. f. 1000-1003.*
α) cærulescens, fasciis quinque.
*List. Conch. t. 15. f. 10.*
*Klein ostr. t. 17. f. 116.*
*Pet. gaz. t. 151. f. 1.*
*Argenv. Conch. t. 11. f. N.*
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 66.*
β) candida, fasciis octo.
*Gualt. test. t. 6. f. A.*
γ) candida, fasciis septem.

Sch.

*Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 38.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 30. *f.* 7.
β) anfractibus contrariis.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1682. 1673.
*Habitat in* Aliæ *fluviis, rarior, teſta turbinis inſtar contorta, laevi, nitida, alba; faſciis rubris, viridibus flavis, nigris fuſcisque varia, ventricoſa, apertura fere ſemilunari, ſpirae anfractibus* 8 *ſenſim decreſcentibus.*

faſciata. 25. B. teſta conico-acuminata: faſciis maculisque undulatis tranſverſis, aperturâ alba.
*Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 145. *n.* 334. Buccinum faſciatum.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 64-66. 69-74.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 25. *f.* 4.
*Favann. Conch. t.* 65. *f.* G². G³. G⁵. G⁶.
*Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1004-1006.
α) alba, faſciis cæruleis.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 62. 63.
*Argenv. Conch.* 1. *app. t.* 1. *f.* G.
*Martin. Berl. Mag.* 3. *p.* 125. *t.* 5. *f.* 52.
β) alba, faſciis fuſcis.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 67.
*Gualt. teſt. t.* 6. *f.* D.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* M.
γ) alba, faſciis variegatis.
*Liſt. Conch. t.* 12. *f.* 7.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 68.
*Gualt. teſt. t.* 6. *f.* C.
*Klein oſtr. t.* 2. *f.* 43.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 46.
δ) faſciis tribus fulva, violacea & aurea.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 379.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 366.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1007. 1008.
*Habitat in* America *auſtrali* & India, *virgineae affinis*, & *teſta craſſiuſcula, magis elongata, ad*

27 *lineas longa, minus laevi & nitida, fasciis non translucentibus, columella integra facile discernenda.*

ſtrigata. 26. B. teſta conico-acuminata glabra: ſtrigis undulatis fulvis, columella recta reflexa.
*Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 148. *n.* 336. Buccinum ſtrigatum.
*Habitat* - - - *teſta alba, ultra* 2 *pollices longa, apertura pallide caerulescente, columella perforata: ſpirae anfractibus* 8.

ſtriatula. 27. B. teſta conica alba ſtriata, columella recta reflexa.
*Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 147. *n.* 335. Buccinum ſtriatulum.
*Habitat* - - - *ſtrigatae proxime affinis, at teſta minore, vix* 21 *lineas longa, ſtrigis nullis ſpecie bili diſtincta.*

exarata. 28. B. teſta oblonga acuminata alba ſulcata: apertura repanda.
*Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 148. *n.* 337. Buccinum exaratum.
*Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1031. 1032.
*Habitat rariſſima* - - - *teſta fragili, pellucida, columella recta imperforata, ſpirae anfractibus* 6-7.

biſaſciata. 29. B. teſta ſubturrita erecta alba: faſciis ad aperturam duabus latis rubellis.
*Liſt. Conch. t.* 16. *f.* 11.
*Habitat terreſtris* - - - *an diſtincta ſpecies?*

ambigua. 30. B. teſta ſubturrita compreſſiuſcula ſubincarnata: faſciis, duabus remotis; altera latiore fuſca, altera cærulea.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 28. *f.* 4.
*Habitat* - - - *an hujus generis?*

Ze-

Zebra. 31. B. testa ovato acuminata: fasciis longitudinalibus fuscis, columella inflexa integra.

*Müll. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 138. *n.* 331. Buccinum Zebra.

*List. Conch. t.* 9. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 578. *f.* 33. & *t.* 580. *f.* 3. 4.

*Pet. gazoph. t.* 44. *f.* 7.

*Seb. mus.* 3. *t.* 39. *f.* 50. 51. 54. 55. & *t.* 71. *f.* 4. 5.

*Argenv. zoom. t.* 11. *f.* L.

*Klein ostr. p.* 34. §. 89. s. & 90. e.

v. *Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 10. *f.* 1.

*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 5. *f.* 6.

*f) Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 2.

*g) Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 875. 876.

*h) Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1015. 1016.

*Favann. Conch. t.* 65. *f.* M³.

*Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1014.

*Habitat ad caput bonae spei, & Tranquebariae, terrestris, achatinae affinis, & cum ea fallax helicitas jungens, at testa minore, ad 27 lineas longa, magis ventricosa, alba, lineis confertis undulatis varia.*

achatina. 32. B. testa ovata: apertura obovata apiceque sanguineis, columella truncata. *Müs. Lud. Ulr.* 589. *n.* 225. *

*Column. aq. c.* 8. *t.* 16. Buccinum exoticum.

*Müll. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 140. *n.* 332. Buccinum: testa ovato-oblonga, fasciis longitudinalibus rufo fuscis, axi truncato canaliculato.

*List. Conch. t.* 579. *f.* 34.

*Bonann. recr.* 3. *f.* 192.

*Seb. mus.* 3. *t.* 71. *f.* 1-3.

*Klein ostr. p.* 47. *t.* 3. *f.* 60.

*Knorr delic. t.* B. V. *f.* 1.

*Vergn.* 3. *t.* 3. *f.* 1. & 4. *t.* 24. *f.* 1 & 5. *t.* 12. *f.* 2.

*Schroet.*

*Schroet. Flusconch. t. 6. f. 1.*
β) alba, apice flavo.
*Gualt. test. t. 45. f. B.*
*Bonann. mus. Kircher. 3. f. 190.*
*Argenv. Conch. 1. t. 10. f. E.*
*Seb. mus. 3. t. 71. f. 7-10.*
*Mus. Gottwald. t. 33. f. 220.*
*Chemn. Conch. 9. t. 118. f. 1012. 1013.*
γ) fulva vel candida, columella sanguinea.
δ) alba: fasciis crebris, columella pallida.
*Argenv. Conch. 1. app. t. 2. f. L.*
*Habitat in* Oceano americano, *testa ad 8 pollicis longa, sub epidermide fusca exalbida, maculis oblongis longitudinalibus undatis fuscis, spadiceis vel caerulescentibus varia.*

hyalina. 33. B. testa oblonga cornea: spira retusa.
*Mus. Gottwald. t. 8. f. 20?*
*Martin. Conch. 1. t. 21. f. 199.*
*Habitat - - - physi affinis, testa tenui, vix ½ pollicem longa.*

ovata. 34. B. testa subovata obtuse subbirostri dorso striata medio gibbosa spadicea: maculis fasciisque albis intus violacea.
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 262.*
*Martin. Conch. 1. t. 22. f. 207. 208.*
*Habitat rarior - - - B. ovo affinis, at testa vivore magis oblonga, labroque minus dentato distincta.*

ferrugi-nosa. 25. B. testa subovata aequabili grisea dilute, fulco undulata: maculis ferrugineis fasciisque duabus albis.
*Martin. Conch. 1. t. 22. f. 209.* α)

---

*An sui generis cochlea, quam* Schroeter *n. Litterat. 2. p. 221. f. XX. 20. nomine designabit?*

ε) *Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 53?
ζ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 1.
*Habitat* - - - *ovatae affinis, teſta* 1½ *pollicem longa.*

Velum. 36. B. teſta tenuiſſima utrinque umbilicata alba lineis capillaribus fuſcis varia: faſcia nivea utrinque fuſco-marginata.
*Martin. neueſt. Mannigf.* 1. *p.* 409. *t.* 1. *f.* 10. *f.* 11.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1348. 1349.
ε) *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 1.
*Habitat* - - - *teſta ultra pollicem longa.*

Veſica. 37. B. teſta ovato-oblonga cinereo-varia intus lactea ſolida pellucida, apertura ampla, dorſo biſulcato.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 332.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 330.
*Klein oſtr. t.* 5. *f.* 96.
*Habitat ad* Braſiliam, *ampullae affinis.*

cylindrica. 38. B. teſta cylindrica lævi alba tenuiſſima.
*Gualt. teſt. t.* 15. *f.* 1.
*Favann. Conch. t.* 27. *f.* F⁵.
*Helbl. boehm. Abh.* 4. *t.* 2. *f.* 30. 31.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1356. 1357.
ε) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* 2.
*Habitat* - - - *hyalinae affinis, teſta minuta.*

Oliva. 39. B. teſta cylindrica: apertura ſuborbiculari infra dilatata.
*Liſt. Conch. t.* 714. *f.* 70. b. c.
*Klein oſtr. t.* 5. *f.* 99. a. b.
*Habitat* - - - *ſpira non conſpicua.*

Voluta. 40. B. teſta lævi cylindrica olivacea; apertura effuſa, columella inflexa truncata. *Chemn. Conch.* 9. 117. *f.* 1009. 1010.

*Habitat rarior - - - ſpirae anfractibus 7.*

dominicenſis. 41. B. teſta ſubcylindrica turrita rufeſcente longitudinaliter ſtriata maculata : ſuturis crenulatis , columella ſinuata truncata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1011.
*Habitat in* inſula S. Dominici , *teſta longitudinaliter ſulcata , anguſta , ad ſuturas granulata , anfractibus extimis fuſcis.*

purpurea. 42. B. teſta ventricoſa rugoſa longitudinaliter ſtriata intus purpurea ; columella truncata , apertura ovata labro acuto : limbo intus nigerrimo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1017. 1018.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 1.
*Habitat in* Africæ campis , *oryza conſitis.*

ſpreta. 43. B. teſta ovata tenui fuſca ſcabra.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 5. *f.* 5.
*Habitat rara - - -*

ſolida. 44. B. teſta ſolida rubra violaceo-varia ; margine rubro , ſpira prominula.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 21. *f.* 2.
*Habitat - - . ampullae affinis.*

Stercus pulicum. 45. B. teſta ventricoſa glabra cornea cinnamomea quinquefariam punctata , columella ſinuata , labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1026. 1027.
*Favann. cat. t.* 2. *f.* 129.
*Habitat - - - teſta tenuiſſima ovata.*

Scabra. 46. B. teſta ovata ſcabra dorſo ſubcarinata decuſſatim ſtriata alba , alba roſeo-lineata , columella ſinuoſa reflexa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 118. *t.* 146. *f.* 1352. 1353.
*Habitat rariſſima in* Java.

Akera.

Akera. 47. B. testa ovata pellucida : vertice truncato canaliculato. *Mull. zool. dan.* 2. *p.* 88. *t.* 71. *f.* 1-5. *prodr. n.* 2921.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1358. *n.* 1-3.
*Habitat in* mari norwegico, *testa* 6 *lineas longa.*

foluta. 48. B. testa cylindrica cornea transversim striata : vertice retuso, anfractibus marginatis canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 113. *t.* 146. *f.* 1359-1361.
*Habitat in* Zeylon.

trunca-ta. 49. B. testa hyalina tenui oblonga : colcmella incurvata truncata. *Kaemmer. Cab. Rudolst. p.* 128. *t.* 10. *f.* 5.
*Habitat - - - testa ultra* 2 *pollices longa.*

carnea. 50. B. testa ovata incarnata gibba : labro arcuato incrassato intus dentato. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 21.
*Habitat frequens ad* Africæ *littora.*

322. VOLUTA. *Animal* Limax.
*Testa* unilocularis, spiralis.
*Apertura* ecaudata, subeffusa.
*Columella* plicata : labio umbilicove ( utplurimum ) nullo.

* *apertura integra.*

Auris Midæ. 1. V. testa coarctata ovali oblonga : spira rugosa, columella bidentata. *Mus. Lud Ulr.* 589 *n.* 226.* *Mull. verm. fluv. & terr.* 2. *p.* 110. *n.* 311. Helix testa fusiformi granulata : apertura lanceolata, labro ad axin bidentato.
*Rumpf. mus. t.* 33. *f.* H. H. Auris midæ.
*Argenv. Conch. t.* 10. *f.* G. Auricula Midæ.

*List. Conch. t.* 1058. *f.* 6.
*Gualt. test. t.* 55. *f.* G.
*Pet. aq. amb. t.* 8. *f.* 2.
*Klein ostr. t.* 7. *f.* 122.
*Seb. mus.* 3. *t.* 71. *f.* 6. 21. 22.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 25. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 43. *f.* 436-438.
*Spengl. selt. Conch. t.* 1. *f.* L.
β) *List. Conch. t.* 577. *f.* 32. b.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1395. 1396.
*Habitat rarior in* Indiæ, *potissimum* Ceram, *paludibus silvaticis fluviisque uliginosis, helices bulla jungens, testa nonnunquam ultra* 4 *pollices longa, fusca, solida, rugosa, vel striata, spira magna: anfractibus* 6-9 *singulis fascia granulata terminatis, extremis cancellatis, apertura longa, infra ampliore.*

flammea. 2. V. testa ovali oblonga: apertura ampla, columella unidentata.
*List. Conch. t.* 814. *f.* 24.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 43. *f.* 439.
ε) *List. Conch. t.* 827. *f.* 49. e.
γ) *List. Conch. t.* 834. *f.* 60.
δ) *List Conch. t.* 834. *f.* 61.
*Habitat - - - testa magis ventricosa & breviore, quam in aure Midae, alba: maculis virgatis perpendicularibus undatis rubris, columella flava marginata.*

sulcata. 3. V. testa coarctata ovali-oblonga sulcata alba flavo-punctata, columella biplicata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 43. *f.* 440 441.
*Habitat - - - auri Midae proxime affinis, at testa longe minori, vix* ¾ *pollicis longa, sulco inter utramque columellae plicam profundo.*

bi-

bifaſcia-ta. 4. V. teſta tenui transverſim ſtriata incarnata : faſciis duabus albis , columella unidentata.
*Liſt. Conch. t. 835. f. 58.*
*Martin. Conch. 2. t. 43. f. 442. 443.*
*Habitat - - - teſta vix pollicem longa : apertura longa , anguſta.*

flava. 5. V. teſta ſuperius coarctata flava , labro crenulato , columella biplicata.
*Martin. Conch. 2. t. 43. f. 444.*
*Habitat - - - teſta 4½ lineas longa , rarius ſpadicea faſciaque obſoleta obſcura , columellaque alba tridentata , ſpirae anfractibus 7 planis.*

minuta. 6. V. teſta ovali oblonga faſciata , columella triplicata.
*Liſt. Conch. t. 834. f. 59.*
*Martin. Conch. 3. t. 43. f. 445.*
*Habitat - - - teſta nunc fuſca : faſciis 2-6 albis , nunc alba : faſciis 4 , alternatim luteis & coffeae colore tinctis , labroque tricoſtato.*

pufilla. 7. V. teſta tenui fuſca : ſpiræ anfractibus cancellatis , columella tridentata.
*Gualt. teſt. t. 55. f. F.*
*Martin. Conch. 2. t. 43. f. 446.*
*Habitat - - - - auri Midae proxime affinis , at teſta minima.*

glabra. 8. V. teſta oblongo-ovali glabra : labro reflexo ſulcato , columella unidentata.
*Martin Conch. 2. t. 43. f. 447. 448.*
*Habitat - - - teſta ultra 1½ pollicem longa magis ventricoſa , quam in aure Midae , apertura quoque ſuperius magis coarctata , colore albo : maculis perpendicularibus undatis flavicantibus aut ſpadiceis vario.*

Au-

Auris Sileni. 9. V. testa ovali gibba umbilicata: columella plica unica, crassa flexuosa. *v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 3. 4. mus. Caes. Vindob. ind. 1. p. 197.*

*Habitat - - - testa glabra ultra 2 pollices longa, ventricosa brevi, fusca: striis longitudinalibus undulatis spadiceis, apertura ovata, spira obtusa.*

Auris Judæ. 10. V. testa coarctata oblonga: spira lævi, columella tridentata. *Mus. Lud. Ulr. 590. n. 228. Mull. verm. fluv. & terr. 2. p. 109. n. 310.* Helix testa cylindrica subgranulata, apertura latiuscula, labro ad axin tridentato.

*List. Conch. t. 32. f. 30.*

*Bonann. mus. Kircher. 3. f. 412.*

*Martin. Conch. 2. t. 44. f. 449-451.*

*Schroet. Flusconch. t. 9. f. 10.*

*Einl. in Conch. 1. p. 197. t. 1. f. 9.*

ε) *Gronov. zooph. t. 18. f. 12.* Voluta Auris Judæ.

*List. Conch. t. 1058. f. 9.*

*Habitat varior in* Indiæ paludibus, *auri Midæ affinis, at testa minore, angustiore, magis oblonga, fusca aut alba maculis undatis fuscis variata, spirae anfractibus 6, primo & extremis subtilissime cancellatis.*

Auris Malchi. 11. testa fusiformi granulata: apertura ovata, columella excisa patentiuscula.

*Mull. verm. fluv. & terr. 2. p. 112. n. 312.* Helix Auris Malchi.

*Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1037. 1038.*

ε) *Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1039. 1040.*

γ) *Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1041.*

*Habitat* β, *in* nova Caledonia, *testa 29 lineas longa, sub epidermide squalide fusca, alba: spira 6 anfractibus sex medio convexis costatis, apertura candida; an hujus generis?*

toc-

tornatilis. 12. V. testa coarctata ovata substriata : spira elevata acutiuscula , columella uniplicata.
*List. Conch. t. 835. f. 58.*
*Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 4.*
*Martin. Conch. 3. t. 43. f. 442. 443.*
*Schroet. n. Litterat. 3. t. 2. f. 12. 13.*
β) *Knorr Vergn. 6. t. 19. f. 4 ?*
*Habitat - - - testa rubicunda : fasciis albis.*

solidula. 13. V. testa coarctata oblongo-ovata opaca striata : spira elevata acutiuscula , columella subplicata. *Mus. Lud. Ulr. 590. n. 228. **
*Bonann. recr. & mus. Kirch. 3. f. 143 ?*
*Klein ostr. t. 3. f. 72 ?*
*Schroet. n. Litterat. 3. t. 2. f. 14. 15.*
*Kaemm. Cab. Rudolst. t. 8. f. 3.*
*Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1405.*
*Martin Conch. 3. t. 43. f. 440. 441.*
*Habitat - - - testa albo. griseoque longitudinaliter lineata.*

livida. 14. V. testa coarctata ovato-cylindrica : spira subelevata obtusiuscula , columella quinqueplicata. *Mus. Lud. Ulr. 591. n. 229. **
*Gualt. test. t. 25. f. B ?*
β) *Gualt. test. t. 25. f. C.*
*Habitat rarior in* Africa , *ad cylindroideas accedens , testa tamen magis ventricosa , vix ultra pollicem longa livida : fasciis transversis pallidis obsoletis distincta.*

Coffea. 15. V. testa coarctata lævi : spira obtusa , apertura utrinque dentata.
*List. Conch. t. 834. f. 59.*
*Schroet. n. Litterat. 3. p. 255.*
*Favann. Conch. t. 65. f. 47.*
*Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1043. 1044.*
*Martin. Conch. 2. t. 43. f. 445.*

Ha-

*Habitat - - - ſtructura ad conos accedens, at apertura poſterius coarctata, teſta lurido-livida.*

** Cylindroideæ, *ſ. ſubcylindricae emarginatae.*

porphyria. 16. V. teſta lævi: ſpira baſi obliterata, labro medio retuſo, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 592. *n.* 230. *

*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* K. Porphyria.
*Bonan. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 142.
*Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* 1.
*Gualt. teſt. t.* 24. *f.* P.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* E.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 19. a.
*Knorr delic. t.* B. IV. *f.* 4.
*Vergn.* 1. *t.* 15. *f.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 15.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 485. 486. 498.
ε) *Liſt. Conch. t.* 727. *f.* 14.
*Gualt. teſt. t.* 24. *f.* N. O.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* N.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* A-D.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 22. a. b. c.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 12. *f.* 1. 2. & 3. *t.* 2. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 45. *f.* 476. 477.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 519?
δ) *Liſt. Conch. t.* 724. *f.* 11?
*Habitat in* Braſilia, *olivae proxime affinis, at teſta quadruplo longiore, 5 quippe pollices longa, fuſcis bella, lineis angularibus plurimis fuſcis varia, labro intus ſordide flavo transverſim ſtriato, columella ſubfuſca: picis albis.*

Oliva. 17. V. teſta lævi: ſpiræ baſi reflexa, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 593. *n.* 231. *
α) *Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* 2. Cylinder.
*Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 27.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t. 23. f. B.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. L.*
*Muſ. Gottwald. t. 43. f. 49. 40. a.*
*Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 6.*
*Martin. Conch. 2. t. 45. f. 472. 473.*
*Chemn. Conch. 10. t. 147. f. 1367-1382.*
ε) *Martin. Conch. 2. t. 47. f. 502.*
ϛ) *Knorr Vergn. 5. t. 27. f. 4.*
ζ) *Knorr Vergn. 3. t. 17. f. 3.*
*Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 2.*
*Martini Conch. 2. t. 45. f. 474.*
η) *Liſt. Conch. t. 718. f. 2.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. K.*
*Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 7. & 5. t. 27. f. 5.*
*Martin. Conch. 2. t. 47. f. 501.*
ζ) *Liſt. Conch. t. 740. f. 29.*
*Martin. Conch. 2. t. 45. f. 475. & t. 47. f. 507. 508.*
ϑ) *Martin. Conch. 2. t. 46. f. 496.*
ι) *Liſt. Conch. t. 728. f. 15.*
*Gualt. teſt. t. 24. f. M.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. O.*
*Muſ. Gottwald. t. 42. f. 19. b. c. t. 43. f. 25. a. b. d. f. 26. 27. 31. 31. a.*
*Martin. Conch. 2. t. 45. f. 478. 479.*
ι) *Martin. Conch. 2. t. 46. f. 497.*
κ) *Liſt. Conch. t. 739. f. 28.*
*Rumpf muſ. t. 39. f. 3.*
*Martin. Conch. 2. t. 48. f. 512. 513.*
λ) *Valent. Abh. t. 8. f. 69.*
μ) *Gualt. teſt. t. 23. f. G.*
ν) *Gualt. teſt. t. 23. f. P.*
ξ) *Gualt. teſt. t. 23. f. PP.*
ο) *Gualt. teſt. t. 23. f. QQ.*
π) *Martini Conch. 2. t. 48. f. 509. 510.*
ϱ) *Liſt. Conch. t. 735. f. 25.*
*Rumpf muſ. t. 39. f. 4.*
*Valent. Abh. t. 8. f. 68.*

*Klein.*

*Klein oſtr. t. 5. f. 91. a. b.*
*Argenv. Conch. t. 13. f. S.*
*Muſ. Gottwald. t. 43. f. 37. b. c. d. f. 34.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. M. & a.*
*Knorr Vergn. 5. t. 19. f. 1. & t. 26. f. 4.*
*Martin. Conch. 2. t. 45. f. 480. 481. t. 47. f. 503. 504. & t. 51. f. 563.*
*o) Martini Conch. 2. t. 47. f. 499. 500.*
*π) Argenv. zoomorph. t. 11. f. A.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. R.*
*Muſ. Gottwald. t. 42. f. 6. a. f. 7. a. b. f. 15. d. e.*
*Knorr Vergn. 5. t. 26. f. 3.*
*Martin. Conch. 2. t. 48. f. 517.*
*υ) Knorr Vergn. 3. t. 2. f. 4.*
*φ) Knorr Vergn. 6. t. 23. f. 5.*
*χ) Muſ. Gottwald. t. 43. f. 30. b. f. 35. a. b.*
*ψ) Muſ. Gottwald. t. 37. f. d.*
*ω) Muſ. Gottwald. t. 43. f. 41. b.*
*αα) Muſ. Gottwald. t. 43. f. 42. b.*
*ββ) Argenv. Conch. t. 13. f. R.*
*Martini Conch. 2. t. 49. f. 531.*
*γγ) Liſt. Conch. t. 732. f. 21. & t. 734. f. 23. 24.*
*Gualt. teſt. t. 23. f. M. N.*
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. Y.*
*Muſ. Gottwald. t. 42. f. 1. d. 2. a. 13. a-d. Mar-*

---

*Infinita olivæ variatio, & maxima nonnullarum varietatum cum ipſarum affinitas dubios relinquit, an diſtinctæ ſint varietates, & non ſpecies, adjungendæ olivæ & volutæ a* Martini *Conch. 2. t. 99. f. 6. 7. a* Linnæo *Conch. t. 718. f. 2. a. t. 725. f. 12. t. 728. f. 16. t. 730. f. 23. t. 738. f. 33. t. 746. f. 40. & t. 813. f. 23. a. a* Gualtieri *teſt. t. 23. f. R. S. SS. V. et t. 24. f. B. C. D. E. F. H. I. L. ab* Argenville *Conch. t. 13. f. L. a* Seba *muſ. 3. t. 53. f. F. S. T. V. b. c. d. h. m. a* Favanne *ſter appar. t. 12. f. 62. Muſ.* Gottwaldian. *t. 42. f. 5. a. b. 8. 11. 12. d. 15. f. 16. a. d. e. f. 18. b. c. f. 20. a. b. t. 43. f. 28. a. b. c. f. 30. d. b. c. f. 30. a. b. c. d. f. 32. f. 33. f. 35. a. b. c. d. h. k. f. 38. f. 43. a. f. 44. a. f. 45. a. b. f. 46. 47. 48. 50. a* Knorrio *Vergn. t. f. 7. et 6. t. 34. f. 4. 5. et a* Schroetero *Einl. in Verſt. 4. t. 7. f. 3. 4. 5. lineatæ; an diſtincta hujus tribus ſpecies foſſilis ab* Argenville *Conch. t. 29. f. 9. a. adumbrata?*

*Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 487. 488.
ββ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 489.
γγ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 490.
ζζ) *Lift. Conch. t.* 739. *f.* 26.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 11. 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 511. 511. a.
ηη) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* O.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 514.
θθ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 559.
ιι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 562.
κκ) *Lift. Conch. t.* 719. *f.* 3. & *t.* 731. *f.* 20.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* 5.
*Gualt. teſt. t.* 23. *f.* F. T.
*Seba muſ.* 3. *t.* 53. *f.* F?
*Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 515. 516. 518. 521.
λλ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* G.
*Habitat infinita coloris & picturae varietate in* mari indico.

annulata. 18. V. teſta lævi alba; dorſi annulo carinato.
*Lift. Conch. t.* 717. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 564.
β) *Martin. neueſt. Mannigfalt.* 1. *p.*446. *t.*2. *f.*21?
*Habitat* - - - β) *rufeſcente undulata.*

Utriculus. 19. V. teſta elongata lævi: ſpira prominula.
*Lift. Conch. t.* 723. *f.* 10. *t.* 732. *f.* 19?
*Gualt. teſt. t.* 24. *f.* G.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* M.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 12. *f.* 4. 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 49. & 50. *f.* 539-542.
ε) *Muſ. Gottwald t.* 42. *f.* 9. 10. 14. a. b. c. 15. a. b.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 520.
ζ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *t.* 565. 566.
η) *Lift. Conch. t.* 733. *f.* 22.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 543. 544.

θ)

α) *Liſt. Conch. t.* 725. *f.* 13.
*Muſ. Gottwald. t.* 25. *f.* 173. b.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 545-547.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 548.
η) *Liſt. Conch. t.* 722. *f.* 9.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 141.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* 9.
*Gualt. teſt. t.* 23. *f.* RR. & *t.* 24. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* P. Q.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 2. b. c. & *f.* 4. & *t.* 43. *f.* 51. a. b. c. *f.* h. i. m.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 17. *f.* 2. & 5. *t.* 18. *f.* 1. 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 549-554.
*Habitat in* Oceano indico & æthiopico, *coloris & picturae varietate numeroſa, forma magis elongata ab oliva diſcernenda.*

hiatula. 20. V. teſta tenui: dorſo cinereo maculoſo ſubtus calloſo, apertura ampla, columella ad baſin dentata.
*Liſt. Conch. t.* 729. *f.* 17.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 555.
*Habitat in* mari hiſpanico, *utriculo affinis, ore caeruleo aut fuſco, rarius albo, dorſi callo albo aut flavicante.*

jaſpidea. 21. V. teſta alba vireſcente fuſco violaceoque punctata: ſpira prominente; anfractibus baſi faſcia maculoſa.
*Liſt. Conch. t.* 726. *f.* 13. a.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 556.
*Habitat in* mari hiſpanico, *teſta vix pollicem longa, ſpira magis prominente, quam in congeneribus.*

nivea. 22. V. teſta nivea elongata laevi faſciata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 558.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 557.

*Ha-*

*Habitat in* mari hiſpanico, *anfractuum primo ſubfuſco aut rubello: faſciis 2 albis,* β) *faſciis 2 caeruleis nebuloſis per totam teſtae ſuperficiem diſperſis; an vere diſtincta ab Utriculo & Oliva?*

Iſpidula.

23. V. teſta lævi: ſpira prominente; margine unico, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 594. *n.* 232. *

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 7. Agaron ?
*Bonann. recr.* 3. *f.* 369.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 363.
*Barr. ic. t.* 1322. *f.* 17.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* 7. 8.
*Petiv. gaz. t.* 59. *f.* 8.
*Gualt. teſt. t.* 23. *f.* C. D. E.
*Argenv. Conch. t.* 13. *f.* Q.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* X.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 1. a. b. c. *f.* 3. a. b. c. *f.* 6. b. c. d. & *f.* 7. a. & *t.* 43. *f.* 37. e. *f.* 40. b. c. e. f. *f.* 41. a. *f.* 42. a. *f.* 43. c. *f.* 44. b. & *f.* 45. d. f.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 19. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 49. *f.* 522-530. & *f.* 532-538.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* g.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 1.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* k.
ε) *Liſt. Conch. t.* 720. *f.* 4. 5.
*Rumpf muſ. t.* 39. *f.* 6.
*Gualt. teſt. t.* 23. *f.* H. I. L. Q.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* W.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 5. c. & ? *t.* 43. *f.* 36.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 10. *f.* 6. 7.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 491. 492.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 721. *f.* 6. 7.
*Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 5. d. & *f.* 15. h.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 493. 494.
*Habitat varietate numeroſa in* India, *teſta pollicem,* ε) 2 *longa, anguſta, alba aliter atque aliter picta, intus obſcuriore aut fuſca.* Car-

Carneolus. 24. V. testa aurantia: fasciis cæruleis, spira complanata & apertura albis.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 495.
*Habitat* - - -

*** Ovatæ, *f. obovatae, effusae, emarginatae.*

Dactylus. 25. V. testa lævi decussatim striata obtusa columella sexplicata.
*List. Conch. t.* 813. *f.* 23.
*Gualt. test. t.* 28. *f.* P.
*Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* S.
*Favann. Conch. t.* 15. *f.* F1.
*Clemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1411. 1412.
β) *Gualt. test. t.* 28. *f.* O.
*Habitat rara in* India, *testa* 1½ *pollicem longa et albido & incarnato varia: labio vix crenato.*

miliaria. 26. V. testa subemarginata alba: spira obliterata flaveola, columella oblique striata.
*Habitat frequens in* mari mediterraneo, *monili affinis, at minor, brevior, magis ventricosa, glaberrima, spirae lineola flava, interdum tota mellea.*

Monilis. 27. V. testa integra alba: spira obliterata alba, columella oblique striata.
*Mus. Gottwald. t.* 8. *f.* 46. c.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 426.
β) *Adans. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Stipon.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 428.
*Habitat in* Sina, *ad armillas, monilia, coronas adhibita,* β) *in* Senegalia Africæ, *testa vix* ½ *pollicem,* β) 2½ *lineas longa, labro prominente, apertura ampla, columellae plicis* 4-5, β) 8-10 *tenuissimis.*

ex-

exilis. 28. V. testa obovata integra flavicante : fasciis duabus fuscis, spira prominente, columella oblique striata.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 427.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 303. *t.* 1. *f.* 18.
*Habitat* - - - *testa minuta*, ε) *alba nitida* : *fascia lutea.*

Persicula. 29. V. testa lævi : spira retuso-umbilicata, columella septemplicata, labro marginato crenato.
α) testa rubro punctata.
*List. Conch. t.* 803. *f.* 10.
*Pet. gaz. t.* 8. *f.* 2.
*Barrel. ic. t.* 1326. *n.* 33.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 246.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 245.
*Gualt. test. t.* 28. *f.* C. D. E.
*Mus. Gottwald. t.* 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 421.
ε) testa rubro-lineata.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 4. Bobi.
*List. Conch. t.* 803. *f.* 9.
*Pet. gaz. t.* 8. *f.* 10.
*Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. *f.* 238. *male.*
*Gualt. test. t.* 28. *f.* B.
*Mus. Gottwald. t.* 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 21. *f.* 6.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 419. 420.
γ) testa rubella albo-maculata, aut unicolore alba, vel cæruleſcente.
*Mus. Gottwald. t.* 8. *f.* 46. b. 47. 51. a. 62. a. b. c.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 416-418.
δ) testa nigro-fasciata, spira subprominula.
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 78.
*Habitat in* mari africano, *& ad* Senegaliam, *testa vix ultra pollicem longa.*

pal-

pallida. 30. V. testa integra oblongo-ovata: spira elevata, columella quadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 573. *n.* 223. *

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 2. Falier, & *f.* 3. Simeri.

*Liſt. Conch. t.* 714. *f.* 70.

*Schroet. Einl. in. Conch.* 1. *p.*211. *t.*1. *f.*10. a. b.

*Habitat in* Oceano africano, *glabellae affinis, testae ventre ſuperne aequali diſtincta, testa oblongata anguſta, vix ½ pollicem longa, exalbida subcerea, interdum pellucida.*

Faba. 31. V. testa ſubemarginata lævi ſubplicata: spira laevi prominente, columella quadriplicata, marginato crenulato.

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Narel.

*Gualt. teſt. t.* 28. *f.* Q.

*Muſ. Gottwald. t.* 25. *f.* 170. a-d.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 17. *f.* 6.

*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 432. 433.

*Habitat paulo rarior in* Oceano africano, *testa ad pollicem usque longa, anguſta, elongata, nitida, cana, ſeriatim nigro punctata.*

glabella. 32. V. testa integerrima lævi: spira lævigata, columella quadriplicata, labro gibbo margine to denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 233.

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Porcelaine.

*Liſt. Conch. t.* 818. *f.* 29-32.

*Gualt. teſtac. t.* 28. *f.* A. L.

*Klein oſtrac. t.* 5. *f.* 92.

*Muſ. Gottwald. t.* 25. *f.* 169. a-h. *f.* 170. *e.* 171. a. b. 172. a-d. 173. a.

*Knorr Vergn.* 4. *t.* 21. *f.* 2. 3. & 5. *t.* 23. *f.* 3. *Martin. neueſt. Manigf.* 4. *p.* 425. *t.* 3. *f.* 25-28. *Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 429-431. 434. 435.

ε) testa ochroleuca atro punctata.

*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 49.

z) testa angustiore badia, labro non marginato, columella triplicata.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 326.
*mus. Kirch.* 2. *f.* 101.
a) testa alba flavis lineis picta.
*Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* 36.
b) testa alba purpureo-nebulosa, spiræ anfractibus marginatis.
*Gronov. zooph. p.* 298. *n.* 1318. *t.* 19. *f.* 13. 14. Voluta Pyrum.
c) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 890. 891.
d) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1422.
e) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1423. 1424.
*Habitat in* Oceano africano & americano, *testa* 1-2 *pollices longa, aut unicolore alba, cinerea, vel subfusca, aut striata, undulata, maculis virgatis, ocellis albis, lineisve angulatis picta, spirae anfractibus* 5-6.

Prunum. 33. V. testa integerrima lævi: spira lævigata, columella quadriplicata, labro æquali mutico.
*Adans. Senec.* 1. *t.* 4. *f.* 3. Egouen.
*List. Conch. t.* 817. *f.* 28.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 422. 423.
*Habitat frequens ad* Goream, *testa ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, caerulea, caeruleſcente, vel ex virescenti cana.*

reticulata. 34. V. testa decussatim subsulcata: labro interne striato, columella subperforata.
*List. Conch. t.* 830. *f.* 52-54.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 52.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* M.
*Seb. mus.* 3. *t.* 49. *t.* 53. 55.
*Mus. Gottwald. t.* 25. *f.* 165. a. b.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 18. *f.* 7?
*Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1107. 1108. 1109?
g) *Seb. mus.* 3. *t.* 49. *f.* 56?

*Habitat in* Oceano americano *& ad* Guineam, *testa ad 2 pollices longa, pruni magnitudine albo lutecque varia, aut fusca, albo fasciata, rarius tota fusca, aut alba, inflata: sulcis obsoletis in sectionis angulo in tubercula elevatis, apertura alba, labro transversim sulcato, columella plicis aliquot geminatis exarata; cauda brevi.*

mercatoria. 35. V. testa striata: spira obtusata, columella retusa dentata, labro gibbo denticulato.

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 9. *f.* 29. Staron.
*List. Conch. t.* 824. *f.* 43.
*Pet. gaz. t.* 9. *f.* 4.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 36.
*Gualt. test. t.* 43. *f.* I. L.
*Mus. Gottwald. t.* 16. *f.* 120. b-d. e.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 12. *f.* 5. & 6. *t.* 18. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 452-458.
ε) *List. Conch. t.* 827. *f.* 49. E.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 6.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 7.
ι) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 9?

*Habitat in* mari mediterraneo, æthiopico, americano, indico, *rusticae affinis, testa* ¾ *pollicis circiter longa, aut unicolore alba vel flava, aut aliter aliterve maculata, nebulosa vel striata, interdum fasciata, solida, brevi: striis transversis elevatis nodulosis.*

rustica. 36. V. testa lævinscula: spira prominente, columella retusa denticulata, labro gibbo denticulato.

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 9. *f.* 28. Siger.
*List. Conch. t.* 824. *f.* 44. *t.* 825. *f.* 46. *t.* 826. *f.* 49.
*Gualt. test. t.* 43. *f.* E. G. H.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 41. c.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 4.

Mar-

*Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 469-471.
ε) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. a.
*Gualt. teſt. t.* 43. *f.* C.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 462.
ϛ) *Liſt. Conch. t.* 826. *f.* 48.
*Gualt. teſt. t.* 43. *f.* D.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 465. 466.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 459.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 463.
θ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 467.
ι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 468.
κ) *Liſt. Conch. t.* 825. *f.* 45.
λ) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. b.
*Habitat numeroſa coloris, pictūrae, magnitudinis varietate in* mari mediterraneo, æthiopico, americano, *ſtriis teſtae nullis a ruſtica diſcernenda, teſta nunc unicolore rubra vel flava, nunc alba fuſco, ſpadiceo, luteove maculata, ſtriata, nebuloſa.*

pauperc. 37. V. teſta integra læviuſcula baſi ſtriata: ſpira prominula, columella quadriplicata, labro obtuſato.
*Liſt. Conch. t.* 819. *f.* 35.
*Gualt. teſt. t.* 54. *f.* L.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 26. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1386. 1387.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 217. *t.* 1. *f.* 11.
ε) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* O.
γ) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* F?
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1417. 1418.
*Habitat rarior in* mari mediterraneo & indico, *teſta ſolida ex ferrugineo nigra: lineis albis longitudinalibus.*

mendic. 38. V. teſta ſubſtriata: ſpira ſubgranulata, columella lævi, labro gibbo denticulato.
*Liſt. Conch. t.* 826. *f.* 47.

*Pet. gaz. t.* 11. *f.* 5.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 50.
*Gualt. teſt. t.* 52. *f.* E.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 16. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 460. 461.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *teſta ultra obſolete ſcabra, magnitudine ſeminis phaſeoli ventris anfractibus faſciis 3 flavis, ſpira linea unica adſcendente: anfractibus ſubnodoſis.*

cancellata. 39. V. teſta integra plicata decuſſatim reticulata, columella triplicata ſubumbilicata productiuſcula.
*Syſt. nat.* X. 1. *p.* 751. *n.* 473. Murex ſcabriuſculus.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 8. *f.* 16. Bivat.
*Gualt. teſt. t.* 48. *f.* B. C. D. E.
*v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 7. 8.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 5. *f.* 5.
*Habitat in* Oceano africano, & *ad* Senegaliam, *murici ſenticoſo affinis, ſed brevior, teſta ultra pollicem nonnunquam longa, rugis longitudinalibus ſtrias tranſverſas elevatas acutas decuſſantibus ſcabra, alba: dorſi faſciis 2 ferrugineis, ſpira acuta, columella breviter caudata.*

elegans. 40. V. teſta lævi alba cæruleo-faſciata: apertura flava, ſpira ſubobliterata, columella ſexdentata.
*Liſt. Conch. t.* 803. *f.* 11?
*Bonann. muſ. Kircher.* 3. *f.* 269.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
*Habitat - - - teſta vix pollicem longa.* Ovum.

---

*Huic tertiæ volutarum tribui accenſendæ videntur, an diſtincta ſpecies ſit volutæ a* Liſtero *Conch. t.* 822. b. *f.* 41. b. *t.* 823. *f.* 42. *t.* 832. *f.* 50. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 3. *f.* 395. *depictæ: Quartæ autem volutæ a* Liſtero *Conch. t.* 577. *f.* 32. a. *t.* 814. *f.* 23. b. *t.* 821. *f.* 39. *t.* 828. *f.* 50. *a* Soba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 9. 10. 13. 14. 17-20. 25-32. 35-39. 42. 44. *delineatæ.*

Ovum. 41. V. testa lævi virescenti-alba multifasciata: labro inflexo, columella quadriplicata.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 23. *f.* 5. & *t.* 27. *f.* 1.
*Habitat* - - - *elegunti affinis, at testa majore ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices usque longa.*

margi-nata. 42. V. spira obsoleta, lateribus incrassato-marginatis, columella quadriplicata. *v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 9. *f.* 5-6.
*Favann. Conch. t.* 29. *f.* E.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1421.
*Habitat* - - - *testa nivea laevi, rarius rubella, aut flava fasciisque* 3 *obscurioribus picta; apertura lanceolata.*

nucea. 43. V. testa substriata glabra: spira prominula obtusa lævi, columella quinqueplicata. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 11.
*Habitat* - - - *testa alba productiore tumidula obsolete longitudinaliter striata, spirae anfractibus* 5.

Porcel-lana. 139. V. testa ovata alba seriatim rufescente punctata: spira obtusa basi emarginata, columella quinqueplicata, labro gibbo denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 164. *t.* 150. *f.* 1419. 1420.
*Habitat in* Oceano indico.

Conus. 140. V. testa conica alba: basi sulcis transversis excavato-punctatis, anfractibus crenatis, columella sexplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 150. *f.* 1415. 1416.
*Habitat* - - -

**** Fusiformes.

Tringa. 44. V. testa integriuscula oblonga lævi: spira prominente detrita, columella triplicata, labro introrsum subdentato.

*Adans.*

*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 9. *f.* 27. Bigni.
*Gualt. teſt. t.* 43. *f.* B.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 220. *t.* 1. *f.* 12.
*Habitat in* mari mediterraneo, *teſta nitida, albaque nebuloſa vix pollicem longa, ſpirae mucrone ſaepius detrito, columellae plicis tenuiſſimis, labro exterius minime marginato, in medio introrſum gibbo, minus tamen quam in praecedentibus.*

Cornicula. 46. V. teſta ſubemarginata oblonga lævi cornea; ſpira longiuſcula, columella quadriplicata, labro æquali mutico.
*Gualt. teſt. t.* 43. *f.* N ?
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 4. *f.* 2.
*Einl. in Conch.* 1. *p.* 221. *t.* 1. *f.* 13.
*Habitat in* mari mediterraneo & æthiopico, *priorum affinis, at ſpira magis elongata, labro minus dentato aut incraſſato, teſta utplurimum laevi, rarius ſubtiliſſime transverſim ſtriata, atra, ochracea rufeſcente, ex flavicante fuſca, maculis & virgatis undatis varia, aut cornu pellucidato & pictura aemulante faſciis interdum 2 exalbidis.*

Virgo. 47. V. teſta integra turrita plicata transverſeque ſtriata: columella triplicata perforata.
*Habitat - - - teſta pollicis longitudine ſulcis circiter 12 exarata, baſi reticulata: ſpirae anfractibus linea ſanguinea diſtinctis 10 bifaſciatis; cauda ſtrictiuſcula inferiore alba, ſuperiore lutea, cauda ſtrictiuſcula fere inſtar producta.* Spengler.

ſcabriuſcula. 48. V. teſta emarginata ſtriata transverſim rugoſa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.
*Syſt. nat.* X. 1. *p.* 740. *n.* 412. Buccinum ſcabriuſculum.
*Rumpf. muſ. t.* 29. *f.* T.

*Gualt.*

*Gualt. teſt. t.* 53. *f.* D. H ?
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1388. 1389. 1391 ?
*Habitat frequens in* India, *teſta aſpera alba : rugis fuſcis, varius cinerea : rugis albis, ad* 2 *pollices longa.*

ruffina. 49. V. teſta integriuſcula transverſim rugoſa : columella quadriplicata, labro crenulato.
*Gualt. teſt. t.* 54. *f.* G ?
*Habitat in* India, *ſcabriculae ſimilis, at teſta anguſtiore, longiore, paſſim incarnato-maculata, cauda abſque umbilico integra, labro recurvo tuberculis rotundatis crenulato.*

nubila. 143. V. teſta integriuſcula lævi lutescente rubro nebuloſa transverſim ſtriata : labro crenulato, columella quadriplicata. *Mart. univ. Conchyl.* 1. *t.* 23.
*Habitat in* Oceano auſtrali *ad* inſulas amicas.

Sanguifuga. 50. V. teſta emarginata longitudinaliter ſulcata transverſe ſtriata : columella quadriplicata, labro lævi.
*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* V. Turricula granulata.
*Liſt. Conch. t.* 821. *f.* 38.
*Vet. gaz. t.* 4. *f.* 5.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 78.
*Gualt. teſt. t.* 53. *f.* F.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 11. 12. 15. 16.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 11. *f.* 4.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 1. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 148. *f.* 1367. 1368. 1373. 1374.
& *Adanſ. Senég.* 1. *t.* 9. *f.* 35 ? Genot.
*Habitat rarior in* mari mediterraneo & indico, *teſta* 1½ *pollicem longa, in confluxu ſulcorum cum ſtriis undulata, ſulcis rubris aut fuſcis tenuibus alternatim albis ſuſcisque pictis : ſpira acuta : anfractibus faſcia utplurimum duplici ex punctis ſanguineis conflata exornatis.* caſ-

caffra. 51. V. testa emarginata tereti lævi : spiræ anfractibus plicato-striatis, columella subquadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 595. *n.* 234. *

*Gualt. test. t.* 53. *f.* E.

*Seb. mus.* 3. *t.* 49. *f.* 21. 22. 41.

*Knorr Vergn.* 5. *t.* 19. *f.* 4.

*Martin. Conch.* 4. *t.* 148. *f.* 1369. 1370.

β) *Bonann. recr. & mus. Kirch.* 3. *f.* 74.

γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 19. *f.* 5.

*Habitat rarior in* mari asiatico, *testa* 2½ *pollices longa, acuta, atra, violacea, vel flava aliquando fasciata, obsoletius vel evidentius plicata.*

Morio. 52. V. testa subemarginata tereti lævi, columella triplicata.

*Habitat - - - caffrae simillima, at testa duplo crassiore, fusca : ventre subtus linea alba unica cincto, spira non striata, columellae plicis tantum 3, iisque parvis distincta.* Spengler.

Acus. 53. V. testa turrita punctorum rubrorum seriebus transversis picta : spira acuminata lævi.

*Martin. Conch.* 4. *t.* 157. *f.* 1493. 1494.

*Habitat - - - testa vix pollicem longa alba, vel ex luteo fusca.*

Vulpecula. 54. V. testa emarginata subangulata inermi transversim striata : columella quadriplicata, fauce striata. *Mus. Lud. Ulr.* 595. *n.* 235. *

*Rumpf mus. t.* 29. *f.* R. Turricula.

*Pet. gaz. t.* 56. *f.* 1.

*Gualt. test. t.* 54. *f.* B. C.

*Seb. mus.* 3. *t.* 49. *f.* 33. 34.

*Knorr Vergn.* 3. *t.* 15. *f.* 2. & 5. *t.* 16. *f.* 3.

*Martin. Conch.* 4. *t.* 148. *f.* 1366.

β) Checkered Mitre. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 19.

*Habitat in* India, *testa vix* 2 *pollices longa angulata, elongata, costata, rufa vel flava : fasciis interdum*

*dum obſcurioribus, labro fuſco maculato, columella alba: media macula fuſca.*

plicaria. 55. V. teſta emarginata angulata: angulis anterioribus ſubſpinoſis, columella quadriplicata, labro lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 236. *

*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* S. Turricula plicata.
*Liſt. Conch. t.* 820. *f.* 37.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 64. 65.
*Gualt. teſt. t.* 54. *f.* D. E. F.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* Q.
*Klein oſtrac. t.* 5. *f.* 87.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 23. 24.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 15. *f.* 5. 6. 3. *t.* 27. *f.* 4. & 6. *t.* 12. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 148. *f.* 1362-1365.
*β) Chemn. Conch.* 10. *t.* 151. *f.* 1444. 1445.
*Habitat in* Oceano indico, *teſta ultra* 2 *pollices longa nunc craſſiori nunc tenuiori, anguſta, elongata, acuminata, transverſim ſtriata, intus caerulea albo faſciata, aut alba faſciis alterius coloris picta, extrinſecus alba, faſciis ſtriisque circularibus rubris, violaceis, cinereis aut viridibus picta, apice utroque rubro, caeruleo, aut cinereo.*

bullata. 129. V. teſta cylindrica glaberrima rufeſcente: cingulis ſublividis, ſpira obtuſa, columella infra quadriplicata, apertura effuſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 159. *t.* 150. *f.* 1409. 1410.
*Mart. Conch.* 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
*Liſt. Conch. t.* 803. *f.* 11?
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 23. *f.* 1. & *t.* 27. *f.* 1.
*Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 269.
*Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 218. *ind. p.* 206.
*Habitat in* Oceano indico.

crenulata. 130. V. teſta cylindrica decuſſatim ſtriata impreſſo punc-

punctata alba luteſcente nebuloſa : labro anfractibusque margine crenulatis nodulosis, columella octoplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 162. *t.* 150. *f.* 1413. 1414.
*Habitat in* Oceano indico.

ſcutulata. 131. V. teſta turrita atra albo maculata tranſverſim ſtriata : anfractu primo ſubventricoſo, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 151. *f.* 1428. 1429.
*Habitat in* Oceano indico.

nigra. 132. V. teſta turrita emarginata nigricante : anfractibus planiuſculis, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 151. *f.* 1430. 1431.
*Habitat ad* Guineæ, Indiæ, Groenlandiæ oras.

ſubdiviſa. 133. V. teſta turrita emarginata longitudinaliter coſtata plicata ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1434-1437.
*Habitat in* Oceano indico.

cruentata. 134. V. teſta turrita emarginata faſciata tranſverſim ſtriata : coſtis longitudinalibus nodoſis ſanguineo maculatis, columella tripticata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1438. 1439.
*Habitat in* Oceano indico.

exaſperata. 135. V. teſta turrita emarginata granuloſa, decuſſatim ſtriata, longitudinaliter coſtata fuſcoſcenti faſciata ; columella quinqueplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 172. *t.* 151. *f.* 1440. 1441.
ε) *Mart. univ. Conchyl.* 1. *t.* 21.
*Habitat in* Oceano indico.

granoſa. 136. V. teſta turrita emarginata tranſverſim ſtriata longitudinaliter fulcata, elevato punctata tu-

bescente lineata apice basique nigricante, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 173. *t.* 151. *f.* 1442. 1443.
*Habitat in* Oceano indico.

fasta. 137. V. testa turrita lævi brunnea albo fasciata: columella sexplicata basi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 174. *vign.* 20. *f.* C. D.
*Martin. Conchol.* 1. *f.* 20.
*Habitat ad* Amboinæ *littus septentrionale.*

leucozonias. 56. V. testa turrita spadicea: fasciis flexuosis albis, columellæ plicis obsoletis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 148. *f.* 1371. 1372.
*Walch Naturf.* 4. *t.* 1. *f.* 3. 4.
*Habitat* - - - *testa* 2 *pollices longa.*

maculosa. 57. V. testa turrita alba: fasciis fuscis reticulatis & maculatis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1377.
*Habitat* - - - *testa pollicem circiter longa.*

nodulosa. 58. V. testa turrita fusca cancellata: sectionum angulis nodulosis albo obumbratis, columella quadriplicata.
*Gualt. test. t.* 52. *f.* F. G.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1385.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1390.
*Habitat* - - -

spadicea. 59. V. testa turrita spadicea luteo nebulosa maculataque: spiræ anfractibus octo longitudinaliter plicatis & transverse striatis, columella quinqueplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1392.
*Habitat* - - -

aurantia. 60. V. testa turrita aurantia: spiræ anfractibus qua-

quatuor primis fascia alba, labro denticulato, columella quadriplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1393. 1394.
*Habitat* - - -

decussata. 61. V. testa flava turrita decussatim striata: striis longitudinalibus undulatis, columella subquadriplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1395.
*Habitat* - - -

polygona. 62. V. testa turrita punctata: anfractibus longitudinaliter costatis & transversim subtiliter striatis: primis tribus angulatis, labro sulcato, columella subumbilicata subquinqueplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1401. 1402.
*Habitat* - - - *testa valde elongata & acuminata alba fascia nigroque obumbrata, spirae anfractibus* 10.

acuminata. 63. V. testa turrita cancellata: cauda brevi cancellata, columella quadriplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1403. 1404.
*Habitat* Tranquebariae, *testa valde elongata lutea vel violacea: fascia nonnunquam alba: apice spirae valde acuto.*

biplicata. 64. V. testa turrita laevi alba maculis flavis punctisque nigris varia, labro acuto, columella biplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1375.
*Habitat* - - -

Terricula. 65. V. testa turrita: columella biplicata, anfractibus turgidiusculis fascia punctorum nigrorum picta; anfractu primo duplici.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1376.
*Habitat* - - -

li-

lineata. 66. V. testa turrita: lineis perpendicularibus nigris fasciam albam decussantibus, columella subtriplicata.
*Martin. Conch. 4. t. 149. f. 1378. 1379.*
*Habitat - - - minuta.*

bifcors. 67. V. testa turrita infra fusca albo punctata supra alba maculis perpenticularibus virgatis undatis flavis varia.
*Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1400.*
*β Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1405.*
*Habitat - - - testa minuta, subtus ventricosa; β magis acuminata, cana: striis ferrugineis longitudinalibus.*

striata. 68. V. testa turrita subtiliter transversim striata obscura rubro-punctata: fascius duabus dilutioribus.
*Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1406.*
*Habitat - - - minuta.*

sulcata. 69. V. testa turrita longitudinaliter sulcata fusca: fascia transversa alba nodulosa, columella quadridentata.
*Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1407.*
*Habitat - - -*

laevigata. 70. V. testa turrita lævi fusca: aperturæ limbo spiræque fascia dilutioribus.
*Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1408.*
*Habitat - - - testa angusta, parva.*

ocellata. 71. V. testa turrita spadicea: ocellis albis.
*Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1409.*
*Habitat - - - laevigata angustior, minuta.*

nasuta. 72. V. testa turrita rubra: punctis nigris seriatis, labro prominente, cauda reflexa.

*Mar-*

*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1410.
*Habitat* - - -

marmorea. 73. V. testa turrita albo fuscoque varia, labro inflexo.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1411.
*Habitat* - - -

barbadensis. 74. V. testa turrita rufescente subtiliter transversim striata: apertura oblongo-ovali, spira obtusata.
*List. Conch. t.* 819. *f.* 33.
*Habitat in* Oceano americano, *testa vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

clathrata. 75. V. testa turrita cancellata: spira obtusata, labro marginato, cauda reflexa.
*List. Conch. t.* 819. *f.* 34.
*Habitat in* Oceano americano.

tricolor. 76. V. testa turrita gibba flava: anfractibus singulis fascia alba nigro tessellata, columella triplicata.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 37.
*Habitat* - - - *testa caudata: spirae apice obtuso.*

turrita. 77. V. testa turrita brunnea lineis undatis fuscis varia: plicis horizontalibus obsoletis subnodosis, apertura striata, columella triplicata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 141. *f.* 1317. 1318.
*List. Conch. t.* 836. *f.* 62?
*Habitat* - - - *cauda prominula.*

syracusana. 78. V. testa turrita laevi alba: maculis virgatis undatis perpendicularibus ex nigro flavis.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 40.
*Habitat in* Syracusano *littore, testa angustiore & magis elongata, quam turritae.*

nitens. 79. V. testa turrita glaberrima spadicea intus alba, columella quadriplicata.
*Brann. recr. 3. f. 322.*
*mus. Kirch. 3. f. 323.*
*Habitat - - - testa pauliſper ventricoſa.*

citrina. 80. V. testa turrita citrina, fasciis rufis.
*Valent Abh. 2. t. 2. f. 12.*
*Habitat - - - testa 2½ pollices longa.*

micronata. 81. V. testa turrita dilute fusca longitudinaliter striata: spira perforata, columella perforata quadriplicata.
*Gualt. test. t. 52. f. M.*
*Habitat - - -*

rugoſa. 82. V. testa turrita subventricosa longitudinaliter rugosa transversim striata exalbida picco lineata.
*Gualt. test. t. 54. f. A.*
*Habitat - - - spirae apice acuto coſtato, labro marginato.*

ſtrigoſa. 83. V. testa turrita cinerea rubro striata, spira glaberrima; anfractibus tumidiusculis.
*Argenv. Conch. t. 9. f. V.*
*Habitat - - -*

foſſilis. 84. V. testa turrita glaberrima, columella quinqueplicata.
*Argenv. Conch. t. 29. f. 6. b.*
*Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta.*

leucoſticta. 85. V. testa turrita tenui glabra fusca: lineis punctorum alborum cincta.
*Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 7.*
ε) Knitted Mi r.. *Mart. univ. Conch. 1. t. 22.*
*Habitat ε) ad* insulas amicas.

Cla-

Clathrus. 86. V. testa turrita exalbida cancellata: anfractibus fascia macularum flavarum.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 27. *f.* 3.
*Habitat* - - -

virgata. 87. V. testa turrita transversim costata, fascia transversa maculisque longitudinalibus undatis fuscis varia.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 11. *f.* 2.
*Habitat* - - - *testa crassa* 2 *pollices longa*: *apertura alba*, *costis squamatis*.

leucostoma. 88. V. testa turrita cancellata spadiceo alboque varia: maculis undatis fuscis, apertura ochroleuca.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 11. *f.* 3.
*Habitat* - - -

variegata. 89. V. testa turrita transversim striata flava: fascia maculisque fuscis, pluribusque minoribus albis.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 18. *f.* 6.
*Habitat* - - -

filaris. 122. V. testa emarginata subturrita tereti decussatim striata succincta filis rubris, columella triplicata. *Mant.* 2. *p.* 548.
*Habitat* - - - *testa pallida*, *fusiformi longitudine extimi pollicis*, *fauce alba labiis simplicibus*, *anfractibus* 3 *quasi filis rubris moniliformibus*, *infimo* 12 *cinctis*.

Volva. 126. V. testa cylindrica albida glabra: spira protensa obtusa basi emarginata, apertura exilis, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1389. 1390.
*Habitat ad* Guineæ *littus*, *ultra* 2 *pollices longa testa*.

Vici-

Zierowelii. 127. V. testa ovata badia longitudinaliter rugosa, infra transversim sulcata: spira obtusa ad suturam crenata, columella quadriplicata, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 156. *t.* 149. *f.* 1406.
*Habitat* - - -

Rhinoceros. 128. V. testa ovato-trigona rugosa, nodosa transversim sulcata umbilicata: anfractibus muricato-nodosis, columella triplicata, labro dentato, fauce striata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 157. *t.* 150. *f.* 1407. 1408.
*Habitat ad* novae Guineae *littora.*

costata. 90. V. testa turrita alba: spira striis subtilissimis transversis costis-que rotundatis; anfractu primo fasciis tribus fuscis, columella quadriplicata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 17.
*Habitat* - - - *cauda labre flexa: striis sex obliquis.*

spuria. 91. V. testa ovata alba: spira fusco maculata; anfractu primo fasciis sex fuscis, cauda emarginata, labro impresso, columella sexplicata.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 16.
*Habitat* - - - *anfractibus punctis nigris seriatis pictis.*

pertusa. 92. V. testa emarginata striata punctis pertusis, labro denticulato, columella quinqueplicata.
*Mus. Lud. Ulr.* 596. *n.* 237. *
*List. Conch. t.* 822. *f.* 40.
*Seb. mus.* 3. *t.* 50. *f.* 28. 47-49.
*Guait. test. t.* 54. *f.* H.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 3. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 147. *f.* 1361.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 6.
γ) *Favann. Conch. t.* 31. *f.* D³.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 151. *f.* 1432. 1433.

*Habitat rarior in* India, *testa 3 pollices longa, anfractibus & gutta fusca striis obscurioribus longitudinalibus & elevatis transversis, quibus granula planiuscula insident.*

Cardinalis. 93. V. testa emarginata transversim striata alba; maculis spadiceis utplurimum tessellatis fornicatis, columella quinqueplicata.

*List. Conch. t.* 838. *f.* 65.
*Gualt. test. t.* 53. *f.* G. 2.
*Seb. mus.* 3. *t.* 50. *f.* 50. 51. & *t.* 51. *f.* 6. 7.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 28. *f.* 3.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 9. *f.* 11. 12.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 147. *f.* 1358. 1359.
*Habitat in* Oceano indico, *pertusae affinis, at testa magis ventricosa & obtusa.*

episcopalis. 94. V. testa emarginata laevi: anfractuum margine integro, labro denticulato, columella quadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 598. *n.* 237.*
*Rumph. mus. t.* 29. *f.* K. Mitra episcopi.
*List. Conch. t.* 839. *f.* 66.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 120.
*Gualt. test. t.* 53. *f.* G. 1.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* C. Mitra.
*Seb. mus.* 3. *t.* 51. *f.* 8-19.
*Bytem. upp. t.* 11. *f.* 47.
*Knorr delic. t.* B. III. *f.* 3.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 6. *f.* 2.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 33.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 147. *f.* 1360. 1360*.
*Habitat in* India, *instrumento venenato, ut perhibent, tangentem & carnes edentem laedens; testa ab incolis insulae australis* Tenna *manubriis virgata securis loco adhibita, angusta, 5 pollices longa, sub epidermide sordide flava alba violaceisque rubris, rarius flavis, utplurimum quadratis, interaum confluentibus varia; spirae anfra-*

zi-

*ctibus 2 primis glabris, reliquis ſubtiliter tranſverſim ſtriatis.*

papalis. 95. V. teſta emarginata tranſverſim ſtriata; anfractuum margine labroque denticulatis, columella quadriplicata.

*Liſt. Conch. t.* 839. *f.* 67. Buccinum dentatum.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 119. Turbo Thiara.
*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* I. Mitra papalis.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* E. Thiara.
*Gualt. teſt. t.* 53. *f.* I. 1.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 51. *f.* 1-5.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 6. *f.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 147. *f.* 1353. 1354.
β) *Liſt. Conch. t.* 840. *f.* 68.
*Valent. Abh. t.* 5. *f.* 45.
*Gualt. teſt. t.* 53. *f.* I. 2.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 51. *f.* 37.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 28. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 147. *f.* 1355. 1356.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 29. 30?
*Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 145. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 8.
*Habitat rarior in* Oceano indico, *potiſſimum ad* Ceram ex moluccis inſulis, *epiſcopali aequalis & affinis, maculis ſaepius confluentibus, ſpirae anfractibus exterioribus foraminalis pertuſis.*

patriarchalis. 138. V. teſta obovata ſolida tranſverſim ſtriata albida croceo & ruſeſcente ſtriata, noduloſo plicata; columella quadriplicata, anfractibus tuberculis coronatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 166. *t.* 150. *f.* 1425. 1426.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 167. *t.* 150. *f.* 1427.
*Habitat in* Oceano indico.

rufica. 96. V. teſta marginata: anfractibus ſpinis obtu-

fis, columella octoplicata, labro lævi crassiusculo. *Mus. Lud. Ulr.* 597. *n.* 239. *

*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* F. Papyrus musica.
*List. Conch. t.* 805. *f.* 14. & *t.* 806. *f.* 15.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 296-208.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 297-299.
*Gualt. test. t.* 28. *f.* x. Z. z.
*Olear. mus. t.* 30. *f.* 4. 7.
*Lochner mus. Besler t.* 21. *f.* 7.
*Bytem. app. t.* 8. *f.* 48.
*Mus. Gottwald. t.* 16. *f.* 115. a. b. c. 117. a. b. c. d. 118. a. b. 119. b-f.
*Seb. mus.* 3. *t.* 57. *f.* 7-21-22 ?
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 1. 2. *t.* 15. *f.* 4. 5. 3. *t.* 12. *f.* 1. & 6. *t.* 23. *f.* 1.
*Murray testaceol. t.* 1. *f.* 17.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 3. *f.* 2.
*Spengl. selt. Conch. t.* 2. *f.* G.
*Martini. Conch.* 3. *t.* 95. *f.* 926-933.
*a*) *List. Conch. t.* 812. *f.* 21 ?
*b*) *List. Conch. t.* 812. *f.* 22.
*c*) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1403. 1404.
*d*) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1401. 1402.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 12. *f.* 1.
*Habitat in* Oceano americano, *testa pluribus fasciis transversis ex lineis fuscis parallelis, interstitis punctis guttisque conflatis, notas musicas quodammodo referentibus notata, exalbida, rarius olivacea (fasciis tunc 8 albis punctisque fuscis varia), nunc magis elongata & fusiformi, nunc breviore magisque ventricosa, spinis nunc acutioribus & longioribus, nunc brevioribus & magis obtusis, columellae plicis interdum 9-12.*

Vesper-tilio. 97. V. testa emarginata: anfractibus spinis acutis, columella quadriplicata, labio lævi. *Mus. Lud. Ulr.* 598. *n.* 240. *
*Rondel. test.* 78. Murex caracoides arabica. *Rumph.*

*Rumpf. muſ. t.* 32. *f.* H. Veſpertilio.
*Liſt. Conch. t.* 807. *f.* 16. *& t.* 808. *f.* 17.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 294. 305.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 295. 306.
*Valent. Abh. t.* 1. *f.* 1. *& t.* 7. *f.* 62.
*Gualt. teſt. t.* 28. *f.* F. G. I. M. V.
*Klein oſtr. t.* 5. *f.* 89.
*Muſ. Gottwald. t.* 17. *f.* 121. a. b. c. *f.* 122. a. b. c. *& f.* 123. a. b.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 4. 5. *& t.* 67.
*Knorr. delic. t.* B. VI. *f.* 5.
*Vergn.* 1. *t.* 22. *f.* 3. *&* 2. *t.* 6. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 97. *&* 98. *f.* 936-940.
ε) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* T ?
ϛ) *Valent. Abh. t.* 7. *f.* 63 ?
*Naturf.* 19. *t.* 1. *f.* 3. 3ª.
ϛ) *Spengl. ſelt. Conch. t.* 2. *f.* AA.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 97. *f.* 934. 935.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 888. 889.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149 *f* 1397. 1398.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1399. 1400.
*Habitat in* mari indico, *teſta* 3-6 *pollices longa alba, vel luteſcente, vel ſulfulva lineis angularibus maculisque ſpadiceis fuſcisve varia, nunc productiore, nunc magis ventricoſa, ſpinis nunc longioribus & acutioribus, nunc brevioribus & magis obtuſis.*

arabica. 144. V. teſta emarginata: anfractibus tuberculatis characteribus nigris pictis, columella quadriplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 52.
*Habitat ad* novam Seelandiam.

hebræa. 98. V. teſta emarginata: anfractibus ſpinis ſubacutis, columella plicis quinque validioribus triousque obſoletis.
*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* D. Lignum venoſum.
*Liſt. Conch. t.* 809. *f.* 18.

*Bo-*

*Bonann. recr.* 3. *f.* 293.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 292.
*Gualt. teſt. t.* 28. *f.* Z. 1.
*Olear. muſ. t.* 30. *f.* 5. 6.
*Muſ. Gottwald. t.* 16. *f.* 115. c. 199. a.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 1. 2. 3. 6.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. & 6. *t.* 15. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 96. *f.* 924. 925.
*Habitat ſat pretioſa in* India *& ad* Jamaicam, *teſta ad* 6 *pollices longa, lineis ſpadiceis tranſverſis, non raro longitudinales, interdum undulatas, decuſſantibus, varia.*

Turbinellus. 99. V. teſta integriuſcula turbinata: ſpinis conicis erectiuſculis; ſuperioribus majoribus, columella quadriplicata.
*Muſ. Lud. Ulr.* 634. *n.* 307. * Murex Turbinellus.
*Rumpf muſ. t.* 24. *f.* B. Verrucoſa ſecunda.
*Liſt. Conch. t.* 811. *f.* 20.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 373.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 367.
*Gualt. teſt. t.* 26. *f.* L.
*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* P.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 76. 77. & *t.* 60. *f.* 8.
*Muſ. Gottwald. t.* 11. *f.* 79. a. b.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 2. *f.* 3. & *t.* 13. *f.* 2. 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 18.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 944.
*Habitat paulo rarior in* Oceano indico *ad Amboinam & Nuſſaanam, teſta brevi* 3 *circiter pollices longa, alba, extrinſecus fuſco faſciata.*

Capitellum. 100. V. teſta ovata rugoſa nodoſa, columella triplicata.
*Muſ. Lud. Ulr.* 633. *n.* 306. * Murex Capitellum.
*Liſt. Conch. t.* 810. *f.* 19.

Bo-

*Bonann. recr.* 3. *f.* 270.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 272.
*Gualt. teſt. t.* 37. *f.* A.
*Argenv. Conch. t.* 15. *f.* K.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 20. *f.* 6. & *t.* 35. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 947. 948.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 949. 950.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 35. *f.* 4.
*Habitat in* Oceano indico & americano, *murici truncolo affinis, teſta craſſa, 2½ pollices longa alba, interdum fuſco faſciata, decuſſatim coſtata.*

ceramica. 101. V. teſta ovata acuta: ſpinis divergentibus, columella ſubquinqueplicata.
*Muſ. Lud. Ulr.* 634. *n.* 286. * Murex ceramicus.
*Rumpf muſ. t.* 24. *f.* A. & *t.* 49. *f.* L. Verrucoſa ceramica.
*Liſt. Conch. t.* 829. *f.* 51.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 286.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 287.
*Gualt. teſt. t.* 55. *f.* D.
*Argenv. Conch. t.* 15. *f.* E.
*Leſſer teſt. coeth. f.* 76.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 2. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 943.
β *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 20. *f.* 6.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
*Habitat varior ad* Coromandel & *inſulam* Ceram, *turbinello affinis, teſta alba lineis aurantiisque faſciis varia, craſſa, ſpinis in anfractibus extimis in tubercula abeuntibus.*

Pyrum. 102. V. teſta obovata ſubcaudata: ſpiræ anfractibus ſcalatis; apice producto glaberrimo, columella triplicata.
*Liſt. Conch. t.* 815. *f.* 25.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher* 3. *f.* 194.
*Gualt. teſt. t.* 46. *f.* C.

*Muſ.*

*Muſ. Gottwald. t.* 33. *f.*221. a. *f.*222. b. & *t.*34. *f.* 221. a.
*Knorr Vergn.* 6. *f.* 39. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 95. *f.* 916. 917.
β) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 26.
*Rumpf muſ. t.* 36. *f.* 7?
*Klein. oſtrac. t.* 4. *f.* 79a?
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 27. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 95. *f.* 918. 910.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 884. 885.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 886. 887.
*Habitat in* Tranquebar & *inſulam* Zeylon, *teſta ultra* 7 *pollices longa, transverſim undulata, pallida, maculis minutis parallelogramis ſeriatis varia, apice cylindrico, baſi angulato glaberrimo obtuſo, cauda exſerta patula integra.*

lapponica. 103. V. teſta obovata lævi: ſpira acuminata, ventre dilatato.
*Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 3. Murex lapponicus.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 25. 26.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 872. 873 & *t.* 95. *f.* 920. 921.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 4.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 395.
*Habitat rarior in* Oceano indico & americano, *teſta ochroleuca fuſco-punctata aut lineata, rarius undulata, columella quinqueplicata.*

Vexillum. 104. V. teſta ventricoſa flavicante aurantio ſtriata: anfractu primo reliquis triplo majore tuberculato.
*Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 2.
*Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 1. *f.* 1.
*Spengl. ſelt. Conch. t.* 1. *f.* FF.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 120. *f.* 1098.
*Favan. Conch. t.* 33. *f.* O.[1].

Kne-

*Kaemmer. Rudolſt. Cab. t. 8. f. 1. 6.*
*Chemn. Conch. 10. vign. 20. f. A. B.*
*Habitat rariſſima in* Oceano indico.

flavicans. 105. V. teſta pyriformi lævi flavicante nebulosa: ſpira maculis ſpadiceis varia, columella quadriplicata.
*Seb. muſ. 3. t. 67. f. a. b.*
*Martin. Conch. 3. t. 95. f. 922. 923.*
*Habitat rariſſima.*

rupeſtris. 106. V. teſta clongata coſtata: coſtis lineas transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella multiplicata, ſpiræ apice papillari.
*Martin. Conch. 3. t. 98. f. 941. 942.*
*Habitat - - - teſta ad 4 fere pollices longa, flaveſcente ſubjuſco undulata.*

Naſſa. 107. V. teſta ventricoſa: ſpira coſtata; coſtis ſtrias transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella triplicata umbilicata.
*Seb. muſ. 3. t. 53. f. 42.*
*Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 6.*
*Martin. Conch. 4. t. 124. 125. f. 1172. 1173.*
*Habitat ad inſulam S. Mauritii & Guineam, teſta ultra pollicem longa ſubfuſca: lineis teneris albis.*

craticulata. 108. V. teſta turrita transverſim ſtriata alba: coſtis longitudinalibus ſpadiceis, labro denticulato ſtriato, columella triplicata.
*Liſt. Conch. t. 919. f. 13. & t. 967. f. 22.*
*Seb. muſ. 3. t. 50. f. 55. 56. & t. 51. f. 31. 32.*
*Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 6.*
*Martin. Conch. 4. f. 1382. 1383.*
*Habitat - - - teſta vix 3 pollices longa.*

ſpiralis. 109. V. teſta longitudinaliter coſtata transverſim ſub-

subtiliter striata : anfractibus duobus primis serie tuberculorum acutorum, columella triplicata.

*Rumpf amb. t.* 20. *f.* X. Buccinum spirale.

*Habitat in* mari indico, *testa cinerea, fusca aut alba, phalangis digiti longitudine, basi angusta, emarginata, sub-reflexa.*

magellanica. 110. V. testa subventricosa ochracea lineis albis, fuscisque varia, labro subulato : spiræ anfractibus convexis ; primo reliquis triplo majore.

*Knorr Vergn.* 6. *t.* 29. *f.* 1. 2.

*Favann. Conch. t.* 28. *f.* E.

*Chemn. Conch.* 10. *t.* 148 *f.* 1383. 1384.

β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2.

*Habitat rarior in* freto magellanico, *testa* 4½ *pollices longa : spirae anfractibus* 6-7 ; *in* β) *testa* 2 *pollices longa magis elongata, in mucronem acutum terminata, spirae anfractu primo obscurius undulato.*

filosa. 111. V. testa tenuissime reticulato striata : cingulis elevatis transversis, columella quadriplicata, labro crenato. *v. Born mus. Caes. Vind. test. t.* 9. *f.* 9. 10.

*Habitat rarior - - - testa alba : cingulis* 16 *fuscis, quorum* 4 *in spira, columella umbilicata.*

fuscata. 112. V. testa rudi fusca lævi ; basi transversim striata, spira obtusata ; anfractu primo ventricoso fasciis quatuor angustis, reliquis fascia lata alba, columella umbilicata triplicata.

*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 15.

*Habitat - - -*

Ven-

***** Ventricosæ, *spirae apice papillari.*

æthiopica. 113. V. testa emarginata: spira coronata spinis fornicatis, columella quadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 598. *n.* 241.*

*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *t.* 1. Latina.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* F. Corona æthiopica.
*List. Conch. t.* 797. *f.* 4. & *t.* 801. *f.* 7. b.
*Rumpf mus. t.* 31. *f.* A. B.
*Gualt. test. t.* 29. *f.* H. I.
*Lesser testaceoth. f.* 55.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 1. 2. 4. *t.* 65. *f.* 1. 2. 4. 10-12. & *t.* 66. *f.* 1-3. 6-10. 15.
*Mus. Gottwald. t.* 9. *f.* 64. a. & *f.* 61. b.
*Knorr delic. t.* B. VI. *f.* 2.
*Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 73-76. *f.* 777-788.
ε) *List. Conch. t.* 798. *f.* 5 ?
ϛ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1387. 1388.
*Habitat rarior in* mari persico, *ad insulam* Asiæ Kei, *ad* caput bonæ spei, *testa ad* 7-8 *pollices longa flavicante maculata, interdum fasciata, nunc brevisre magisque ventricosa, nunc magis elongata, spinis nunc longioribus, nunc brevioribus, nunc latioribus, nunc angustioribus, papilla nonnunquam detrita.*

Cymbium. 114. V. testa emarginata: spiræ anfractibus canaliculato marginatis, columella qaadriplicata. *Mus. Lud. Ulr.* 599. *n.* 242.
*Column. purp.* 29. *t.* 30. *f.* 3. Cochlea altera magna.
*Adans. Seneg. t.* 3. *f.* 1. Yet.

*List.*

---

*An huic forsan tribui accensendæ cochleæ ab* Arzenville *zoomorph. t.* 3. *f.* G. *a* Seba *mus.* 3. *t.* 53. *f.* 6. *a* Bytemeister *appar. t.* 11. *f.* 41. a. b. & *in* museo Gottwaldiano *t.* 8. *f.* 52. & 62. d. *t.* 16. *f.* 120. a. c. & *t.* 36. *f.* 239. *delineatæ?*

*Liſt. Conch. t.* 796. *f.* 2. & *t.* 800. *f.* 7.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 2.
*Gualt. teſt. t.* 29. *f.* B.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* G.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 65. *f.* 3. *t.* 8. 9. & *t.* 66. *f.* 5.
*Knorr delic. t.* B. VI. *f.* 3.
*Vergn.* 2. *t.* 30. *f.* 1.
*Spengl. ſelt. Conch. t.* 1. *f.* N.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 70. *f.* 762-765.
*Habitat ad* Africam, *in* mari hiſpanico & americano, *rarior*, *teſta nunc breviore & latiore, nunc longiore & anguſtiore*, *laevi*, *nonnunquam maculis fuſcis, interdum undatis variegata*, *labro calloſo.*

Olla. 115. V. teſta emarginata: ſpira laevigata, columella ſubtriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 245.
*Aldrov. exſang.* 560. Concha perſica.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 3. *f.* 2. Philin.
*Column. aq. t.* 69. *f.* 4. 6.
*Liſt. Conch. t.* 794. *f.* 1.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 6.
*Gualt. teſt. t.* 29. *f.* A.
*Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* H.
*Klein oſtr. t.* 5. *f.* 97.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 54.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 66. *f.* 13. 14. 16. 18.
*Muſ. Cortevalá. t.* 10. *f.* 68. & 68. a. b. c.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 71. *f.* 766.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 14.
*Habitat ad* insulas Philippinas, *in* mari americano, æthiopico, hiſpanico, *teſta ad* 4 *uſque pollices longa*, *flavicante aut rufeſcente*, *varius fuſco varia*, *latiore*, *quam in cymbio.*

ampla. 116. V. teſta elongata: apertura ampla, labro acuto, ſpiræ anfractibus occultis.

*Mar-*

*Martin. Conch.* 2. *t.* 65. *f.* 722-724.
*Habitat* - - - *testa alba aut fusca* 1½ *pollicem circiter longa.*

Neptunus. 117. V. testa emarginata sub epidermide fusca rufescente: labro prominulo, columella quadriplicata.
*List. Conch. t.* 802. *f.* 8.
*Gualt. test. t.* 27. *f.* AA.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 3. *t.* 65. *f.* 3. 7. & *t.* 66. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 71. *f.* 767.
*Habitat in* sinu persico, *testa ad* 8 *pollices longa & aeque fere lata: spirae anfractibus* 4.

Navicula. 118. V. testa emarginata: labro prominulo, columella subquadriplicata.
*List. Conch. t.* 795. *f.* 2.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 10. 11. & *t.* 66. *f.* 11. 12. 17.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 71. *f.* 768-771.
*Habitat* - - - *V. Neptuni satis affinis, at testa minore vix ultra* 2 *pollices longa, nunc unicolore ochroleuca, rufescente aut spadicea, nunc maculata aut marmorata.*

papillaris. 119. V. testa elongata: apicis papilla elongata.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 9.
*Mus. Gottwald. t.* 10. *f.* 69.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 7.
*Habitat* - - - *papilla interdum obliqua.*

indica. 120. V. testa elongata flava: fasciis tribus macularum fuscarum, columella quadriplicata.
*Mus. Gottwald. t.* 10. *f.* 64.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 8. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 72. *f.* 772. 773.
*Habitat in* mari indico, *testa angusta: spirae anfractibus* 5.

Scapha. 121. V. testa rudi nebulosa: lineis angularibus fuscis, columella cæruleſcente quadriplicata, labro subalato.
*List. Conch. t.* 799. *f.* 6.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 10.
*Gualt. test. t.* 28. *f.* S.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 5. 6.
*Klein ostr. t.* 5. *f.* 94.
*Lesser testaceoth. f.* 56.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 72. *f.* 774-776.
*Habitat pretiosa ad* caput bonæ spei, *testa brevi, lata, alba, vel flavicante: apertura ampla, spirae anfractibus* 6.

Cymbiola. 123. V. testa ovata glabra subalbida: lineis longitudinalibus sanguineis: anfractibus nodosis, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1385. 1386.
*Habitat in* Oceano indico, *testa* 2 *pollices longa.*

Præputium. 124. V. testa subovata testacea: maculis ex rufescente badiis, columella quadriplicata basi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1391. 1392.
*List. Conch. t.* 798. *f.* 1.
*Seb. mus.* 3. *t.* 66. *f.* 11?
*Habitat ad* littus Coromandel.

Glans. 125. V. testa cylindrica lutescente, columella triplicata emarginata, apertura effusa patente.
*Chemn. Conch.* 10. *p.* 144. *t.* 148. *f.* 1393. 1394.
*Seb. mus.* 3. *t.* 64. *f.* 9-11. & *t.* 66. *f.* 13. 14.
*Habitat ad* occidentale Africæ *littus.*

reticulata. 141. V. testa alba lævi aureo reticulata emarginata, columella quadriplicata: spira conica; anfractu primo cylindrico ventricoso. *Kaemm. Cab. Rudolst. p.* 68. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. 2. *Ha-*

*Habitat ad* Javam, *testa ultra 2 pollices longa.*

fretabilis. 142. V. testa flavido-fuscescente fusco striata: columella triplicata. *Knemm. Cab. Rudolst. p.* 69. *t.* 7. *f.* 1.
*Davil. catal.* 1. *t.* 8. *f.* 8.
*Habitat in* freto magellanico, *testa* 5½ *pollices longa.*

323. BUCCINUM. *Animal* Limax.
*Testa* univalvis, spiralis, gibbosa.
*Apertura* ovata, definens in canaliculum (s. retusam latinam) dextrum, cauda retusum.
*Labium* interius explanatum.

**a* Ampullacea, inflata, rotunda, tenuis, subdiaphana fragilia.*

Oceanum. 1. B. testa subrotunda cincta sulcis obtusis lineola elevata interstinctis: apertura edentula.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 6. Minjac.
*List. Conch. t.* 985. *f.* 44.
*Pet. gaz. t.* 99. *f.* 11.
*Rumph mus. t.* 27. *f.* D.
*Gualt. test. t.* 44. *f.* T.
*Klein ostr. t.* 4. *f.* 74.
*Mus. Gottwald. t.* 27. *f.* 188. a. c. & 189. a. d.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 117. *f.* 1076. 1077.
*Habitat in* mari indico, *testa vix ultra 4 pollices longa, fusca aut subfusca crebro maculis nebulisque obscurioribus varia, spirae anfractibus 5 inflatis sulco discretis.*

Ga-

Galea. 2. B. testa obovata cincta sulcis anterius geminatis, apertura edentula.

*List. Conch. t.* 898. *f.* 18.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 183.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 179.
*Gualt. test. t.* 42. *f.* AA.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 116. *f.* 1070.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 308. *t.* 2. *f.* 1.
*β) Bonann. recr.* 3. *f.* 26.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 25.

*Habitat in* mari mediterraneo & adriatico, *testa ochroleuca caput humanum magnitudine interdum aequante, fere globosa columella umbilicata.*

Perdix. 3. B. testa ovata inflata subsulcata alboque undulata, apertura edentula. *Mus. Lud. Ulr.* 600. *n.* 244. *

*Column. aq. t.* 69. *f.* 5. Cassida neritoides minor variegata.
*Rumpf mus. t.* 27. *f.* C. Cochlea pennata.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* A. Perdix.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 5. Tesan.
*List. Conch. t.* 984. *f.* 43.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 191.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 189.
*Gualt. test. t.* 51. *f.* F.
*Seb. mus.* 3. *t.* 68. *f.* 12. 13. 16.
*Mus. Gottwald. t.* 27. *f.* 1. 2.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 8. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 117. *f.* 1078-1080.

*Habitat in* mari indico, æthiopico, americano, *testa ad* 6 *pollices longa lutea albo-pennata, undulata vel undata, costis complanatis, columella umbilicata, spirae anfractibus* 5-6 *prominentibus convexis, sulco laevi parum interstinctis.*

Pomum. 4. B. testa ovata cincta sulcis obtusis, apertura dentata. *Mus. Lud. Ulr.* 600. *n.* 245. *

*Rumpf*

*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* 4. *&* *t.* 27. *f.* B. Cochlea ſtriata altera.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 22.
*Gualt. teſt. t.* 51. *f.* C.
*Argenv. Conch. t.* 27. *f.* L.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 3. 4.
*Muſ. Gottwald. t.* 27. *f.* 184. C.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 36. *f.* 370. 371.
ε) *Liſt. Conch. t.* 792. *f.* 45 ?
*Habitat ad* Javam Amboinam, Mexico, *teſta* 2½ *pollicem circiter longa, craſſa, alba, flavo vel rufeſcenti maculata, ſpirae anfractu primo coſtis* 12-14 *luteſcentibus inaequali, apice ſummo nitido.*

Dolium. 5. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis remotis: cauda prominula. *Muſ. Lud. Ulr.* 601. *n.*246.*
*Rond. teſt.* 106. Cochlea rugoſa.
*Rumpf muſ. t.* 27. *f.* A. Cochlea ſtriata S. Olearia.
*Calceol. muſ.* 30. *t.* 41.
*Liſt. Conch. t.* 899. *f.* 19.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 16. 17. 25.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 16. 17. 28.
*Gualt. teſt. t.* 39. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 9-11. *&* *t.* 70. *f.* 1. 2. 5.
*Muſ. Gottwald. t.* 27. *f.* 185. b. *&* *f.* 188. b.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 8. *f.* 4.
*Martin. Conch. t.* 3. *f.* 116-118. *f.* 1072-1075. 1082.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 6 ?
*Habitat in* mari ſiculo, africano, indico, *galeae ſatis aequalis, & perquam affinis, at teſta multo tenuiore, alba, interdum fuſco maculata, columella torta.*

caudatum. 6. B. testa ovata cincta costis rotundatis: prominula. cauda

*Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 4.*
*Martin. Conch. 3. t. 118. f. 1083.*
*β?) List. Conch. t. 940. f. 36.*
*Klein ostr. t. 3. f. 61.*
*Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 5.*
*Habitat - - - testa fusca umbilicata: apertura ampla, labro plicato intus dentato, spirae anfractibus 6 brevibus inflatis, in β) testa 1¾ pollicis longa, tenui, straminea, in costis fuscescente, spirae anfractibus tenuissime horizontaliter lineatis.*

niveum. 7. B. testa nivea costata: spiræ anfractibus extremis vix prominulis.

*Knorr Vergn. 6. t. 36. f. 5.*
*Habitat - - - testa vix dimidium pollicem alta lataque; an distincta hujus tribus species?*

elathratum. 8. B. testa ovata longitudinaliter rugosa transverse plicata: cauda brevi recurva. *v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t. 9. f. 17. 18.*
*Habitat - - - testa dilute cinerea, sectionum angulis nodulosis, spira acuta prominula, labio crenato intus sulcato; an hujus tribus?*

*b* Cassidea caudata, *cauda exserta brevi reflexa, labro extrorsum inermi.*

echinophorum. 9. B. testa cingulis quatuor tuberculosis, prominente. *Mus. Lud. Ulr. 601. n. 247.* cauda

*List. Conch. t. 1003. f. 68.*
*Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 18. 19.*
*Rumpf mus. t. 27. f. 1.*
*Gualt. test. t. 43. f. 3.*
*Argenv. Conch. t. 17. f. P.*
*zoomorph. t. 3. f. H.*

Gi-

*Ginann. adr.* 2. *t.* 5. *f.* 43.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 18.
*Muſ. Gottwald. t.* 25. *f.* 164. & *t.* 27. *f.* 186.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 17. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 41. *f.* 407. 408.
ε) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. e?
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 160.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 162.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f* 71. f?
*Habitat frequens in* mari adriatico & mediterraneo, *teſta fuſceſcente intus tuberculisque albis tranſverſim ſtriata, umbilicata, ſpira pyramidata, cauda elongata in altum flexa, labro nitido laevigato, cingulis nonnunquam* 5.

plicatum. 10. B. teſta anterius ſubplicata decuſſatim ſubſtriata: apertura dentata, cauda recurva.
*Argenv. Conch. t.* 15. *f.* D? Caſſis.
*Liſt. Conch. t.* 1002. *f.* 67.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 156.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 161.
*Gualt. teſt. t.* 80. *f.* C.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 379. 380.
ε) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 28. *f.* 1.
*Favann. Conch. t.* 25. *f.* D⁴.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *n.* 1. 2.
*Chemn. Conch.* 10. *p.* 191. *t.* 153. *f.* 1459. 1460.
γ) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
*Habitat paulo rarior ad* Jamaicam, *teſta cinerea aut rufeſcente ad ſpirae baſin aliquando ſeriatim tuberculata, rarius ſtriis evidentibus longitudinalibus, aut cancellata.*

cornutum. 11. B. teſta turbinata ſcrobiculis punctata coronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249. *
*Rond. teſt.* 2. 77. Murex triangularis.
*Liſt. Conch. t.* 1006. *f.* 70.

*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 155.
*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* 1.
*Gualt. teſt. t.* 40. *f.* D.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 46.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 7. 8. 17. 18.
*Muſ. Gottwald. t.* 24. *f.* 159. aa. bb.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 33. *f.* 348. 349.
β) *Liſt. Conch. t.* 1008. *f.* 71. b.
*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* A.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 35. *f.* 362.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1009. *f.* 71. c.
*Habitat in* India, *teſta ad* 9, β) 12 *pollices longa, alba: maculis rufeſcentibus aut ſpadiceis, interdum undatis.*

rufum. 12. B. teſta decuſſatim ſtriata: cingulis nodoſis interſtinctis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 250. *
*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* B. Caſſida rubra.
*Barrel. rar. t.* 1325. *f.* 29.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 328. 329.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 326. 327.
*Gualt. teſt. t.* 40. *f.* F.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 3. 4. 9.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 9. *f.* 2? & 4. *t.* 1.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 69.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 32. *f.* 341. & *t.* 33. *f.* 346. 347.
*Habitat rarior in* mari americano & indico, *teſta fuſca rufeſcente alboque varia, apertura coccinea: dentibus longis albis: ſulcis intermediis nigris.*

tubero- ſum. 13. B. teſta cingulis duobus tuberculoſis, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249. *
*Labat it.* 5. *p.* 262.
*Liſt. Conch. t.* 1004. *f.* 69 ? Bo-

*Bonann. recr.* 3. *f.* 323.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 322.
*Gualt. teſt. t.* 41. *f.* A. A. A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 5. 6. 10. 11. 14. 15.
*Muſ. Gottwald. t.* 23. *f.* 159. a. b.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 10. *f.* 1. 2.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 34. *f.* 359. & *t.* 38. *f.* 381. 382.
*Schroet. inner. Bau Conch. t.* 4. *f.* 4.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2?
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 1.
*Habitat in* Oceano americano, *teſta ad* 10 *pollices longa, rubro aut fuſco maculata & undata, adulta ſubtriangulari, decuſſatim ſtriata: cingulis interdum* 3-4, *aperturae dentibus albis: intermedio nigro.*

flammeum. 14. B. teſta ſubplicata ſubcoronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 251. *
*Liſt. Conch. t.* 1005. *f.* 72.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 156.
*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* 2.
*Valent. Abh. t.* 11. *f.* 99. 100.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 19. 20.
*Muſ. Gottwald. t.* 23. *f.* 160.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 34. *f.* 353. 354.
*Spengl. ſelt. Conch. t.* 3. *f.* D.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 16.
γ) *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 9. Buccinum ſpinoſum.
*Habitat in* Oceano americano, *teſta* 5 *fere pollices longa, alba, maculis fuſcis undatis varia: apertura maculis* 7 *nigris notata; dentibus validis obtuſis, columella tranſverſim albo-coſtata.*

Teſticulus. 15. B. teſta obovata decuſſatim ſtriata lævigata: ſtriis elevatis longitudinalibus, apertura dentata,

ta, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 252.*
*Liſt. Conch. t.* 1001. *f.* 66.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 162.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 163.
*Rumpf muſ. t.* 23. *f.* 3.
*Valent. Abh. t.* 7. *f.* 59.
*Gualt. teſt. t.* 39. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 72. *f.* 17-21.
*Muſ. Gottwald. t.* 22. *f.* 145-149.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 8. *f.* 2. & 4. *t.* 6. *f.* 1.
*Bytem. app. t.* 11. *f.* 46.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 375-376.
*e) Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 377. 378.
*Habitat in* mari indico & americano, *teſta ad* 4 *pollices longa alba, aut rufeſcente, utplurimum flavo-maculata, labio interiore obliterato, exteriori ochroleuco fuſco-maculato, columellae plicis dentibusve albis.*

decuſſatum. 16. B. teſta decuſſatim ſtriata lævigata: ſquamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 253. *
*Rondel. teſt.* 83. *f.* 1. Buccinum parvum.
*Liſt. Conch. t.* 1000. *f.* 65.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 157.
*Gualt. teſt t.* 40. *f.* B.
*Muſ. Gottwald. t.* 23. *f.* 154. b. c. *f.* 156. a. 157. a. b.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 10. *f.* 3. 4.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 35. *f.* 360-361. 367. 368.
*Habitat in* mari mediterraneo & africano, *teſta alba, frequenter fuſco aut teſſellata aut undulata; labio exteriori rugoſo, valido, lato, interius crenato, interiore punctis eminentibus aſpero.*

Areola. 17. B. teſta ſubſtriata maculis quadratis quadrifariam cincta; apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 254. *

Rumpf

*Rumpf muſ. t.* 25. *f.* B. C. 1. 2. 5. Areola.
*Adanſ. ſeneg.* 1. *t.* 7. *f.* 8. Saburon.
*Liſt. Conch. t.* 1012. *f.* 76.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 20. 21. 154?
*Valent. Abh. t.* 9. *f.* 77.
*Klein. oſtr. t.* 6. *f.* 120? 103.
*Gualt. teſt. t.* 39. *f.* G. H. & *t.* 40. *f.* E.
*Argenv. Conch. t.* 15. *f.* I.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 7-9.
*Muſ. Gottwald. t.* 22. *f.* 150-152. b. & *t.* 23. *f.* 156. b. 157. c. *
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 8. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 23. *f.* 344. 345. & *t.* 34. *f.* 350. 351. 352. 355.
*Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 9. *f.* 7.
ε) *Liſt. Conch. t.* 1056 *f.* 9.
*Habitat in* mari mediterraneo & indico, *teſta vix ultra* 3 *pollices longa, nunc laevi, nunc magis minusve evidenter ſtriata: labio exteriori interiore margine dentato.*

tigrinum. 188. B. teſta ovata lævi cæruleſcente: faſciis transverſis luteis fuſco maculatis characteribusque fuſcis intermediis. *Martyn. univ. Conchol.* 1. *t.* 8.
*Habitat ad* novam Scelandiam.

undulatum. 18. B. teſta rarius transverſim ſtriata undatim maculata: ſpira obtuſa labroque interiori glaberrimis.
*Liſt. Conch. t.* 996. *f.* 61.
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 159.
*Gualt. teſt. t.* 39. B.
ϛ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 14. 15. 17.
*Habitat* - - - *Areolae affinis, at teſta magis producta.*

cicatricoſum. 19. B. teſta ovata ſcrobiculis punctata lævi: ſpira elon-

elongata, labiis dentatis, cauda recurva. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 1. 2.
*Habitat in* India, *areolae affine, at testa magis ovali, spira cancellata, labio exteriori dentato, interiori rugoso.*

tessellatum. 20. B. testa tenui cinerea: fasciis albis fusco tessellatis, anfractibus quinquefariam tuberculatis.
*Seb. mus.* 3. *t.* 73. *f.* 1. 12. 13.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 36. *f.* 369. & *t.* 37. *f.* 374.
*Habitat rariissimum in* Oceano australi, *testa ultra* 6 *pollices longa.*

pennatum. 21. B. testa alba: fasciis flavescente spadiceo alboque variis, cauda recurva.
*Rumpf mus. t.* 23. *f.* C.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 36. *f.* 372. 373.
*Habitat rarum in* India.

maculosum. 22. B. testa fasciis quatuor maculosis, anfractibus prominulis longitudinaliter costatis: primo corona tuberculorum.
*List. Conch. t.* 997. *f.* 62.
*Habitat - - - pennato affine, testa* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

bilineatum. 23. B. testa transversim striata: spiræ obtusæ anfractibus fascia maculosa lineisque duabus.
*List. Conch. t.* 998. *f.* 63.
*Habitat - - -*

gibbum. 24. B. testa rudi transversim striata undatim maculosa: spira acuta pyramidali.
*List. Conch. t.* 999. *f.* 64.
*Habitat - - - testa* 2 *pollices longa.*

ventricosum. 25. B. testa ventricosa striata: labio tenui, cauda brevi.

*List.*

*Liſt. Conch. t.* 1007. *f.* 71.
*Habitat - - - an diſtincta ſpecies ?*

ſtrigoſum. 26. B. teſta transverſim ſtriata : ſpira acuta ; anfractu primo ſecundoque ſpinis coronato , labio exteriore intus maculato extrinſecus emarginato.
*Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. f.
*Habitat - - -*

rugoſum. 27. B. teſta lævi undulatim maculata : ſpira rugoſa ſtriataque , cauda quinqueplicata , labio exteriore valido recto.
*Liſt. Conch. t.* 1014. *f.* 78.
*Habitat rarum - - - teſta* 3 *fere pollices longa.*

ponderoſum. 28. B. teſta rudi : ſpira prominula acuta ; anfractu primo tuberculis coronato , labio exteriori intus coſtato.
*Liſt. Conch. t.* 1016. *f.* 74.
*Habitat - - - teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

recurviroſtrum. 29. B. teſta lævi faſciis macularum rufarum notata : ſpira prominula ; anfractu primo inflato.
*Liſt. Conch. t.* 1016. *f.* 75.
*Habitat ad* Barbados , *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

trifaſciatum. 30. B. teſta transverſim ſtriata hinc inde maculoſa , faſciis tribus æqualibus notata : apertura intus cæruleſcente , labio exteriore dentato , interiore ſeriatim tuberculato.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 158.
*Habitat - - - teſta* 3 *pollices longa.*

ſenegalicum. 31. B. teſta ſubtiliter tranſverſim ſtriata : faſciis macularum tribus , ſpiræ anfractu ſecundo annulo turgido cincto , labio exteriore crenato.
*Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 111. *t.* 7. *f.* 7. Faſin.
*Habitat ad* Senegal.

ochro-

ochroleucum. 32. B. testa ochroleuca transversim striata : spira anfractu primo spinis coronato, labio exteriori dentato, interiori repando.
*Gualt. test. t. 43. f. 2.*
*Habitat - - - testa ultra 2½ pollices longa.*

striatum. 33. B. testa transverse striata : spira depressa ; anfractu extimo margine subnodoso, apertura dentata, cauda recurva. *Gronov. zooph. t. 19. f. 18.*
*Habitat in* America.

Cassis. 178. B. testa obovata umbilicata fulva transversim dense striata : cauda recurva, labio membranaceo adnato, labro acuto. *Chemn. Conch. 10. p. 188. t. 152. f. 1456.*
*Habitat in* mari mediterraneo Neapoli *vicino.*

strigatum. 179. B. testa ovata transversim sulcata albida rufescenti-fasciata varicosa : spira conica decussatim striata, apertura oblonga dentata, labio interiore plicato granulato, labro fimbriato maculato. *Chemn. Conch. 10. p. 189. t. 153. f. 1457. 1458.*
*Favann. Conch. t. 24. f. D.*
*Mart. Conch. 2. t. 34. f. 356.*
*Habitat in* Oceano indico.

tyrrhenum. 180. B. testa globosa flavescente sulcata striata : spira conica, apertura alba, labro marginato intus subdentato. *Chemn. Conch. 10. p. 192. t. 153. f. 1461. 1462.*
*Bonann. recr. 3. f. 160.*
*muf. Kirch. 3. f. 162.*
*Ginann. op. posth. 2. t. 5. f. 44. & t. 6. f. 45.*
*Habitat in* mari tyrrheno.

abbreviatum. 181. B. testa ovata albida transversim striata sulcata

taque: ſpira conica ſcalari, labro duplicato intus dentato, labio replicato rugoſo, cauda breviſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 194. *t.* 153. *f.* 1463. 1464.
ß) *Chem. Conch.* 10. *t.* 153. *f.* 1465. 1466.
*Habitat in* Oceano indico, ß) americano.

*c* Caſſidea unguiculata, *labro poſterius extrorſum aculeato, ceterum ſimilia caudatis.*

Erinaceus. 34. B. teſta ſubplicata papillis coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 255. *
*Liſt. Conch. t.* 1015. *f.* 73.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 153.
*Rumpf muſ. t.* 25. *f.* D. & 6. 7.
*Gualt. teſt. t.* 39. *f.* D. I.
*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* G.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 8. 11-16. 29. 30.
*Muſ. Gottwald. t.* 23. *f.* 155. b. 156. a. 158. 161. b. c. 162. a. b. d. 163. a. b. c.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 35. *f.* 363. & *t.* 38. *f.* 383-386.
ß) *Liſt. Conch. t.* 1013. *f.* 77 ?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 21 ?
*Habitat in* mari americano & indico, *ad* Alexandriam *teſta ochroleuca, caeruleſcente aut alba, rarius undatim maculoſa, frequentius faſcia* 1-2 *tranſverſis, nunc obſoletis, nunc manifeſtis teſſellatis.*

glaucum. 35. B. teſta lævi papillisque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 256. *
*Rumpf muſ. t.* 25. *f.* A. & *f.* 4. Caſſis cinerea lævis.
*Liſt. Conch. t.* 996. *f.* 60.
*Gualt. teſt. t.* 40. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 71. *f.* 11-16.
*Muſ. Gottwald. t.* 22. *f.* 153. & *t.* 23. *f.* 154. a.

*Knorr*

*Knorr Vergn.* 3. *t.* 8. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 32. *f.* 342. 343.
*Schroet. inner. Bau d. Conch. t.* 3. *f.* 4.
*Habitat in* mari indico, *testa ad* 5 *pollices longa, cinerea: fasciis* 4-6 *obscurioribus notata intus fusca, rarius extrinsecus obsolete transversim striata: spira acuta pyramidali, anfractibus extimis cancellatis, labro exteriore dentato spinis subtus* 3 4 *armato, interiore infra rugoso subpunctato, supra glaberrimo albo.*

Vibex. 36. B. testa tota lævi. *Mus. Lud. Ulr.* 606. *n.* 257.?
*Rumpf mus. t.* 25. *f.* E. & 8. 9. Fimbriata lævis.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 152.
*Gualt. test. t.* 39. *f.* F. L.
*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* H.
*Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* 3-7. 10. 17-20. 23. 31.
*Mus. Gottwald. t.* 25. *f.* 166. a. b. 167. a. b. 168. a. b.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 3.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 40.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 35. *f.* 364. 366.
ε) *Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* 9.
ζ) *Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* 26. 27.
ι) *Seb. mus.* 3. *t.* 53. *f.* 22.
*Habitat ad* Alexandriam, *in* mari americano & indico, *testa maculis undatis ex fusco luteis varia, columellae plicis* 2, *nonne mera erinacei varietas?*

tessulatum. 37. B. testa subventricosa: spiræ anfractibus basi fascia nigro tessellata.
*List. Conch. t.* 975. *f.* 30. b.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 38. *f.* 387. 388.
*Habitat* - - - *testa utplurimum maculis undatis aliisque spadiceis varia.*

nodulosum. 38. B. testa subplicata papillis coronata: labro læ-

lævi ſuperius maculato, poſterius bifariam acute ſpinoſo.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 383. *t.* 2. *f.* 9.
*Habitat - - - erinaceo affine, teſta pollicem circiter longa.*

Fimbria. 39. B. teſta ſulcata: ſpira acuta, anfractibus ſeriatim tuberculatis.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 1. 2.
*Habitat - - - teſta grandi ex cinereo flava: ſulcis albis.*

Papillotum. 40. B. teſta undique tuberculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 258. *
*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* M. Buccinum granulatum rotundum.
*Liſt. Conch. t.* 969. *f.* 23.
*Gualt. teſt. t.* 44. *f.* G.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* I.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 57-59.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 27. *f.* 2.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1204. 1205.
*Habitat varius in* mari indico, *teſta* 2½ *pollices fere longa flavicante: maculis ſpadiceis, tuberculis in ſeries digeſtis, labro ſpinis* 6 *armato.*

Glans. 41. B. teſta lævi: labio interiore bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 259. *
*Liſt. Conch. t.* 981. *f.* 40.
*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* P.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 56. 57. 60.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 5. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1196-1200.
*Habitat varius in* mari indico, *teſta laevi, ſubcontricoſa, pauliſper ultra* 2 *pollices longa alba: lineis obliquis flavis vel ex luteo fuſcis, maculis fuſcis, apice rubro.*

*d* Calloſa, *columellae labio dilatato incraſſato.*

Arcularia. 42. B. teſta plicata papillisque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 608. *n.* 260. *

*Rumpf muſ. t.* 27. *f.* M. Arcularia major.
*Liſt. Conch. t.* 970. *f.* 24. 25.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 175. 340.
*Gualt. teſt. t.* 44. *f.* O. Q. R.
*Argenv. Conch. t.* 14. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 28. 32-35. 37-41.
*Muſ. Gottwald. t.* 26. *f.* 178. d. *f.* 183. a. b. c.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 41. *f.* 409-412.
*Schroet. inn. Bau Conchyl. t.* 5. *f.* 10.
ε) *Rumpf muſ. t.* 27. *f.* N.
*Gualt. teſt. t.* 44. *f.* n.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 44. 45.
*Martin. Conch.* 2. *t.* 41. *f.* 413.
ζ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 59.
ε) *Gronov. zoophyl. t.* 19. *f.* 7. 8. Buccinum faſciolatum.
ι) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1474.
*Habitat in* Oceano indico, *Malacis ornamento arcarum inſerviens, teſta nunc alba, nunc cinerea, nunc ſubfuſca aut fuſca faſcia interdum alba, rarius rubeſcente fuſcia alba, cancellata, labro coſtato.*

Pullus. 43. B. teſta gibba oblique ſtriata.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 8. *f.* 11 ? Totombo.
*Liſt. Conch. t.* 971. *f.* 26.
*Gualt. teſt. t.* 44. *f.* N.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 5.
*Schroet. Einl. in. Conch.* 1. *p.* 328. *t.* 2. *f.* 2.
*Habitat in* mari mediterraneo, *arcularia dimidio minor, teſta ferruginea decuſſatim ſtriata, faſcia una aut 2 albis transverſis, labio exteriori rotundato dentato, interiori nitido albo.*

gib-

gibbosulum. 44. B. testa gibba lævi.
*List. Conch. t.* 927. *f.* 270. *t.* 973. *f.* 28.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 383.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 369.
*Gualt. test. t.* 44. *f.* L.
*Mus. Gottwald. t.* 26. *f.* 178. c.
*Seb. mus. t.* 53. *f.* 46.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 6.
*Martin Conch.* 2. *t.* 41. *f.* 414. 415.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 329. *f.* 3. a. b.
α) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 4.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 5.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 36. *f.* 5?
*Habitat rarius in* mari mediterraneo & indico, *testa nivea, aut tincta maculatave.*

mutabile. 45. B. testa lævi, adultiore rugosa: spira exserta, labio interiore subexplanato.
*Gualt. test. t.* 44. *f.* B.
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa tenera, laevi, pallida, alba, aut ex luteo fuscescente, fasciis interdum* 2 *obsoletis: spira exquisita; anfractibus distinctissimis longitudine testae margine superiore obsolete albis rufisque; adultiore longitudinaliter rugosa cinerea opaca, labio interiori antrorsum extenso crassiusculo.*

neritetum. 46. B. testa convexa obtusa lævi: labio interiori obsoleto.
*Gualt. test. t.* 65. *f.* C. I.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 10. *f.* 3. 4.
*Habitat rarius in* mari mediterraneo, *testa pisi magnitudine, neritae facie, at apertura posterius emarginata a neritis distincta, fere orbiculata, pallida, subtus planiuscula, alba, gibbosa: futura superiori secundum anfractus linea purpurascente vermiculari.*

*e* Detrita : *columellae labio quaſi abraſo plano.*

Harpa. 47. B. teſta varicibus æqualibus longitudinalibus diſtinctis mucronatis : columella lævigata. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 261. *

*Rumpf muſ. t.* 32. *f.* K. L. M. Harpa.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* D. Harpa nobilis.
*Liſt. Conch. t.* 992. 993. 994. *f.* 55-57.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 185.
*Gualt. teſt. t.* 29. *f.* C. D. E. G.
*Klein oſtr. t.* 6. *f.* 105.
*Leſſer teſtaceoth. f.* 59.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *fig. innom. omn.*
*Muſ. Gottwald. t.* 15.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 9. *f.* 3. & 2. *t.* 8. *f.* 2. & *t.* 19. *f.* 1. 2.
*Murray teſtaceol. t.* 1. *f.* 14.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 14.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 119. *f.* 1090-1092. 1094-1097.
ε) *Pallas ſpic. zool* 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 1. 2. Buccinum Geverſianum.
ϛ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1451.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1453.
*Habitat in* mari indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, ovata, nunc majore, nunc minore, ſubtus utplurimum badia aut fuſca, coſtis obliquis nunc latioribus, nunc anguſtioribus, utplurimum, nunc rarius, nunc confertim ſtriis transverſis nigris notatis, aliquando maculatis : maculis nonnunquam albo, teſſellatis, coſtarum interſtitio creberrime albo, maculis pennatis picto ; in* ε) *teſta griſea undulatim maculata, intus ex purpurea violacea.*

coſtatum. 48. B. teſta varicibus æqualibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella lævigata.
*Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* F. *Mar-*

*Martin. Conch.* 3. *t.* 119. *f.* 1093.
*Favann. Conch. t.* 28. *f.* A⁴.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1452.
ε) Fimbriata Buccinum. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 6.
*Habitat rarissimum - - - ε) ad* insulas Falkund, *costis approximatis, rarius striatis & maculatis ab harpa distinctum, an forsan mera ejus varietas?*

Persicum. 49. B. testa scabra: labro crenulato, columella plana. *Mus. Lud. Ulr.* 609. *n.* 262. *
*Rumpf mus. t.* 27. *f.* E. Cochlea patula.
*Argenv. Conch. t.* 17. *f.* E. Concha persica.
*List. Conch. t.* 987. *f.* 46. 47.
*Guait. test.* 51. *f.* H? L.
*Seb. mus.* 3. *t.* 72. *f.* 10. 11.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 5. & 4. *t.* 5. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 69. *f.* 760.
α) *Valent. Abh. t.* 3. *f.* 20.
γ) *Seb. mus.* 3. *t.* 72. *f.* 12-16.
*Favann. Conch. t.* 27. *f.* D³.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1467. 1468.
*Habitat in* mari indico, sinu persico *rarius*, *testa* 4 *fere pollices longa aut fusca transversim striata alboque maculata vel fitis albo fuscoque maculatis cincta, aut fasciis ejusmodi picta.*

monodon. 50. B. testa scabra, labro crenulato, columella plana spinam fabulatam oblique exferente.
*Pallas spic. zool.* 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 3. 4.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 30. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 69. *f.* 761.
*Regenf. Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 2.
*Favann. Conch. t.* 27. *f.* D¹.
*Martyn Conch.* 1. *t.* 10. 2. *f.* 50.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1469. 1470.
*Habitat rarum in* mari Americam *alluente, persicae affine, testa grisea, intus alba.*

patulum. 51. B. testa muricata: labro extus crenato, columella falcata. *Mus. Lud. Ulr.* 610. *n.* 263.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 3. Pakel.
*List. Conch. t.* 989. *f.* 49.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 368.
*mus. Kircher.* 3. *f.* 361.
*Gualt. test t.* 51. *f.* D. E.
*Mus. Gottwald. t.* 26. *f.* 179. a.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 24. *f.* 1.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 69. *f.* 757. 758.
*Habitat rarius in* mari æthiopico & americano, *murici neritoideo affine, testa ad* 4 *usque pollices longa, solida, striis transversis nigris interrumpendisque lineis albis varia, fasciis crebro* 2 *albis, ventris anfractibus cingulo triplici nodoso acuto, & duplici inferiore magis obtuso.*

hæmastoma. 52. B. testa submuricata; labro intus striato, columella planiuscula, fauce fulva.
*List. Conch. t.* 988. *f.* 48.
*Gualt. test. t.* 51. *f.* A.
*Mus. Gottwald. t.* 11. *f.* 80. a ? b ? e ? f ?
*Martin. Conch.* 3. *t.* 101. *f.* 964. 965.
*Habitat in* mari mediterraneo & æthiopico, *testa ad* 2 *pollices longa, ovata, rudi, transversim striata, fusca vel cinerea interdum fusco lineata, labro intus crenulato, spira obtusa, anfractibus fascia duplici nodosa cinctis.*

Lapillus. 53. B. testa ovata acuta striata lævi: columella.
*Fn. suec.* 2167. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 4.
*Adans. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 4. Sadot.
*Mull. zool. dan. prodr.* 2944. *O. Fabr. Fn. groenl.* 398. Tritonium Lapillus.
*List. Conch. t.* 965. *f.* 18. 19. & *t.* 975. *f.* 30. a ?
*anim. angl. t.* 3. *f.* 5. 6.
*Act. paris.* 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 5-7.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 29. *f.* 4.

*Stroem.*

*Stroem. fondm.* 183.
*Beſch. berl. Naturf.* 4. *n.* 13.
*Ferber n. Beytr.* 2. *Mineralg.* 1. *p.* 449.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1111. 1112. & 4. *t.* 122. *f.* 1124. 1125. 1128. 1129. 1136. 1137.
*Habitat ad* Oceano europæi *littora, teſta vix ultra* 1½ *pollicem longa alba, cinerea vel flavicante, interdum tranſverſim faſciata, nunc tenuiore: apertura edentula, nunc ſolidiore: apertura dentata; incolae feminini ovaria ſucco glutinoſo albo flavo fuſcoque farta, qui lanae aut linteo affricatus & ad ſolem ſiccatus nitido coque ſtabili colore purpureo comparet: Ova olim pro hydra triticea habita.*

ſmaragdulus. 54. B. teſta ovata, acuta glaberrima, columella ſubplicata planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 264. *

*Argenv. Conch. t.* 6. *f.* P. Smaragdus minor.
*Habitat - - - teſta ſulcata matris perlarum inſtar nitente, & viridi quoque colore nitente.*

Tuba. 55. B. teſta ſubfuſiformi ex fuſco lutea: ſpira cancellata; anfractu primo ſublævi reliquis triplo longiore.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 94. *f.* 908.
*Habitat rariſſimum in* India, *teſta ſupra ſubventricoſa, infra anguſta.*

Pyrum. 56. B. teſta turbinata: apertura rubra, columella lævi, ſpira brevi; anfractu primo ventricoſo.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 94. *f.* 909. 910.
*β) Scop. del. inf.* 2. *t.* 24. *f.* 2 ?
*Habitat rariſſimum in* India & mari rubro.

ſpadiceum. 57. B. teſta oblongo turbinata ſpadicea; lineis transverſis undulatis albis.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 94. *f.* 911.
*Habitat - - -*

fossile. 58. B. testa convexa transversim plicata: spira brevi, columella callosa.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 94. *f.* 912-914.
*Habitat - - - hactenus modo fossile & calcinatum sat frequens prope* Oedenburg Hungariæ.

umbilicatum. 59. B. testa oblongo turbinata plicata: spira nodosa, apertura intus sulcata, columella subumbilicata.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 94. *f.* 915. 915. a.
*Habitat - - -*

candidum. 60. B. testa oblonga turbinata solida lævi alba.
*Martin. Conch.* 3. *vign.* 31. *f.* 2. 3. *p.* 198.
*Habitat - - -*

Scala. 61. B. testa oblonga: apertura ovali emarginata quadridentata, basi alba, spira acuta; anfractibus, primo costis quatuor glabris.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 118. *f.* 1089. a. b.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 360. *t.* 2. *f.* 8.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
γ) *List. Conch. t.* 1059. *f.* 2.
*Habitat - - - testa nunc alba, nunc fusca.*

crassum. 62. B. testa ventricosa rudi grisea glabra: apertura ovali, columella callosa, basi bicallosa.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 120. *f.* 1099. 1100. *Ha-*

---

*Cui tribui accenseantur, si quidem distinctæ sint hujus generis species ab Argenville zoomorph. t.* 4. *f.* A. *a* Listero *Conch. t.* 37. *f.* 36. *t.* 580. *f.* 34. a. *t.* 792. *f.* 45. *t.* 827. *f.* 49. d. *t.* 897. *f.* 17. a. *t.* 912. *f.* 5. *t.* 924. *f.* 16. a. b. *t.* 962. *f.* 15. a. *t.* 964. *f.* 49. e. f. *t.* 965. b. *f.* 22. *t.* 968. *f.* 22. b. c. *t.* 976. *f.* 32. *t.* 983. *f.* 42. b. & *t.* 992. *f.* 54. a Seba *mus.* 3. *t.* 50. *f.* 31. *t.* 60. *f.* 36. 52. & *t.* 39. *f.* 61. ab Argenville *Conch. t.* 10. *f.* I. & *zoomorph. t.* 4. *f.* C. a Gualtieri *test. t.* 44. *f.* 33. 65. I. D. P. *t.* 55. *f.* C. & *t.* 43. *f.* P. a Bonanni *Mus. Kircher.* 3. *f.* 71. 398. 151. & *mus.* Gottwaldtian. *t.* 26. *f.* 175. c. & *f.* 181 *decorticata? an buccini species testa a* Knorrio *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 5. *denotata? a* Listero *anim. angl. t.* 3. *f.* 10.

*Habitat - - - ſpira vix prominula: anfractibus 5.*

marginatum. 63. B. teſta ſubgloboſa glaberrima: apertura ovali utrinque marginata, labro dentato, columella ſubſtriata, ſpira vix prominula.
*Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1101. 1102.*
*Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum in* Pedemontio, *teſta ſubfuſca, baſi ſtriis nonnullis obliquis exarata.*

Labyrinthus. 64. B. teſta ponderoſa convexa glaberrima: anfractibus diſtantibus marginatis, apertura ampla ovali, columellæ plicis obliquis.
*Seb. muſ. 3. t. 57. f. t.*
*Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1103.*
*Habitat ad* Scheveningen Hollandiæ, *teſta ex luteo ſubfuſca.*

ruſticum. 65. B. teſta rudi ovato-oblonga alba: ſtriis transverſis fuſcis, apertura ovali, cauda prominula, anfractuum primo ventricoſo.
*Adanſ. Seneg. 1. t. 9. f. 25.* Taſon.
*Liſt. Conch. t. 831. f. 55.*
*Gualt. teſt. t. 43. f. X.*
*Seb. muſ. 3. t. 54. f. 14-16.*
*Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 5.*
*Martin. Conch. 3. t. 120. f. 1104. 1105.*
*Habitat in* India & Africa, *ſtriis transverſis interdum fuſco lacteoque variis, in colorem cæruleum viridemque vergentibus.*

varium. 66. B. teſta ovata rudi fava: coſtis transverſis obſcurioribus elevatis nodulofis, apertura ovata edentula.
*Knorr Vergn. 6. t. 23. f. 3.*
*Martin. Conch. 3. t. 121. f. 1106.*
*Habitat - - -*

filo-

filoſum. 67. B. teſta ovata albida, rubris filis cincta: ſpira prominula, apertura ovali, labro rubro ſtriato, columella ſubumbilicata.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1113. 1114.
*Habitat* - - -

corona-tum. 68. B. teſta ovata ſtriata exalbida ſpadiceo obumbrata: faſcia media alba, maculis utrinque fuſcis ſtipata.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1115. 1116.
*e) Liſt. Conch. t.* 986. *f.* 45.
*Klein oſtr. t.* 4. *f.* 75.
*Habitat* - - - *teſta medio gibba.*

ſquali-dum. 69. B. teſta ſubgloboſa albida maculis porraceis luridisque teſſellatis in ſeries digeſtis varia.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 393.
*muſ. Kirch.* 3. *f.* 379.
*Habitat* - - - *ſpirae anfractibus* 4.

craſſum. 185. B. teſta ſubcylindrica tranſverſim ſtriata rufeſcente ſpadiceo faſciata labro denticulato.
*Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 119. *t.* 7. *f.* 2. 3.
*Habitat ad* Zeylon.

forni-catum. 186. B. teſta ſtriata fuſca albo maculata faſciataque: anfractibus canaliculatis quadrifariam nodoſis. *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p.* 120. *n.* 14. *t.* 9. *f.* 1.
*Habitat* - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

* Lævigata (*nec praecedenti cuidam tribui inſerta*).

ſpira-tum. 70. B. teſta lævi: anfractibus canali plano diſtinctis, columella abrupta perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 265.
*Column. purp.* 15. *t.* 16. *f.* 2. *e)*

α) *Argenv. Conch. t.* 17. *f.* N. Contabulata.
*Liſt. Conch. t.* 983. *f.* c.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 370.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 362.
*Rumpf muſ. t.* 49. *f.* D.
*Gualt. teſt. t.* 51. *f.* B.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 21. 22. 24 ? 25 ?
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 6. *f.* 5. & 3. *t.* 3. *f.* 4.
*Regenf. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 41.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1118.
*Schroet. inn. Bau Conch. t.* 4. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 981. *f.* 41.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 70.
*Rumpf muſ. t.* 49. *f.* C.
*Klein oſtr. t.* 2. *f.* 46.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 23. 26.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1120. 1121.
*Habitat in* India, ε. (*rarius*) *in* Sina, *teſta* 2 *circiter pollices longa*, ε) *paulo longiori*, *alba*, *maculis lineisque ſpadiceis aliter aliterque varia*, *ſpirae anfractibus* 6-7 : *primo ventricoſo*, *apertura ovata emarginata ſupra in canalem terminata*, *umbilico profundo quaſi bipartito*, *baſi in* α) *caerulea*.

pyrozonias. 71. B. teſta tranſverſim plicata & undulatim ſtriata : baſi ſpiraque prominulis ; anfractibus ſingulis faſcia fulva, primo duplici.
*Martin. Conch.* 3. *t.* 109. *f.* 1017.
*Habitat* - - -

lævc. 72. B. teſta oblonga tenuiſſime ſtriata dilute fuſca obſcurius faſciata ; apertura ovali in canalem deſinente, anfractu primo gibbo maximo.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1150.
*Habitat in* India, *ſpirae anfractibus* 5-6.

ocellatum. 73. B. teſta lævi atra : guttis maculisque albis ſe-

ſeriatis, ſpira prominula; anfractu primo ventricoſo.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1160. 1161.
*Habitat* - - -

pyramidale. 74. B. teſta obtuſe pyramidali tranſverſim ſtriata alba, nebulis maculis virgatis aliisque nigris & ſubfuſcis varia.
*Liſt. Conch. t.* 976. *f.* 31.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1170. 1171.
β) *Liſt. Conch. t.* 980. *f.* 39.
*Habitat ad* Tranquebar.

glaberrima. 75. B. teſta glaberrima minuta.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1177. 1180.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1178.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1179.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1181.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1182.
*Habitat* - - - ε) *anfractibus* 2 *primis faſcia teſſellata cinctis*, γ) *anfractu primo ſerie maculorum cincto*, δ) *teſta fuſco undulata*, ε) *maculata & punctata.*

ſtrigoſum. 76. B. teſta minuta tranſverſim ſtriata.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1183.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1184.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1185.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1186-1188.
*Habitat* - - - *teſtæ apertura in* β) *&* δ) *dentata, in hoc maculata.*

trifaſciatum. 77. B. teſta glabra: faſciis intus tribus latis rubris, ſpiræ anfractu primo ventricoſo.
*Gualt. teſt. t.* 44. *f.* A.
*Habitat* - - - *teſta ultra pollicem longa.*

leucozonias. 78. B. teſta glabra: faſcia alba lineisque ſpadiceis varia. *Seb.*

*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 37.
*Habitat* - - - *teſta minuta.*

cancellatum. 79. B. teſta glabra faſciis lineisque decuſſantibus varia.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 38.
*Habitat* - - - *teſta minuta.*

obtuſum. 80. B. teſta glabra ochroleuca : ſpiræ apice obtuſo cæruleo ; anfractu primo ventricoſo.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 18. *f.* 3.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1103.
*Habitat* - - - *teſta* 2 *pollices longa.*

glabratum. 81. B. teſta glaberrima : anfractibus obſoletis ; infimo baſi ſubcanaliculato producto. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 266. *
*Liſt. Conch. t.* 974. *f.* 29.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 149.
*Gualt. teſt. t.* 43. *f.* T.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* G.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 16. *f.* 4. 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1117.
β) *Klein oſtr. t.* 2. *f.* 47. Dipſacus.
*Liſt. Conch. t.* 982. *f.* 42.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f* 1119.
*Chemn. Beſch. berl. Naturf.* 3. *t.* 8. *f.* B.
γ) *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 48.
*Habitat in* mari americano & africano *rarius*, *teſta* 3½-4 *pollices longa nitida*, *aurantia albo intermiſto*, ε) *alba ſpadiceo maculata apice rubella.*

ſtromboides. 82. B. teſta glabra : anfractibus diſiinctis, ventre retro labrum ſuperne ſolutum portato ad baſin oblique ſtriato. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 53. *t.* 2 *f.* 5. 6.
*Habitat* - - - *ſtrombo gibberulo affine*, *teſta ex fuſcoſcente lutea*, *ſpirae anfractibus* 5-6 *convexis.*

præ-

præro-sum. 83. B. testa ovata lævi atra : spira carioſa ; columella glaberrima.
*Liſt. Conch. t.* 124. *f.* 24 ?
*Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1035. 1036.
*Habitat in* Europa *magis auſtrali* v. *g. ad aquaeductum* Sevillæ, *teſta fabae fere magnitudine radi ; vertice quaſi praemorſo.*

auſtra-le. 173. B. teſta oblonga lævi tenui faſciata : apertura ovali integra. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1033. 1034.
*Favann. Cat. t.* 1. *f.* 46.
*Habitat in* novæ Seelandiæ fluviis, *inter buccina, bullas, & helices quaſi media, teſta* 3 *pollices longa.*

Orbita. 183. B. teſta ovata craſſa albida tranſverſim coſtata ſulcataque : apertura ovali, labro intus plicato, labio plano. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 199. *t.* 154. *f.* 1471. 1472.
*Martyn Conchol.* 2. *f.* 45.
ε) *Martyn Conchol.* 1. *f.* 7.
*Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1473.
*Habitat ad* novæ Seelandiæ *littora.*

turgi-tum. 184. B. teſta obovata ſubumbilicata flaveſcente maculis ſanguineis ſeriatis notata : labro ſinuato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 201. *t.* 154. *f.* 1475. 1476.
*Zorn n. danz. Abh.* 1. *t.* 3. *f.* 4.
*Martyn Conch.* 2. *f.* 49.
*Habitat ad* novæ Seelandiæ *littora.*

*g* Angulata ( *neque praegreſſis tribubus adſcripta* ).

undo-ſum. 84. B. teſta ovata : ſtriis tranſverſis elevatis glabris, ventre obtuſe quinquangulari, labro in-tus

tus ſtriato. *Muſ. Lud. Ulr.* 612. *n.* 268. *
*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* O. Buccinum undoſum.
*Liſt. Conch. t.* 938. *f.* 33.
*Argenv. Conch. t.* 9. *f.* N.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 26.
*Knorr Vergn.* 2. *t.* 14. *f.* 4. 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1126. 1127. & *t.* 123. *f.* 1146. 1146[a].
ε) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399 ?
*Habitat rarius in* freto Malaccenſi, *teſta* 2 *circiter pollices longa flavicante ; ſtriis fuſcis : angulis nonnunquam* 7-8, *cauda canaliculata reflexa.*

affine. 85. B. teſta ovata : ſtriis tranſverſis elevatis glabris, ventre cylindrico, labro intus ſtriato.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. *f.* 1135.
*Habitat - - - an ſatis diſtinctum ab undoſo ?*

tranquebaricum. 86. B. teſta ovata : ſpira 12 angulata tranſverſim ſtriata, apertura dentata, labro aurantio, columella perforata.
*Muſ. Gottwald. t.* 26. *f.* 175. 175. a. b.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. 1147-1149.
*Habitat ad* Coromandel.

verſicolor. 87. B. teſta rudi ſordide fuſca tranſverſim ſtriata : ſtriarum interſtitiis bifariam nigro maculatis, ſpiræ anfractibus quatuor canaliculatis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. *f.* 1145.
*Habitat in* India, *teſta brevi : apertura ampla oblonga in canalem brevem deſinente, teſta interdum tenuiore longiuſcula lineis angularibus picta.*

cruentatum. 88. B. teſta tranſverſim ſtriata : maculis rubellis parallelogrammis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. *f.* 1143. 1144.
*Habitat - - -*

ful-

fulcatum. 89. B. testa ovata fusca, maculis niveis varia; spiræ anfractibus sulcatis, fauce striata, labro crenulato.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t. 10. f. 5. 6.*
*Habitat* - - - -

Rumpfii. 90. B. testa tenui ventricosa angusta: spira conico-depressa; anfractu primo & secundo spinis coronato.
*Rumpf mus. t. 25. f. 3.*
*Habitat* - - - *testa 4 fere pollices longa.*

Bezoar. 91. B. testa subrotunda rugosa: anfractibus anterius lamellatis, columella perforata.
*Argenv. Conch. t. 15. f. G.*
*Martin. Conch. 3. t. 68. f. 754-755.*
*Spengl. Selt. Conch. t. 2. f. H.*
*Habitat in* Sina, *testa sordide ochroleuca fusco varia, intus flava, rudi, decussatim rugosa vel striata, cauda solida flexa rugosa imbricatim squamosa, spira angulata lateribus rectis, anterius planiuscula plicata aut superne dentata.*

glaciale. 92. B. testa lævi substriata ovato-oblonga: anfractu infimo subcarinato. *Fn. suec. 2162.* *
*Mull zool. dan. prodr. 2942. C. Fabr. Fn. groenl. p. 397. n. 397.* Tritonium glaciale.
*Schroet. n. Litteral. 3. p. 270. t. 3. f. 20. 21.*
*Chemn. Schr. berl. Naturf. 6. t. 6. f. 4. 5. Conch. 10. t. 152. f. 1446. 1447.*
*Habitat ad* Oceani septentrionalis *a* Groenlandia *ad extremam* Asiam *littora, testa ad 2 pollices longa crassa lapidea laevi pallide rubicunda, intus alba polita; spirae anfractibus 7 curvato multangulis.*

undatum. 93. B. testa oblonga rudi transversim striata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. suec. 2263.* *
*Müll.*

*Mull. zool. dan.* 2. *t.* 50. *prodr.* 2938. *var.* 2. *p.* 28. *O. Fabr. Fn. groenl.* 394. Tritonium testa oblonga transversim striata, anfractibus obliquè carinatis.

*List. Conch. t.* 962. *f.* 14.
*anim. angl. t.* 3. *f.* 2.
*Bonann. recr. f.* 189.
*mus. Kirch.* 3. *f.* 191.
*Petiv. gaz. p.* 83.
*Rumpf mus. t.* 29. *f.* H.
*Seb. mus.* 3. *t.* 39. *f.* 76-80.
*Knorr delic. t.* B. VI. *f.* 6.
*Vergn.* 4. *t.* 19. *f.* 1.
*v. Born. mus. Caes. Vindob. test. t.* 9. *f.* 14. 15.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 126. *f.* 1206-1211.
*β) Bonann. mus. Kirch.* 3. *f.* 399.
*γ) Seb. mus.* 3. *t.* 39. *f.* 81. 82.
*δ) v. Born. mus. Caes. Vind. test. t.* 9. *f.* 15. 16. *ind. p.* 253.
*Clemn. Conch.* 9. *t.* 105. *f.* 892. 893.

*Habitat in* Oceano europæo, *perfrigidum* septentrionali, mari *quoque* glaciali & indico, *testa* 4½ *pollices longa scabra, minus spectabili cinerea vel subfusca, rarius spadicea albo fasciata aut caerulea, transversim & obliquè undulata, spirae anfractibus* 8-9, *apertura lunata, operculo corneo extrinsecus striis subtilissimis concentricis notato, testa, incola nigro maculato albo subtus fusco, tentaculis subulatis oculisque binis, siphone canalem mentiente.*

ciliatum. 94. B. testa turrita patulo subcaudata angulata longitudinaliter ciliata, columella subplicata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 401. *n.* 402.

*Habitat rarius in* maris Groenlandiam alluentis *profundioribus, undato affine, sed magis amplum, testa* 6 *fere lineas longa albida, striis glabra, epidermide ciliato-plicata munita, apertura am-*

*ampla, ſpirae anfractibus 5 minus convexis, mi-crone glabro.*

viridu-lum. 95. B. teſta oblonga lævi glabra acuminata transverſim minute ſtriata, longitudinaliter coſtata. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 402. n. 403.*
*Habitat in* maris Groenlandiam alluentis *profundioribus undata proximum, teſta 4 lineas longa tenera ſubdiaphana ex albo virescente, cauda brevi obtuſa vix reflexa, labio acuto, ſpirae anfractibus 6-7 minus ventricoſis.*

carina-tum. 96. B. teſta oblongo-conica transverſim ſtriata: anfractibus ſuperioribus oblique obtuſeque multangulis; inferioribus unicarinatis. *Phipps it. p. 197. t. 13. f. 2.*
*Habitat in* Oceano ſeptentrionali, *ad portum* Smeerenberg.

ſolutum. 97. B. teſta ovata: varicibus ventris longitudinalibus inæqualiter diſtantibus, labro canaliculo ſubſoluto. *Hermann Naturf. 16. p. 52. t. 2. f. 3. 4.*
*Habitat - - - undato affine, teſta exalbida flavo miſta, ſpira obtuſa, anfractu primo ſecundo quintuplo latiori 6 coſtis inaequali.*

Tænia. 98. B. teſta oblonga glabra fuſca: anfractu primo faſcia flavicante media.
*Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 3.*
*Habitat - - - -*

linea-tum. 99. B. teſta cinerea: ſtriis longitudinalibus undulatis transverſisque interruptis fuſcis, margine albo fuſco maculato, apertura alba.
*Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 4.*
*Habitat - - - undoſo affine, at teſta non multangula.*

ma-

maclovienſe. 100. B. teſta oblonga maculis undatis nebulisque picta; ſpira brevi; anfractu primo gibbo, cauda anguſta ſubprominula.
*Valent. Abh. t. 11. f. 97.*
*Habitat ad* fanum S. Maclovii.

foliorum. 101. B. teſta tenui: ſpira brevi acuta tenuiter coſtata: anfractu primo ſubgloboſo.
*Rumpf muſ. t. 29. f. Y.*
*Habitat in* India *ad arborum fruticumque maritimorum folia ramosque, teſta pollicem circiter longa ex virescente cinerea atro punctata.*

textum. 102. B. teſta ventricoſa cancellata: anfractibus diſtantibus.
*Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1201. 1202.*
*Habitat - - - teſta pollicem longa.*

ſtrigoſum. 103. B. teſta oblonga longitudinaliter plicata transverſim ſtriata: ſtriis fuſcis albo nigroque ſtriatis.
*Benann. muſ. Kirch. & recr. 3. f. 38.*
*Chemn. Conch. 4. p. 49. vign. 38. f. a. b.*
*Habitat - - - teſta vix 2 polices longa ſubventricoſa: apertura coſtata, columella ſubplicata; an ad muricem relegandum?*

anglicum. 104. B. teſta oblonga: ſtriis transverſis elevatis, ſpiræ anfractibus ſex fuſcis.
*Liſt. Conch. t. 963. f. 17.*
*Bytem. app. t. 11. f. 43.*
*Martin. Conch. 4. t. 126. f. 1212.*
*Habitat ad* Angliæ *littora, teſta parum ventricoſa.*

porcatum. 105. B. teſta ventricoſa coſtata fuſca: anfractu primo alterum ſubtegente.
*Knorr Vergn. 6. t. 33. f. 3?*
*Martin. Conch. 4. t. 126. f. 1213. 1214.*

ε) *Liſt. Conch. t.* 963. *f.* 16.
*Habitat ad* Angliæ *littora.*

lævi-ſimum. 106. B. teſta glaberrima alba : ſpiræ apice obtuſo cæruleſcente, anfractu primo ventricoſo reliquis duplo majore.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 127. *f.* 1215. 1216.
ε) *Liſt. Conch. t.* 978. *f.* 35.
*Habitat* - - - -

igneum. 107. B. teſta oblonga anguſtata glabra flavicante : maculis undatis nebulisque rubris, anfractibus extimis perpendiculariter ſtriatis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 127. *f.* 1217.
*Habitat* - - - *an muricis potius ſpecies?*

pluma-tum. 108. B. teſta oblonga anguſta ſpadicea : cingulis obſcurioribus, fauce anguſta atra cæruleave; dentibus albis labroque intus ſtriato.
*Liſt. Conch. t.* 822. b. *f.* 41.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 21. *f.* 6.
*Martin. Conch* 4. *t.* 127. *f.* 1218.-1220.
*Habitat in* inſulis Americæ auſtrali *obverſis, ſpiræ apice acuto; an ad murices potius referendum?*

lyratum. 109. B. teſta oblonga anguſta horizontaliter coſtata : coſtis tranſverſim ſtriatis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 127. *f.* 1221. 1222.
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 34?
*Habitat* - - - *teſta ſubturrita, naſo ſubprominulo, columella laevi.*

clathra-tum. 110. B. teſta cana ovato-ventricoſa : rugis longitudinalibus plicas transverſas decuſſantibus, labro intus ſulcato.
*v. Bonn. muſ. Cæſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 17. 18.
*Habitat* - - - *ſpira acuta, cauda brevi recurva.*

16-

reticulatum. 111. B. testa ovato-oblonga transversim striata longitudinaliter rugosa, apertura dentata.
*List. Conch. t.* 966. *f.* 21.
*Petiv. gaz. t.* 64. *f.* 8. & *t.* 75. *f.* 4.
*Act. paris.* 1710. *p.* 463. & 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 9.
*Bonann. recr. & mus. Kircher.* 3. *f.* 62.
*Gualt. test. t.* 44. *f.* C.
*Knorr Vergn.* 5. *t.* 10. *f.* 3.
*v. Born. mus. Caes. Vind. test. t.* 9. *f.* 16.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1164.
*Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 346. *t.* 2. *f.* 5.
*Habitat frequens in* mari mediterraneo, anglico, æthiopico, *testa omnibus fere coloribus variante, avellanae magnitudine.*

niveum. 112. B. testa ovata cancellata alba: anfractu primo ventricoso.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1122. 1123.
*Habitat* Tranquebariæ, *testa ad pollicem usque longa, cauda subprominula, spirae anfractibus* 7.

scalare. 113. B. testa flava fasciis dilute fuscis: spira cancellata; anfractibus distantibus planis, primo subconvexo, apertura triangulari; labro dentato, columella plicata verrucosa umbilicata.
*Chemn. Conch.* 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.
*Meusch mus. Leens. f.* b.
6) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 7.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 122. *f.* 1130.
*Habitat pretiosum - - - testa interdum rubella, spirae anfractibus* 6, *umbilico infundibuliformi.*

indicum. 114. B. testa decussatim striata fusca intus alba.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. *f.* 1138. 1139.
*Habitat in* India.

noduloſum. 115. B. teſta alba fuſco varia tranſverſim ſtriata hinc inde noduloſa.
*Muſ. Gottwald. t.* 26. *f.* 175. d. e?
*Martin. Conch.* 4. *t.* 123. *f.* 1140.
*Habitat ad* inſularum Americæ auſtrali *obverſarum littora.*

piſcatorium. 116. B. teſta cancellata in ſectionis angulis noduloſa: apertura utrinque dentata acuta.
*Liſt. Conch. t.* 1024. *f.* 89.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1151. 1152.
*Habitat in* India, *an ad volutas referendum?*

S. Mauritii. 117. B. teſta alba intus flaveſcente: labro ſexdentato, anfractibus ſpinis; primo quadriſariam coronatis.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1153. 1154.
*Habitat in* inſula S. Mauritii.

armillatum. 118. B. teſta oblonga: apertura ampla edentula, anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie coronatis.
*Liſt. Conch. t.* 954. *f.* 5.
*Knorr Vergn.* 4. *t.* 26. *f.* 2.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 11. *f.* 6. 7.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1155-1157.
*Habitat* - - - *teſta tenui.*

plicatulum. 119. B. teſta oblonga perpendiculariter plicata tranſverſimque ſtriata faſciis albis fuſcisque alternis varia intus violacea.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 124. *f.* 1158. 1159.
β) *Gualt. teſt. t.* 44. *f.* E?
*Habitat in* India.

vulgatum. 120. B. teſta ventricoſo-oblonga: ſtriis longitudinalibus pliciformibus tranſverſas ſubtiliores undulatas decuſſantibus.

*Seb.*

*Seb. muſ. 3. t. 49. f. 61. 62.*
*Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1162. 1163.*
ε) *Gualt. teſt. t. 44. f. V?*
*Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1165. 1166.*
*Habitat frequentiſſimum in* mari mediterraneo, *ad* Angliæ inſularumque canarienſium & Azorum littora, *teſta mediae magnitudinis, coloris varii, ſtriis albis & caeruleſcentibus, ſubfuſcis & flavicantibus alternis.*

ſtola-tum. 121. B. teſta faſciis diſcoloribus tranſverſim ſtriatis varia: ſpira horizontaliter coſtata; anfractus primi altera parte glaberrima.
*Martin. Conch. 4. t. 124. f. 1167-1169.*
ε) *Seb. muſ. 3. t. 53. f. 43?*
*Habitat frequens ad* Tranquebariæ *littora, teſta nunc fuſca vel rubella faſciis albis, nunc alba faſciis fuſcis vel rubellis, apertura intus dentata, columellae plica ſimplici.*

nanum. 122. B. teſta minuta alba cancellata: ſpira acuta.
*Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1176.*
*Habitat - - - -*

exile. 123. B. teſta parva anguſta cancellata: apertura ampla crenata maculata.
*Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1189-1191.*
*Habitat - - - -*

Chalys. 124. B. teſta cancellata: coſtis perpendicularibus: interſtitiis lævibus planis, apertura ovata.
*Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1192.*
*Habitat - - - teſta minuta, ſpira vix prominula.*

verru-coſum. 125. B. teſta decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa ſubventricoſa lutea: anfractibus ſingulis faſcia caeruleſcente.
*Gualt. teſt. t. 43. f. M.*
*Habitat - - - teſta 1¼ pollicem longa.*

alatum. 126. B. testa gibba decussatim striata in sectionum angulis nodosa : striis transversis undulatis, labro alato.
*Gualt. test. t. 43. f. Z.*
*Habitat - - - testa pollicem circiter longa.*

nigropunctatum. 127. B. testa angusta rugosa : rugis albo tuberculatis & nigro punctatis.
*Gualt. test. t. 44. f. F.*
*Habitat - - - testa ¾ pollicis circiter longa.*

nitidulum. 128. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata longitudinaliter striato rugosa : labro intus subdentato.
*Bonann. recr. & mus. Kircher. 3. f. 60 ?*
*Gualt. test. t. 52. f. C.*
*Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1194 ? 1195.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *testa colore fasciisque varia, saepe cingulo nigro circumdata, columellae labio minime replicato.*

laevigatum. 129. B. testa ovato oblonga nitida fusco-striata laevi : apertura edentula unilabiata.
*Gualt. test. t. 52. f. B.*
*Habitat in* mari mediterraneo, *nitidulo affine, at apertura minime dentata, columellae labio nullo : spirae plicis nullis distincta, testa pallida obsolete maculata : striis obscurioribus.*

lamellosum. 173. B. testa subplicata transversim costata sulcata tuberculata lamellosa brunneo alboque fasciata.
*Chemn. Conch. 10. p. 179. vign. 21. f. A. B.*
*Martyn Conchol. 2. f. 44.*
*Habitat in* freto novae Seelandiae insulis interjecto.

scutulatum. 174. B. testa laevi brunnea venosa ; anfractibus planiusculis, cauda obtusa. *Chemn. Conch. 10. vign. 21. f. C. D.*

*Mur-*

*Martyn Conchol.* 2. *f.* 55.
*Habitat ad* novæ Seelandiæ *littora.*

Hausto-rium. 175. B. testa ovata ventricosa atra : spira brevi, columella depressa alba, fauce alba, labro introrsum striato crenulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 183. *t.* 152. *f.* 1449. 1450.
*v. Zorn n. Danz. Abh.* 1. *p.* 272. *n.* 95.
*Martyn Conchol.* 1. *f.* 9.
*Habitat ad* novæ Seelandiæ *littora.*

ventri-cosum. 187. B. testa ovato-oblonga fusca albo striata subplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 47.
*Habitat ad* Sinum R. Georgii.

testudi-neum. 176. B. testa ovata lævi maculis albicantibus fusce scentibusque alternis interrupte seriatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 187. *t.* 152. *f.* 1454.
*Zorn n. Danz. Abh.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
*Habitat ad* novæ Seelandiæ *littora.*

Catar-rhacta. 177. B. testa ovata scabra transversim confertim sulcata flammeo undulata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1455.
*Habitat ad* novam Seelandiam.

tahi-tense. 182. B. testa turrita transversim costata sulcataque : striis ad anfractuum futuram spirali nodulosa, apertura ovata, labro subplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 202. *t.* 154. *f.* 1477.
*Habitat ad* Tahiti *littora.*

lamel-latum. 187. B. testa imperforata lamellata alba intus purpurea : labio albo. *Kaemm. Cab. Rudolst. p.* 134. *n.* 43. *t.* 9. *f.* 2.
*Habitat* - - - *testa* 1½ *pollicem longa.*

*h* Turrita, *laevia fubulata.*

maculatum. 130. B. teſta ſul fuſiformi: anfractibus lævibus indiviſis integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 269. *

*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* A. Strombus 1.
*Liſt. Conch. t.* 846. *f.* 74.
*Bonann. recr.* 3. *f.* 317.
*muſ. Kircher.* 3. *f.* 313.
*Gualt. teſt. t.* 56. *f.* I.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* A.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 4.
*Knorr Vergn.* 3. *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 19. *f.* 6.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 153. *f.* 1440.
α) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 23. *f.* 3?
γ) *Rumpf muſ. t.* 30. *f.* D.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 11.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 153. *f.* 1442.
*Schroet. Einl. in Conch* 1. *p.* 349. *t.* 2. *f.* 6.
*Habitat in* Aſiæ Africæque *maribus frequens*, γ) *rarius in* Indiæ, *teſta* 8 *pollices longa flaveſcente alho faſciata ſeriatim ſpadiceo maculata, ſpirae anfractibus* 14 & *pluribus laevibus, extimis modo tranſverſim ſtriatis; in* γ) *omnibus ſtriatis: ſtriis horizontalibus arcuatis*

fubulatum. 131. B. teſta ſubulata lævi indiviſa integerrima.
*Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 5. Favar.
*Liſt. Conch. t.* 842. *f.* 70.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 118.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* B.
*Gualt. teſt. t.* 56. *f.* B.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* X.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 16. 23. 24. 27. 28.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 153. *f.* 1441.
α) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1443.
γ) *Liſt. Conch. t.* 841. *f.* 69.

*Mar-*

*Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1446.
α) *Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1447.
β) *Liſt. Conch. t.* 845. *f.* 72. c.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 39.
*v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 9.
*Habitat frequens in* Oceano indico, *teſta* 5 *fere pollices longa pallida maculis ſubquadratis ferrugineis in ſingulis anfractibus per paria adſcendentibus, teſta minime gibba a maculata diſtinctum.*

crenulatum. 132. B. ſpiræ anfractibus bifidis margine crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 270. *
*Liſt. Conch. t.* 846. *f.* 75.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* E.
*Gualt. teſt. t.* 57. *f.* L.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 9. 10.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 8. *f.* 7.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1445.
ε) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 8. Buccinum candidum.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 35 ?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 36 ?
ι) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Y ?
*Habitat in* mari, Africam & Indiam *alluente, teſta ultra* 5 *pollices longa, ex carneo ſubfuſca ſaepius exalbida, anfractuum margine inferiori callo crenato cincto, crenarum fuſco ſtriatarum lateri nodulis ſubquadratis adjacentibus, ſingulis quoque punctorum fuſcorum ſerie duplici primo triplici cinctis.*

hecticum. 133. B. ſpiræ anfractibus bifidis: margine ſuperiore c[illegible] preſſo attenuato.
*Gualt. teſt. t.* 56. *f.* C.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 21.
β) *Gualt. teſt. t.* 56. *f.* D.
*Habitat in* mari, Africam *alluente, teſta* 4 *pollices longa & longiori, alba, anfractibus ſingulis faſcia obſoleta luteo maculata cinctis.*

vit-

vittatum. 134. B. testa substriata: sutura anfractuum duplici crenulata.

*Adans. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Rafel.
*List. Conch. t.* 977. *f.* 34.
*Klein ostrac. t.* 7. *f.* 121.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 36. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1461-1463.
*Schroet. inn. Bau. Conch. t.* 3. *f.* 8.
*Eint. in Conch.* 1. *p.* 352. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Adans. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Miran.
*List. Conch. t.* 977. *f.* 33.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1468. 1469. & *t.* 157. *f.* 1491.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1470.
δ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1471.
*Habitat in* mari Africam & Indiam *alluente, testa ultra 2 pollices longa, nunc ex caeruleſcente cinerea: cingulis albis, nunc alba: anfractibus extremis rubellis, cinereis aut caeruleſcentibus, ovato-turrita, ſtriis transverſis remotis, apertura ampla: margine nitido albo.*

ſtrigilatum. 135. B. ſpiræ anfractibus bifidis oblique ſtriatis.

*Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 271.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* H. Strombus nonus granulatus.
*List. Conch. t.* 845. *f.* 37.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 8. 9.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1456.
β) *List. Conch. t.* 979. *f.* 36.
*Gualt. teſt. t.* 57. *f.* O.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* R.
*v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 11. *f.* 10.
*Chemn. Conch.* 4. *p.* 235. *vign.* 40. *f.* 1.
γ) *List. Conch. t.* 979. *f.* 37?
δ) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* S?
*Habitat in* mari Aſiam *auſtralem alluente, teſta ſtra-*

*ſtraminea aut fuſca, 2¾ pollices longa, ſpirae anfractibus 16-20, & ultra.*

duplicatum. 136. B. ſpiræ anfractibus bipartitis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 272. *

*Liſt. Conch. t.* 837. *f.* 64.
*Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 110.
*Gualt. teſt. t.* 57. *f.* N.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 6. & *t.* 24. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1455.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 12?
Buccinum pertuſum.
*Habitat in* India, *teſta ultra* 4 *pollices longa, fuſca, cingulis dilutioribus & anfractus primi fuſcia anguſta alba, aut chalybea, aut rufeſcente, longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſingulis cingulo lato plano bipartitis.*

lanceatum. 137. B. teſta lævi: anfractibur integris; lineis longitudinalibus teſtaceis.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* G.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Z.
*Knorr Vergn.* 6. *t.* 24. *f.* 4.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 134. *f.* 1450.
*Habitat rarum in* India, *teſta tenui pellucida ad apicem leviſſime ſtriata cana, ſpira acuta, cauda vix retuſa.*

dimidiatum. 138. B. ſpiræ anfractibus biſidis lævibus.
*Liſt. Conch. t.* 843. *f.* 71.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 107.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* C.
*Gualt. teſt. t.* 57. *f.* M.
*Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 15. 19.
*Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 5. & 6. *t.* 18. *f.* 5.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1444.
β) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* I?
γ) *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 7.
Buccinum ferrugineum.

*Ha-*

*Habitat in* mari Africam & Indiam *alluente*, *testa ultra 4 pollices longa*, *lateritia maculis undatis fasciisque albis.*

murinum. 139. B. spiræ anfractibus subangulatis: striis tribus muricatis.
*Gualt. test. t. 57. f.* P.
*Habitat ad* Africam, *testa nigra basi gibba*, *anfractibus saepe basi albis.*

tigrinum. 140. B. testa pellucida alba rufescenti-punctata: anfractibus singulis dorso subemarginatis.
*Gualt. test. t. 56. f.* G.
*Seb. mus. 3. t. 56. f.* A.
*Martin. Conch. 4. t. 154. f.* 1448.
*Habitat* - - - *testa minuta.*

Acus. 141. B. testa acuta exalbida lineis undulatis horizontalibus, anfractibus bifidis crenulatis rugosis, columella spiraliter torta.
*Martin. Conch. 4. t. 154. f.* 1449.
*Habitat* - - - *testa* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa.*

succinctum. 142. B. testa subulata horizontaliter striata: anfractibus singulis cingulatis.
*Martin. Conch. 4. t. 154. f.* 1451.
*Habitat frequens in* Oceano indico, *testa alba vel straminea.*

commaculatum. 143. B. testa subulata lituris flavis & rufescentibus varia: anfractibus planiusculis transversim striatis cingulo elevato cinctis.
*Martin. Conch. 4. t. 154. f.* 1452.
*E) Knorr Verga. 6. t. 22. f. 8. 9?*
*Habitat* - - - *testa alba aut cana.*

hastatum. 144. B. testa subventricosa: anfractibus perpendiculariter striatis; fasciis alternis fuscis albisque.
*Mar-*

*Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1453. 1454.
*Habitat* - - - *testa vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

acicula-tum. 145. A. testa alba : fasciis fuscis punctorum excavatorum.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1457.
*Habitat* - - -

Phallus. 146. B. spiræ anfractibus longitudinaliter costatis basi sutura rugosa, labro prominulo superne emarginato.
*Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1464. 1465.
*Schroet. Flusconch. p.* 401. *n.* 194.
*Habitat in* Indiæ, *an fluviis? testa tenui sub epidermide fusca flavicante, subfusca aut rufescente diaphana, costis albis, intus laevis : spirae anfractibus* 9, *costis subincurvis.*

flumineum. 147. B. spiræ anfractibus convexis distantibus transversim striatis : superioribus horizontaliter costatis.
*List. Conch. t.* 118. *f.* 13.
*Marcin. berl. Mag.* 4. *t.* 10. *f.* 52.
*Habitat in* - - - *aquis dulcibus, testa* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

asperum. 148. B. spiræ anfractibus costatis transversim striatis : primo gibbo, cauda prominula.
*List. Conch. t.* 925. *f.* 17.
β) *List. Conch. t.* 925. *f.* 18.
*Habitat* - - - *testa* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

muricinum. 149. B. testa reticulata rugosa : spira incurvata, apertura crenata ; columella rugosa, labro incrassato. *Gron. zooph. p.* 308. *n.* 1381.
*List. Conch. t.* 926. *f.* 19.
*Habitat* - - - *murici clathrato affine ; an hujus tribus?*

tu-

tubercu-latum. 150. B. ſpiræ anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie cinctis.
*Liſt. Conch. t.* 958. *f.* 11. b.
*Habitat - - - teſta exili.*

punctu-latum. 151. B. teſta ſubulata punctata transverſim ſtriata ; apertura obovata , ſpiræ anfractibus faſcia cinctis ; primo ventricoſo.
*Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 38.
*Habitat - - - teſta vix pollicem longa.*

Acicula. 152. B. teſta ſubulata lævi tenuiſſima ſubtiliſſime transverſim ſtriata : ſpiræ anfractibus contiguis.
*Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 7.
*Habitat in - - - aquis dulcibus , teſtae apertura ovali.*

faſcio-latum. 153. B. teſtæ apertura ovato-oblonga : anfractibus ventricoſis diſtantibus horizontaliter ſtriatis : ſtriis elevatis faſcia intermedia ſejunctis.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 45.
*Klein oſtr. t.* 7. *f.* 123.
*Habitat - - -*

niveum. 154. B. teſta ſubulata lævi nivea biſaſciata : ſpiræ anfractibus contiguis.
*Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 109.
*Klein oſtr. t.* 7. *f.* 117.
*Habitat - - -*

mucro-natum. 155. B. teſta ſubventricoſa alba fuſco undulata : apertura ovali.
*Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 400.
*Habitat - - - teſta ultra* 3 *pollices longa , ſpirae anfractibus* 5.

Digitel-lus. 156. B. teſta rudi apice obtuſa ſubincurva.
*Rumſ.*

*Rumpf muſ. t.* 29. *f.* Q.
*Habitat in* India, *teſta* ½ *pollicem longa, nunc granulata griſea & faſciata, nunc laeviſſima nivea.*

obliquum. 157. B. ſpiræ anfractibus integris oblique decuſſatimque ſtriatis.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* F. Strombus ſeptimus.
*Habitat in* India, *ſtrigilato affine, teſta digiti longitudine, calami craſſitie.*

chalybeum. 158. B. teſta ſubangulata ſulcata.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* 1. Strombus chalybeus.
*Habitat in* India, *teſta* 1½ *pollices longa chalybea, aut albo nigroque punctata.*

fluviatile. 159. B. teſta tenui: anfractibus contiguis, cauda ſubemarginata.
*Rumpf muſ. t.* 30. *f.* P. Strombus fluviatilis.
*Murt. berl. Mag.* 4. *t.* 9. *f.* 39.
*Habitat in* Indiæ fluviorum oſtiis *limoſis, teſta opaca ex cinereo viridi,* 4-5 *pollices longa, interdum nigro lineata.*

radiatum. 160. B. teſta ſubulata albida rufeſcenti-radiata: anfractibus convexis ſtriis granulatis cinctis; primo ventricoſo ſecunda duplo majore.
*Gualt. teſt. t.* 52. *f.* D.
*Habitat* - - -

lividulum. 161. B. ſpiræ anfractibus longitudinaliter rugoſis tranſverſim granulato-ſtriatis: anfractu primo altero duplo majore.
*Gualt. teſt. t.* 56. *f.* F.
*Habitat* - - - *teſta pollicem circiter longa.*

edentulum. 162. B. anfractibus maculatis, apertura elongata edentula, columella plicata.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* O.
*Habitat* - - -

Pu-

Pugio. 163. B. testa longitudinaliter striata: fasciis punctatis maculatis inter anfractus intermediis.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Q.
*Habitat* - - - *strigilato affine.*

canaliculatum. 164. B. testa maculata: spiræ anfractibus canaliculatis.
*Argenv. Conch. t.* 11. *f.* T.
*Habitat* - - - *spirae anfractibus* 17.

varicosum. 165. B. spiræ anfractibus convexis coronatis bifariam, primo trifariam punctatis.
*Seb. mus.* 3. *t.* 56. *f.* 17.
*Habitat* - - - *testa* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

cuspidatum. 166. B. testa subulata maculata: anfractibus convexis subremotis.
*Seb. mus.* 3. *t.* 56. *f.* 20.
*Habitat* - - -

cinereum. 167. B. testa subulata lævi cinerea obsolete fasciata: anfractibus indivisis ad futuram longitudinaliter striatis.
*v. Born mus. Caes. Vindob. test. t.* 10. *f.* 11. 12.
*Habitat* - - - *testa parum infra* 2 *pollices longa; spirae anfractibus* 14.

virginicum. 168. B. testa ex virescente flava: fasciis duabus sanguineis, spiræ anfractibus planiusculis, apertura ampla ovali.
*List. Conch. t.* 113. *f.* 7.
*Martin. berl. Magaz.* 4. *p.* 347. *t.* 10. *f.* 48.
*Habitat in* Virginiæ *fluviis.*

proximatum. 169. B. spiræ anfractibus bifidis, inferiore subtriato, superiore filiformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
*Habitat* - - - *testa subuluta nitida.*

Mo-

Moline. 170. B. ſpiræ anfractibus bifidis : inferiore ſulcato , ſuperiore moniliformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
*Habitat - - - teſta ſubulata albida ſubflaveſcente.*

cingulatum. 171. B. cingulis tribus elevatis ſupra infraque canaliculatis. *Mant.* 2. *p.* 550.
*Habitat in* Islandia , *murici doliario affine* , *teſta ovata* , *cinerea* , *tranſverſim ſtriata* , *pruni minoris magnitudine* : *cingulis laevibus* , *ventris* 3 , *ſpirae* 2 , *anfractibus ſupra planiuſculis* , *apertura obovata* , *columella planiuſcula.*

gemmatum. 172. B. ſpiræ anfractibus bifidis : inferiore ſubſtriato , ſuperiore protuberantiore. *Mant.* 2. *p.* 550.
*Habitat - - - teſta ſubulata alba.*